



2427

3249

11

6. 6^a

MED 2424

6

44-5-16

~~37-L-A = n^o 1.~~

Est. 15. tab. 9^a. n^o. 220.



HORTVS ACADEMICVS
LVGDVNO-BATAVVS
APVD
CORNELIVM BOVTESTEYN
MDCLXXXVII



ADCT. X. X. II.
KONSTANTINOPOLIS
1740
HABIT. NO. 1412
FORTIS ACADEMICAE

B-57
HORTI ACADEMICI
LUGDUNO-BATAVI
CATALOGUS

exhibens

Plantarum omnium Nomina, quibus ab anno M DC LXXXI ad annum

MDCLXXXVI Hortus
fuit instructus

ut &

Plurimarum in eodem cultarum & à nemine
hucusque editarum

DESCRIPTIONES

&

ICONES

Auctore

PAULO HERMANNO

Medicina & Botanices Professore.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud CORNELIUM BOUTESTEYN,
M DC LXXXVII.

HORTI ACADEMICI LUGDUNO-BATAVI CATALOGUS

exhibens

Plantarum omnium Nomina, quibus
 ab anno MDCXXXIII ad annum
 MDCXXXVI Hortus
 fuit instructus

in 8.

Primarium in eodem cultum & a nomine
 hucusque editum
 DESCRIPTIONES

&

ICONES

Auctore

PAULO HERMANNO

Medicini & Botanices Professore.



LUGDUNO-BATAVORUM
 APUD CORNELIUM BOHTESTIUM
 MDCXXXVII

CURATORIBUS

D. DANIELI VAN WYNGAERDEN

Baroni de Wyngaerden, Benthuyfen, Ruybroeck &c. Toparchæ de Werckendam, Moermond, Renesse, Zuydlant, Noordwelle &c. Equestris Hollandiæ Ordinis nomine ad Confectum Celsissimorum Fœderati Belgii Ordinum Generalium Deputato, Aggerum Urbis Woerdanæ & Aquæductuum totiusque Territorii Præfecto & Satrapæ, in supremâ Aggerum Delflandiæ Curiâ Assessori, ad Serenissimum Daniæ Regem Exlegato.

D. HIERONYMO DE BEVERNING, JC.

Theilingæ Toparchæ, Reipublicæ Goudanæ Viro Consulari, multis pro Fœderato Belgio Legationibus Illustri, ac rerum gestarum Gloriâ Claro.

D. CONRADO VAN BEUNINGEN, JC.

Reipublicæ Amstelodamensis Viro Consulari, Legationum pro Patriæ salute ad Potentissimos Reges Inclyto.

Eorumque Collegis

Nobilissimis & Amplissimis

Reipublicæ Lugduno-Batavæ

CONSULIBUS

D. JACOB O V A N D E R M A E S
In supremâ Aggerum Rhenolandix Curiâ
Assessori, Ærarii Academiae Lugd. Batav.
Præfecto & p. t. Coss. Præsidi.

D. JOHANNI V A N V E S A N E V E L T , J C .

D. JOHANNI V A N B A N C H E M ,

D. C O R N E L I O P A A T S , J C .


ut &

Amplissimo Consultissimoque Viro.

D. P E T R O B U R G E R S D I C I O , J C .
Reipublicæ Lugduno-Batavæ Syndico &
Illustribus D. D. Curatoribus à Secretis.

DE-

DEDICATIO.

 A est Nominis
Vestri Auctori-
tas atque Glo-
ria , ut quâ latè
patet orbis re-
ligiosa Venera-

tionē suspiciatur. Hic verò cul-
tus *Illustrissimi Proceres* Jure quo-
dam Vobis debetur. Sive enim
Vestra in Bono publico mode-
rando respiciatur Prudentia, si-
ve Vestra in liberales artes &
doctrinas perpendantur meri-
ta , nemo gentium est , qui
Vobis sit postponendus. Hoc
inter innumera illa Virtutum
Vestrarum facta atque mira-
cula vel Academia nostra te-
statur , divino prorsus con-

DEDICATIO.

filio vestrisque faustis auspiciis
 ad illud maturitatis fastigium
 evecta, ut, quod olim pro-
 pria laus fuit Romæ & Athe-
 nis, Divinarum Humana-
 rumque rerum Patria & Pro-
 ma conda plenâ omnium con-
 cione celebretur. Fulgent in
 hac ubivis amplissima vestra
 monumenta & clarissima de-
 cora, quibus omnium Artium
 Disciplinas magnificè exor-
 nastis, & exornatas indies
 novis auctibus amplificatis.
 Ut silentio præteream publi-
 cum vestrum *νοσδοχεῖον*, sump-
 tuosam Bibliothecam, am-
 plissima Theatra, Anatomica,
 Chemica, Physica, Astrono-
 mica coeterosque apparatus,
 ad

D E D I C A T I O .

ad usum decorem & commoda
Docentium Discentiumque
instructa. Satis sit, si ad Hor-
tum Vestrum provocem, Aca-
demiæ & Urbis Vestræ præ-
fulgentissimum jubar , cui ,
tàm quoad loci dignitatem &
amoenitatem , quàm Stirpium
ubertatem & perelegantem
seriem , nullibi unquam Sol
aspexit parem. Non Hortum ,
sed cultissimum Paradisum
quispiam dixerit , in quo ,
quicquid eximii habet vel hic
vel alter orbis , uno quasi in-
tuitu contemplari licet. Hu-
jus splendorem & admira-
tionem augent augustæ in eo
exstructiones , Ambulacra ,
Aquagia , vitrea Hypocausta ,

DEDICATIO.

Foculorum subterraneorum
vaporaria, aliiue magnifici ad
plantarum cultum & ornatum
compositi apparatus, quorum
interventu cœli nostri rigidior
intemperies ad votum no-
strum temperatur, & stirpes
delicatâ superbiâ contumaces
nullas nec hyemis nec æstatis
sentiunt vicissitudines, sed in
perpetuò virente fertilitate
custodiuntur, & ad summam
maturitatem perducuntur. O
quàm jucundum oculis & in-
tellectui capiunt pabulum, O
quàm saluberrimam frugem
reportant, qui hâc famâ
perciti, Horti vestri miracu-
la spectatum hûc appellant!
Nihil porrò amplius superes-
se

D E D I C A T I O.

se rectè existimastis, *Illustrissimi Moecenates*, quàm ut Flo-
reæ vestræ opes in seram po-
steritatis memoriam & per-
petuum vestrum monumen-
tum tabulis inscriberentur
cartaceis, & per omnes or-
bis incolas, quibus vel Corin-
thum Vestram propiùs adire
non contingit, distraheren-
tur & disseminarentur. Quod
munus cùm ex prudenti ve-
stro decreto mihi sit commis-
sum, pro eâ quâ debui erga
Vos observantiâ & quâ potui
ingenii solertiâ conficere, &
Vestro Illustrissimo Nomini con-
secrare & debui & volui.
Hoc meum studium, si Vo-
bis vel mediocriter probari
sen-

D E D I C A T I O.

senfero , ingens beneficium
agnoscam, quod omni cultu,
pleno obsequio & jugi labo-
re demereri conabor. Cœte-
rùm Venerabor , Optimum
Maximum, ut Academiae Ur-
bisque Vestrae Majestas

Crescat occulto velut arbor ævo
& Gloria Vestra amplissimis
Virtutibus aucta, per omnem
seculorum seriem feliciter de-
ducatur. In his desinit votis

Illustris & Magnifici Nominis vestri,

Lugduni Batavorum
ipsis Kal. Decemb.
M DC LXXXVI.

Cultor humillimus.

PAULUS HERMANNUS.

ADMONITIO

AD

REI HERBARIÆ STUDIOSOS.

Antequam cartaceum hunc ingrediaris Hortum, paucis Te moneri cupio, quid in studiorum tuorum gratiam præcipuè præstiterim vel saltem præstare voluerim: Stirpes omnes, quibus Hortus Lugduno-Batavus ab integro sexennio, quo ejusdem curam sustinui, instructus fuit, serie Alphabeticâ recensui, & singulas, in quantum ordinis ratio permisit, suis legitimis generibus aptavi, argumento desumpto à fructificatione, hoc est seminum eorumque capsularum dispositione, ceu parte plantarum præcipuâ & constantissimâ.

A D M O N I T I O .

tiſſimâ. Hoc vero illico Tibi apparebit ex literarum varietate & linearum intercapedine. In Nomenclaturis ſequutus ſum ductum præcipuorum noſtri ævi Botanographorum **CASPARI & JOHANNIS BAUHINI** ut & **ROBERTI MORISONII**, aliorumque apud quos plantas, à laudatis auctoribus omiſſas, invenire licuit. Quas verò à nemine hucusque evulgatas, in Horto colui, aptis nominibus (pauciſſimis forte exceptis) adornavi, plurimam partem deſcripſi, & delineavi, ſimul ac nonnullos autorum defectus, à Botanophylis hætenus deſideratos, ſupplevi. Singulis Titulis ſeu Periodis utplurimum illud nomen præmiſi, quod jure naturalis Characteris magis videbatur appoſitum; Cætera verò tanquam

Sy-

A D M O N I T I O.

*Synonyma postposui, factâ tamen ubi-
 vis mentione auctoris libri & paginae.
 Inspecturus itaque Plantæ cujusdam
 nomen, illico agnosces ejus genus, &
 ex cujusnam auctoris libro & pagina
 Plantæ facies, Synonymia, Virtutes
 aliaque ad plenariam Plantæ cogni-
 tionem spectantia sint petenda: Vide-
 licet Morisonius Te docebit imprimis
 Plantæ Characterem, Casparus Bau-
 binus in Pinace Synonymiam, Jo-
 hannes Baubinus in tribus suis Volu-
 minibus Historiam naturalem & me-
 dicam. Quid ex aliorum & nostris
 descriptiunculis capere possis emolu-
 menti, ipse videbis. Optassem equi-
 dem (maxime enim è re tuâ fuisset)
 ut Historiam Plantarum naturali
 methodo digestam JOHANNIS
 RASII huc conferre, ejusque placita
 nostris*

ADMONITIO.

nostris accommodare potuissem, sed quoniam desideratissimus ille liber nimis serò, postquam hic Catalogus typis ferme excessisset, ad manus nostras pervenit, votum meum explere non licuit. Quod demum expleri posse confido, si Hortum rarioribus stirpibus auctum & mendis, quæ irrepserunt, purgatum, de novo prælo commiserò. Cæterum, quas plantas in Belgico nostro solo sponte nascentes ipse reperi, & in Hortum transtuli, iis Asteriscum * præfixi, Annuis verò notulam ANN. subjeci. Reliqua à me præstita ex attentâ lectione facile apparebunt. Vale, & laboribus nostris fave.

Præ-

Præcipuorum nominum ab-
breviatorum dilucidationes.

Act. Hassn. Barth. Thomæ Bartholini Acta
Medica & Philosophica Hafniensia.

Aldin. Hort. Farn. Exactissima descriptio ra-
riorum quarundam Plantarum Horti Far-
nesiani Tobia Aldini.

Alpin. Exot. De Plantis exoticis libri duo Pro-
speri Alpini.

Alpin. Pl. Egypt. De Plantis Ægypti liber
ejusdem.

Ambros. Phyt. Hyacinthi Ambrosini Phytolo-
giæ partis primæ tomus primus.

Amm. Char. Character Plantarum naturalis
Pauli Ammanni.

Boccon. Ic. & Descr. Pauli Bocconis Icones &
Descriptiones rariorum Plantarum Siciliæ.

Boccon. Epist. Epistola 21. en Recherches è
Observations Ejusdem.

Bod. à Stap. Theophrasti Eresii de Historia
Plantarum libri decem Johannis Bodæi à
Stapel.

Bont. Hist. Jacobi Bontii Historia naturalis &
Medica Indiæ Orientalis cum commentario
Pisonis.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii Exoticarum Plan-
tarum Centuria prima.

Breyn. Prod. Prodromus fasciculi rariorum
ejusdem.

Boym. Fl. Sin. Boymii Flora Sinica.

* *

C. B.

C. B. Matth. Andreæ Matthioli Opera, Caspari Bauhani.

C. B. Phyt. Phytopinax Caspari Bauhini.

C. B. P. Pinax ejusdem.

C. B. Prod. Prodromus Theatri Botanici ejusdem.

Cat. Hort. Reg. Par. Hortus Regius, Parisiis.

Cat. Hort. Oxon. Catalogus Horti Oxoniensis Philippi Stephani & Guilielmi Brounei.

Clus. cur. post. Caroli Clusii Curæ posteriores.

Column. Exphr. Fabii Columnæ minus cognitarum Plantarum Ecphrasis.

Column. Not. Ejusdem in Nardi Antonii Rechi volumen annotationes.

Column. Phytob. Phytobasanus ejusdem.

Comel. Johannis Commelini Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiæ.

Corn. Jacobi Cornuti Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum Historia.

Dod. Mem. Memoires pour servir a l'Histoire des plantes Dodart.

Ferrar. Flor. Cult. Johannis Baptistæ Ferrarii Flora seu Florum cultura.

Ferr. Hesp. Ejusdem Hesperides.

Frid. Cæs. Tab. Phytosophicarum Tabularum Principis Friderici Cæsii Lyncei pars prima.

Gerhard. Herball Histori of Plantes Johannis Gerhardi Thomæ Johnson.

Hern. Hist. Mex. Nova Plantarum Animalium & Mineralium Mexicanarum Historia Francisci Hernandez.

Hofman. Flor. Floræ Altdorffinæ deliciæ hortent-

tenfes Mauritii Hofmanni.

Hort. Eyst. Hortus Eystettenfis Basilii Befleri.

Hort. Malab. Horti Indici Malabarici Henrici van Rheeде à Drackenſtein pars 1. 2. 3. 4. 5. 6
J. B. t. l. Hiftoriæ Plantarum univerſalis Jo-
hannis Bauhini tomus 1. 2. 3.

Jonqu. Hort. Dionyſii Jonquet Hortus.

Jonſt. de Arb. it Mantiff. Hiftoria Naturalis de
Arboribus, Libri ſex Johannis Jonſtonii.

Lugdun. Hiftoria generalis Plantarū. Lugduni.

Magnol. Bot. Botanicum Monſpelienſe Petri
Magnoli.

Marckgr. Hiſt. Georgii Marckgravii Hiftoria
rerum naturalium.

Mentz. Ind. it. Pugil. Index nominum Plan-
tarum Multilinguis Chriſtiani Mentzelii
cum Pugillo rariorum Plantarum ejusdem.

Merret. Pin. Pinax rerum naturalium Britani-
carum Chriſtophori Merret.

Moriſ. Hiſt. Plantarum Hiftoriæ univerſalis
Oxonienſis pars ſecunda Roberti Moriſon.

Moriſ. Hort. Bleſ. Hortus Regius Bleſenſis au-
ctus ejusdem.

Moriſ. Umbel. Plantarum umbelliferarum diſ-
tributio nova ejusdem.

Munt. Prax. Waare Oeffening der Planten
Abrahami Munting.

Munt. Brit. Vera herba Britanica ejusdem.

Munt. Al. Aloïdarium ejusdem.

Muſ. Zeyl. Muſæum Zeylanicum continens
Plantarum Animalium & Mineralium, quæ
Zeylona Infula ſuppetit, Hiftoriam, in quâ

adornandâ subcissivis horis defudat Autor.
Park. Theatr. Theatrum Botanicum Johannis
Parkinsonii.

Pison. Hist. Guilielmi Pisonis de Indiæ utrius-
que re naturali & medicâ.

Pison. Mantiss. Ejusdem Mantissa aromatica.

Raj. Catal. Catalogus Plantarum Angliæ Jo-
hannis Raji.

Raj. Hist. Historia Plantarum ejusdem.

Sim. Paul. Quadr. Bot. Quadripartitum Bo-
tanicum Simonis Pauli.

Sterbeeck citr. cult. Francisci Sterbeeck Citri
cultura.

Sterb. Theatr. Fung. Theatrum Fungorum
ejusdem.

Sutherl. Hort. Edinb. Hortus Medicus Edin-
burgensis James Sutherland.

Swert. Flor. Florilegium Emanuelis Swertii.

Tab. Jacobi Theodori Tabernæmontani Krau-
terbuch.

Triumf. Observ. Observationes de Ortu ac
Vegetatione Plantarum Johannis Baptistæ
Triumfetti.

Tur. Hist. Pl. Historia Plantarum Georgii
Turre.

Vesling. Obs. Johannis Veslingii de plantis Æ-
gyptiis Observationes.

Zanon. Hist. Bot. Historia Botanica Jacobi Za-
noni.

* Plantas in Belgio sponte provenientes de-
notat.

ANN. Annuas indicat.

HOR-



HORTUS ACADEMICUS LUGDUNO-BATAVUS.

A.



belmosch. V. Althæa.



ABIES conis sursum spectantibus,
sive Mas C.B.P. 505. Taxi foliis.

Abies alba, sive Fœmina C.B.P. 505. Abies

Fœmina, sive ἐλάτη θήλεια I. B. tom. 1. l. 9. 231.

Abies rubra, sive Picea major prima C.B.P.

493. Picea Latinorum, sive ἐλάτη ἄρρεν Abies

Mas Theophrasti I. B. tom. 1. l. 9. 238.

ABROTANUM Mas angustifolium majus

C.B.P. 136. Abrotonum vulgare I. B. tom.

3. l. 26. 192. Cauliculis viridantibus.

Idem cauliculis rubentibus.

Abrotanum Mas angustifolium maximum C.B.

A

P. 16.

P. 136. *Abrotanum camphoratum vulgò.*
Abrotanum Mas angustifolium minus C. B. P.
 136. *Abrotonum cum pulchris corymbis I.*
B. tom. 3. l. 26. 194.

Abrotanum campestre C. B. P. 136. *Artemisia tenuifolia, sive leptophyllos, aliis Abrotonum sylvestre I. B. tom. 3. l. 26. 194.* Inodorum, cauliculis ex viridi albicantibus.

Idem cauliculis rubentibus C. B. P. Var. 136.

Abrotanum campestri simile Tingitanum.

Formâ & crescendi modo priori consimile videtur, odoris & saporis aromatici non omnino expers; ubi verò adoleverit, acquirit virgulta magis lignosa & fruticosa. Folia sunt tenuiora, hilari virore nitentia, inferiora ut plurimum trilobata, superiora integra; Semina exigua, cinereo-spadicea more congenerum. Habemus ex Anglia, ubi semibus Tingide missis prodiit.

A B R O T A N U M *Fœmina foliis teretibus C. B. P.* 136. *Chamæcyparissus I. B. tom. 3. l. 26. 133.* *Santolina vulgò.*

Abrotanum Fœmina flore majori, foliis villosis & incanis C. B. P. 137.

Abrotanum Fœmina viride C. B. P. 137.

Abrotanum Fœmina foliis Rorismarini majus C. B. P. 137.

Abrotanum Fœmina canescens foliis Stœchadis citrinæ Breyn. Pr. 1.

Abrus Alpin. v. Phaeolus.

LUGDUNO-BATAVUS.

3

ABROTANUM CAMPESTRI SIMILE TINGITANUM.



ABSINTHIUM arborescens Lobelii *I. B. tom. 3. l. 26. 173.* Abrotanum latifolium arborescens *C. B. P. 136.*

- * Absinthium ponticum, seu Romanum Officinarum, seu Dioscoridis. *C. B. P. 138.* Absinthium vulgare majus *I. B. tom. 3. l. 26. 168.* Foliis latioribus.

Idem foliis angustioribus.

Absinthium insipidum, Absinthio vulgari simile *C. B. P. 139.* Absinthium insipidum *I. B. tom. 3. l. 26. 138.*

Absinthium ponticum Creticum grati odoris *C. B. P. 138.* Absinthium ponticum & Romanum quibusdam, aliis Seriphium *I. B. tom. 3. l. 26. 167.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum *C. B. P. 138.* Absinthium ponticum vulgare, folio inferius albo *I. B. tom. 3. l. 26. 175.*

Idem planè incanum *C. B. P. 139.* Foliis angustioribus.

Idem odoratissimum.

Hoc ab Absinthio planè incano differt solo odore.

Absinthium ponticum tenuifolium Austriacum *C. B. P.* Absinthium Austriacum tenuifolium *I. B. tom. 3. l. 26. 179.*

Absinthium maritimum Lavendulæ folio *C. B. P. 149.* Absinthium maritimum latifolium sive Matthioli *I. B. tom. 3. l. 26. 174.*

- * Absinthium Seriphium Belgicum *C. B. P. 189.*
I. B.

I. B. tom. 3. l. 26. 178.

Absinthium Seriphium Gallicum C. B. P. 139.

Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonense I. B. tom. 3. l. 26. 177.

Absinthium Alpinum umbelliferum latifolium C. B. P. v. Ptarmica.

Absinthium albis floribus, capitulis squarosis I. B. V. Ptarmica.

Absus I. B. v. Senna.

Abutilon ejusque species I. B. v. Alchæa.

ACACIA Ægyptiaca foliis Scorpioides leguminosæ filiquis albis compressis, isthmo interceptis, floribus luteis. Acacia foliis Scorpioides leguminosæ C. B. P. 392. Acacia vera I. B. tom. 2. l. 12. 429. Acacia. Sant Akakia *Alpin. de Plant. Ægypt. 9.* Acacia *Vesling. Observ. 6.* Acacia Ægyptia *Colum. in Rech. 866.*

Eadem floribus albis *Alpin. de Plant. Ægypt. 10. Descr.*

Acacia Indica foliis Scorpioides leguminosæ filiquis fuscis teretibus resinosis. Acacia Indica Farnesiana *Aldin. Hort. Farnes. 2.*

ACACIA Americana foliis Coluteæ Monococos filiquis echinatis. Acacia Americana Robini. *Cornut. 272.*

Acacia trifolia C. B. P. v. Cytisus.

Acacia Germanica vulgò. v. Prunus Sylvestris.

Acajou Pison. v. Anacardium.

Acanthium vulgò. v. Carduus.

Acanthium Illiricum. I. B. v. Carduus.

ACANTHUS fativus vel mollis Vergilii C. B. P. 383. Carduus Acanthus, five Branca ursina I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Acanthus aculeatus C. P. B. 383. Carduus Acanthus, five Branca ursina spinosa I. B. tom. 3. l. 25. 77.

Acarna flore luteo patulo C. P. B. v. Carlina.

Acarna major caule folioso C. B. P. v. Carduus.

Acarna Theophrasti vulgò v. Carduus.

Acarnæ similis flore purpureo I. B. v. Carduus.

* **A**CER montanum candidum C. B. P. 430. Acer majus multis falsò Platanus I. B. tom. 1. l. 8. 868.

Acer montanum flavum, five crispum C. B. P. 431

* Acer campestre & minus C. B. P. 431. Acer vulgare minori folio I. B. tom. 3. l. 8. 166.

Acer trifolia C. B. P. 431. Acer Monspessulanum I. B. tom. 1. l. 8. 167.

* **A**CETOSA pratensis C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 582.* Oxalis vulgaris I. B. tom. 2. l. 23. 989.

* Acetosa crispa *Moris. Hist. 2. 582.* Oxalis crispa I. B. tom. 2. l. 13. 900.

Acetosa montana radice rectâ pedali aut fessiquipedali, Lapathi instar, absque fibris *Moris. Hist. 2. 583.*

Acetosa tuberosâ radice C. B. P. 114. Oxalis tuberosâ radice I. B. tom. 2. l. 23. 991. Acetosa Ragusina radice tuberosa *Moris. Hist. 2. 583, Zanon. Hist. Bot. 12.*

Acc-

Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 583. An *Oxalis Africana* I. B. tom. 2. l. 23. 992. ANN.

Acetosa vesicaria Tingitana perennis repens, foliis longis sinuatis *Morif. Hist.* 2. 583. *Acetosa dentata* perennis Tingitana *Zanon. Hist. Bot.* 14.

Acetosa rotundifolia hortensis C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 583. *Oxalis folio rotundiore* repens I. B. tom. 2. l. 23. 991.

Acetosa rotundifolia repens Eboracensis folio in medio deliquium patiente *Morif. Hist.* 2. 583.

* *Acetosa arvensis lanceolata* C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 584. *Oxalis parva auriculata* repens I. B. tom. l. 23. 992.

* *Acetosa lanceolata angustifolia* repens C. B. P. 114.

Acetosa Cretica semine aculeato C. B. P. 114. *Morif. Hist.* 2. 584. *Oxalis minor aculeata Candia* I. B. tom. 2. l. 23. 993. ANN.

Acetofella vulgò. v. *Oxis*.

Achillea millefolia odorata I. B. v. *Millefolium*.

Acinos multis I. B. v. *Clinopodium*.

ACONITUM *Lycostonon luteum* C. B. P. 183.

Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente I. B. tom. 3. l. 34. 652.

Idem ampliore caule & foliis C. B. P. *Var.* 183.

Idem humiliore caule & minoribus foliis C. B. P. *Var.* 283.

Aconitum lycoctonon luteum, foliis in acumen luteum desinentibus.

Aconitum salutiferum, seu *Anthora* C. B. P. 184.

Antithora flore luteo *Aconiti* I. B. tom. 3. l. 34. 669.

Aconitum cæruleum, seu *Napellus* I. C. B. P. 183.

Aconitum magnum purpureo flore, vulgò *Napellus* I. B. tom. 3. l. 34. 555.

Aconitum cœruleum *Napelli* flore C. B. P. 183.

Aconitum lycoctonon autumnale, *Napello* simile I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Idem flore cœruleo & albo variegatum C. B. P. Var. 183.

Aconitum violaceum, seu *Napellus* secundus

C. B. P. 183. *Aconitum* *Napello* simile, sed minus cœruleum præcocius I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Aconitum purpureum, seu *Napellus* tertius

C. B. P. 183: *Aconitum* *Lycoctonon*, seu *Napello* simile *Neubergense*, foliis latioribus, flore purpureo I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum cœruleum minus, seu *Napellus* minor

C. B. P. 183. *Aconitum lycoctonon*, flore cœruleo, galeâ elatiori, radice bulbosâ I. B. tom. 3. l. 34. 659.

Aconitum cœruleum hirsutum, flore *Consolidæ*

regalis C. B. P. 183. *Aconitum lycoctonon* cœruleum, calcari magno I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum unifolium luteum bulbosum C. B. P.

V. *Helleborus*.

Aconitum racemosum C. B. P. v. *Christophoriana*.

Aco-

Aconitum baccis niveis Corn. v. Christophori.
Aconitum Pardalianches C. B. P. v. *Ranunculus*.

* **A** CORUS verus, sive Calamus aromaticus Officinarum C. B. P. 34. Calamus aromaticus vulgaris, multis Acorum I. B. tom. 2. l. 19. Europæus radice crassiori.

Idem Asiaticus radice tenuiore. Calamus aromaticus *Garziae ab Horto Aramat. H. I. l. 1. c. 22*

Acorus hic omnibus partibus convenit cum Europæo, exceptâ solâ radice, quæ tenuior est & compactior, superficie crebrius geniculatâ, odore & sapore gratiori. Sponte suâ luxuriat in Malabarâ & Insulâ Zeylan, unde à me anno M. DC. Lxxv. ad Clarissimum Dominum Arnoldum Syen Medicinæ & Botanices, dum viveret, in hâc Academiâ Professore dignissimum transmissus, & in hortum plantatus, in hunc usque diem lætissimè viret. Incolis Vazabu & Vazumbo audit. Ejus virtutes videantur apud *Garziam ab Horto. l. c.*

Acorus adulterinus C. B. P. v. *Iris*.

Actæa Plinio C. B. P. v. Christophoriana.

Adami Poma I. B. v. *Malus Limonia*.

A DIANTHUM foliis Coriandri C. B. P. 355.

Adiantum, sive Capillus Veneris I. B. tom.

2. l. 37. 751.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. P. 355. Adiantum nigrum officinarum I. B. tom. 3. l. 37. 742.

* Adian-

- * *Adiantum album murarium*. *Ruta muraria*.
C. B. P. 356. I. B. tom. 3. l. 37. 753.
- * *Adiantum album Filicis folio* I. B. tom. 3. 471.
Filicula fontana major C. B. P. 358.
- * *Idem minus*. *Filicula fontana minor* C. B. P.
358.
Adiantum aureum vulgò. v. *Muscus*.

A DONIS *hortensis flore minore atrorubente*
C. P. B. 178. ANN.

- * *Adonis sylvestris flore phoeniceo*, ejusque fo-
liis longioribus C. B. P. 178. *Flos Adonis*
vulgò, aliis *Eranthemum* I. B. tom. 3. l. 26.
125. ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. *Var.* 178. ANN.

Adonis Hellebori radice Buphthalmi flore.
Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flo-
re C. B. P. 187. *Buphthalmum Dodonæi*, aliis
Consiligo tenuifolia I. B. tom. 3. l. 34. 637.

Eadem caule geniculato, flore magno instar
Tulipe. *Helleborus niger Ferulaceus*, sive
Pseudo-helleborus caule geniculato flore in-
star Tulipe Menz. *Pugil*.

Adrachne Theophrasti I. B. v. *Arbutus*.

Egylops ejusque species I. B. v. *Festuca*.

Egylops Aspris Theophrasti I. B. v. *Quercus*.

Eschinomene mitis Americana foliis Acaciæ
angustioribus, siliquis longis angustis, semine
quadrangulari Breyn. v. *Herba mimosa*.

Ethiopis folio sinuoso C. B. P. v. *Horminum*.

Agem Lilac Persarum Corn. v. *Syringa*.

AGE-

AGERATUM foliis ferratis C. B. P. 221.
 Ageratum plerisque, Herba julia quibus-
 dam 1. B. tom. 3. l. 26. 142.

Idem corymbis longioribus & magis compa-
 ctis C. B. P. Var. 221.

AGNUS CASTUS Vitex foliis angustioribus
 Cannabis modo dispositis C. B. P. 475. Agnus
 folio non ferrato 1. B. tom. 1. l. 8. 205. Flori-
 bus purpureis.

Idem floribus albidis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 186.

Idem floribus cœruleis.

Agrifolium vulgò 1. B. v. *Aquifolium*.

AGRIMONIA inodora, seu minus odora *Morif.*
Hist. 2. 614. Eupatorium Veterum, seu A-
 grimonia C. B. P. 321.

Eadem maximè odorata. Eupatorium maximè
 odoratum *Morif. Hist.* 2. 615. Eupatorium
 odoratum C. B. P. 321.

Agrimoniæ similis C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 615.

Agrimonioides *Column. Ecphr. part.* 1. 145.

Algul 1. B. v. Genista.

Aizoon vulgò. v. Sedum.

Aizoon palustre 1. B. v. Stratiotes.

ALTERNUS latifolia, Celastrus dicta. Cela-
 strus Theophrasti *Clus. Cur. Post.* 2.

Alaternus, seu Phylica elatior C. B. P. 476. Spina
 Burgi Monspeliensium 1. B. tom. 1. l. 1. 542.

Alaternus, seu Phylica humilior C. B. P. 477.

Ala

Alaternus , seu Phylica foliis angustioribus & profundius ferratis.

Alaternus , seu Phylica aurea , five foliis ex luteo variegatis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Morisf. Hort. Bles. 227.*

Eadem argentea , seu foliis ex albo variis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Morisf. Hort. Bles. 227.*

Alcanna vulgò. v. Phillyrea.

ALCEA frutescens folio rotundiori incano *Morif. Hist. 2. 526.* Althæa frutescens folio rotundiori incano *C. B. P. 316.* Althæa arborefcens. *I. B. tom. 2. l. 23. 956.*

Alcea vulgaris major *C. B. P. 316. Morisf. Hist. 2. 527.* Alcea vulgaris *I. B. tom. 2. l. 23. 953.* Flore purpureo.

Eadem flore albo , vel candidiore *C. B. P. Var. 316.*

Alcea Cannabina *C. B. P. 316. Morisf. Hist. 2. 527.* Alcea Pentaphylli folio , vel Cannabino *I. B. tom. 2. l. 23. 958.*

Alcea hirsuta , seu villosa *C. B. P. 317. Morisf. Hist. 2. 528. I. B. tom. 2. app. 1067.*

Alcea Pernambuccana Carpini folio , flosculis minimis luteis , semine simplici rostro donato *Morisf. Hist. 2. 528.* Althæa peregrina semine rostrato flore luteo minimo *Morisf. Hort. Bles. 229. Bocc. de Plant. Sic. 11. Zanon. Hist. Botan. 132. ANN.*

Eadem Zeylanica folio latiori cordiformi.

Hujus folia summis marginibus cordis figuram

ram referunt; Caules rubent; Radix perennat, Cætera cum priori conveniunt.

Alcea Virginiana Carpinifolio flosculis minimis luteis, semine duplici rostro seu aculeo prædita *Hist. Morif. 2. 528. ANN.*

Eadem Zeylanica flosculis fasciculatim congestis *ANN.*

Sunt huic flores admodum exigui fasciculatim seu in racemo densissimè dispositi; cæteræ verò partes præcedenti omnino similes.

Alcea vesicaria C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Indica magno flore C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Indica parvo flore C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea Egyptia villosa C. B. P. v. *Althæa.*

Alcea arborescens Syriaca C. B. P. v. *Althæa.*

* **ALCHIMILLA** vulgaris C. B. P. 319. *Alchimilla* perennis viridis major foliis ex luteo virescentibus *Morif. Hist. 2. 195.* *Pes Leonis*, sive *Alchimilla* *I. B. tom. 2. l. 17. 598.*

Alchimilla perennis incana argentea seu sericea fatinum provocans *Morif. Hist. 2. 195.* *Tormentilla Alpina* folio sericeo C. B. P. 326. *Pentaphyllum* sive potius *heptaphyllum* argenteum, flore muscoso *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

* *Alchimilla* annua minima hirsuta foliis infernè albicantibus *Morif. Hist. 2. 195.* *Chærophyllo* non nihil similis C. B. P. 152. *Alchimilla montana* minima *Column. Ecphr. 145.* *Perchepier* Anglorum quibusdam *I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.*

Al-

Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. Saxifraga rotundifolia aurea *C. B. P.* 309. Saxifraga aurea *Dod. I. B. tom. 3. l. 37. 707.*

Albara Pif. v. Canna Indica.

Alhagi I. B. v. Genista.

Alisma C. B. Phyt. v. Gentiana.

Alkekengi vulgò. v. Solanum.

Alliaria C. B. P. v. Hesperis.

ALLIUM sylvestre bicornè flore obsoleto *C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 385.*

Allium montanum bicornè flore exalbido C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 385.

Allium montanum capite rotundo C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 386.

Allium montanum bicornè angustifolium flore purpureo C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 386. Allium sylvestre bicornè purpureum proliferum I. B. tom. 2. l. 19. 561.

Allium sphoerocæphalum bifolium Italicum Moris. 2. 386. I. B. tam. 2. l. 13. 565.

* *Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus C. B. P. 74. Allium spærocæphalum purpureum sylvestre I. B. tom. 19. 562.*

Allium sativum C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 387.

Allium vulgare & sativum I. B. tom. 2. l. 19. 554.

Allium sativum alterum : sive Allioprasum caulis summo circumvoluto C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 787. Allii genus, Ophioscorodon dictum

etum quibusdam *I. B. tom. 2. l. 19. 559.*

Allium sativum radice simplici *C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 387.* Allium vulgare & sativum *I. B. tom. 2. l. 19. 554.*

Allium maximum multis Porraceis foliis latioribus sphærico capite ex floribus albis conflato *Moris. Hist. 2. 387.* Allium sphoericeo capite folio latiore sive Scorodoprasum alterum *C. B. P. 74.* Scorodoprassum dictum *I. B. tom. 2. l. 19. 558.*

Allium montanum foliis Narcissi majus *C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388.* Allium umbelliferum pratense *I. B. tom. 2. l. 19. 564.*

Allium montanum Narcissinis foliis minus *C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388.*

* Allium latifolium palustre *Moris. Hist. 2. 388.* Allium sylvestre latifolium *C. B. P. 74.* Allium ursinum bifolium vernum sylvaticum *I. B. tom. 2. l. 19. 569.*

Allium latifolium montanum maculatum *C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 388.* Allium Alpinum *I. B. tom. 2. l. 19. 566.* Victoralis Mas *Tab.*

ALNUS rotundifolia glutinosa viridis *C. B. P.* Alnus vulgaris *I. B. tom. 1. l. 8. 151.*

Alnus folio oblongo viridi *C. B. P. 428.*

Alni effigie lanato folio major *C. B. P. v. Mespilus.*

Alni effigie lanato folio minor *C. B. P. v. Mespilus.*

Alnus nigra baccifera *C. B. P. v. Frangula.*

ALOE

ALOE vulgaris *C. B. P.* 286. *Morif. Hist.* 2. 414.

Aloe *I. B. tom.* 3. l. 35. 696.

Aloe folio in oblongum aculeum abeunte *C. B. P.* 286. *Morif. Hist.* 2. 415. Aloe Americana

muricata *I. B. tom.* 3. l. 35. 701.

Aloe Americana minor foliis per margines frequentissimis & molliusculis spinis armatis.

Aloe vera minor *Munt. Aloedar.* 2.

Aloe Americana sobolifera.

Ex crassa fibrosa pallescente radice prodeunt folia, facie vulgaris Aloes Americanæ junioris, carnosa, succulenta, modò plana & humi procumbentia, modò canaliculata & arcuatim sursum vergentia, lætè viridia, in mucronem minus pungentem abeuntia, & in ambitu crebrioribus, exiguis, fuscis, rigidiusculis spinulis armata. Ex horum medio, quinto aut sexto à fatione anno, assurgit caulis, sex septemve pedum altitudine, striatus, compressus, solidus, durus, herbaceus, raris aliquot foliis, inferioribus longè angustioribus & tenuioribus, caulem firmiter amplectentibus, vestitus, spargens circa fastigium sex septemvè plures vel pauciores ramos, palmares, sustentantes ex brevibus crassis petiolis capitula oblonga, striata, trigona, capsularum seminalium rudimenta; E quorum cimis eriguntur flores oblongi, sex luteo viridantibus crassis obtusis petalis constructi, prominente



medio stylo flavescente, cum sex brevioribus concoloribus staminibus, longis transversis apicibus donatis. His emarcidis, perficiuntur subjectæ capsulæ, includentes semina parva, angulosa, fusca; duplici serie in tribus loculamentis disposita. Ad singulorum capsularum exortus, aliquando etiam ad ramorum & foliorum in caule sinus progerminant novæ soboles, quæ avulsæ & in terram depactæ, nullo negotio excrescunt. Hanc Aloem ex America advectam possidemus ex liberalitate Domini Philippi de Fli-nes, in cujus prædio, quod Harlemi est, superiori anno floruit.

Aloe Africana, folio triangulo longissimo & angustissimo, floribus luteis fœtidis. Iris Uvaria Promont. Bon. Sp. *Stapel in not. ad Theophr.* 336.

* *Aloe palustris* C. B. P. v. Stratiotes.

* **ALSINE** altissima nemorum C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 550.

* *Alsine* major C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 450. *Alsine* marina Dodonæi I. B. tom. 3. l. 29. 364.

* *Alsine* media C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 550. *Alsine* vulgaris sive *Morsus Gallinæ* I. B. tom. 3. l. 29. 363. ANN.

* *Alsine* minor multicaulis C. B. P. 250. *Morif. Hist.* 2. 550. *Alsine* minima I. B. tom. 3. l. 29. 364. ANN.

* *Al-*

- * *Alfine minor foliis rotundis* C. B. P. 251. ANN.
- Alfine minor Lini capitulis* C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 550. ANN.
- * *Alfine aquatica major* C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 550.
- * *Alfine aquatica media* C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 550. *Alfine longifolia uliginosis proveniens locis* 1. B. tom. 3. l. 29. 365.
- * *Alfine aquatica minor & fluitans* C. B. P. 251.
- * *Alfine palustris exigua, flosculis albis foliis lanceolatis plantaginellæ aquaticæ instar* *Mentz. pugill.* ANN.
- * *Alfine hirsuta major foliis subrotundis dilutè virentibus* *Morif. Hist.* 2. 551. *Alfine hirsuta magno flore* C. B. P. 251. ANN.
- * *Alfine hirsuta altera viscosa foliis longis saturatiùs virentibus* *Morif. Hist.* 2. 551. *Alfine hirsuta altera viscosa* C. B. P. ANN.
- * *Alfine tenuifolia* C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 251. 1. B. tom. 3. l. 29. 365. ANN.
- * *Alfine Spergula dicta major* C. B. P. 251. *Morif. Hist.* 2. 251. *Spergula* 1. B. tom. 3. l. 36. 722. ANN.
- Alfine Spergulæ facie marina perennis flore violaceo* *Morif. Hist.* 2. 551. *Alfine Spergulæ facie media* C. B. P. 251. *Spergula marina* 1. B. tom. 3. l. 36. 723.
- * *Alfine Spergulæ facie minima* I. *Commelin. Catal.* 6. ANN.
- Alfine procumbens Gallii facie Africana* ANN.

Etiamsi hæc planta primâ facie Gallium videatur, nemo tamen ambiget *Alsinæ* speciem esse, qui capsulam & semina ceu partes plantarum principes & constantiores, inspexerit. Spargit per terram ex tenui capillari radice caulículos graciles, rotundos, glabros, geniculatos, ramosos; Folia ad genicula sex septemve stellatim; Gallii modo; expansa; Intra hæc exeunt aliquot pedicelli tenuissimi, sustinentes flores nudos, stellatos, exiguos, pentapetalos, foris vire-scentes, intus pallidos, subsequenter seminibus fulvis in capsulis *Alsinæ* proximis. Annua est, ex Africa advecta, florens Augusto, propullulans quotannis ex seminibus deciduis. Sapor apparuit muricatus & ingratus.

* *Alsinæ maritima* flore rubente C. B. P. 251. ANN.

* *Alsinæ tridactylites* tectorum. Sedum tridactylites tectorum C. B. P. 285. Tradactylites tectorum flore albo I. B. tom. 3. l. 37. 762. ANN.

Alsinæ Hederula folio C. B. P. v. Veronica.

Alsinæ Veronicæ foliis flosculis cauliculis adhaerentibus C. B. P. v. Veronica.

Alsinæ Chamædrifolia flosculis oblongis cauliculis insidentibus C. B. P. v. Veronica.

Alsinæ triphyllæ cærulea C. B. P. v. Veronica.

Alsinæ scandens baccifera C. B. P. v. Solanum.

Al-

ALSINE PROCUMBENS GALLII FACIE AFRICANA.



Alfine affinis Androsace C. B. P. v. Auriculæ ur-
si Affinis.

Alfine littoralis Portulacæ foliis C. B. P. v. Ru-
biæ Affinis.

ALTHÆA arborescens glabra, Ketmia Sy-
 rorum dicta *Moris. Hist. 2. 530.* Alcea ar-
 borescens Syriaca C. B. P. 316. Alcea arbo-
 rescens glabra, Ketmia dicta *I. B. tom. 2.*
 23. 956.

Eadem flore candido C. B. P. *Var. 316.*

Eadem flore purpureo violaceo *Cat. Hort. Reg-*
Paris. 6.

Eadem floribus ex rubro & albo variis *ibid.*

Eadem flore flavo.

Althæa arborea Rosea Sinensis flore multiplici

Althæa arborea Sinensis *Moris. Hist. 2. 530.*

Rosa Sinensis *Ferrar. Flor. cult. 479.*

Althæa arborea Rosea Sinensis flore simplici

Hæc præcedenti consimilis est, nisi quo-
 flores sint simplices, ex quinque tantum pe-
 talis constructi.

Althæa arborea Indica Populi folio flore eph-
 mero. Bupariti *Hort. Malab. tom. 1. 51.* S-
 righaghas vel Arbor Solis *Zeylonensium.*

Althæa Ricini folio Virginiana.

Enata est seminibus ex Virginiâ dela-
 Planta humanam altitudinem multum e-
 cedens, ex cujus radice Ibisco simili, p-
 lidâ, longè latèquè repente, perenni, gut-
 viscosi, assurgunt coliculi glabri, viridi-

ALTHÆA RICINI FOLIO VIRGINIANA



tes, frequentibus alis subindè divisi. His adstant folia longis suffulta petiolis. Ricinæ æmula, ternis quinisvè mucronatis & circa marginem crenatis lobis dissecta. Ad horum exortus ab imo caulis ad summum usque prodeunt simul pediculi longiores & graciliores, in aliquot pedicellos tenuissimos divaricati, quorum singuli sustinent ex caliculo viridante quinquèfariam crenato, florem parvum candidum quinquè carinatis petalis in basi junctis constructum, medium occupante columellâ racemosâ innumeris violaceis apiculis exornatâ. Floris discusso sequitur capitulum, quinquè exiguis, membranaceis, angulosis, arcuè invicem conjunctis, & in acuminatum apicem coeuntibus thecis efformatum, quibus singulis includitur semen unicum parvum spadicum reniforme. Radicis virtutes eadem sunt, quæ Radici Ibisci.

Althæa Theophrasti flore luteo C. B. P. 316. Moris. Hist. 2, 531. Althæa Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon I. B. tom. 2. l. 23. 958. ANN.

Althæa Theophrasti similis C. B. P. 316. Moris. Hist. 2. 531. Abutilon Indicum I. B. tom. 3. l. 23. 959. ANN.

Eadem flore luteo minori. Abutilon Indicum flore luteo Breyn. Prodr. I. ANN.

Priori

Priori humilior est, & partibus omnibus minor.

Althæa Rosea peregrina, forte *Rosa Moscheutos* Plinii, *Corn.* 144. *Morif. Hist.* 2. 532.

Althæa Indica magno flore petalis latis & obtusis *Morif. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* magno flore *C. B. P.* 317. *Bammia* aliquatenus affinis, *Sabdariffa* *I. B. tom.* 2. l. 23. 960. *Cattu Gasturi* *Hort. Mal. tom.* 2. 71. ANN.

Althæa Indica flore parvo petalis angustis & obtusis *Morif. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* parvo flore *C. B. P.* 317. *Bammia* *I. B. tom.* 2. l. 23. 959. ANN.

Althæa Ægyptia villosa *Morif. Hist.* 2. 533. *Alcea Ægyptia villosa* *C. B. P.* 533. *Belmoscus Ægyptia* *Honorio Bellio* *I. B. tom.* 2. l. 23. 962. *Abel Mosch vulgò.* ANN.

Althæa Indica Gossipii folio Acetosæ sapore *Alcea acetosa trifido folio* *Indiæ Orientalis* *Breyn. Prodr.* 1. ANN.

Radicem habet fibrosam, albicantem, singulis annis pereuntem; Caulem* tripedalem, viridem, glabrum aliquando angulosum, ramosum, in fila ductilem; Folia trilobata, latè viridia, formâ & magnitudine ad *Gossipii* folia accedentia, longis innixa petiolis; Ad horum sinus prodeunt flores ex brevissimis petiolis ampli, rosei, incarnati, ex quinque petalis in basi arctè, junctis &

intermedio pistillo, racemoso, concolori ex-
 tructi. His subjicitur caliculus quinque fo-
 liatus, ex quo post florum exanthefin pro-
 dit capsula membranacea, oblongo-rotun-
 da, pentagona, quinis intus loculamentis
 donata, in quibus semina compressa ex ruf-
 fo spadicea congenerum more. Folia sub-
 acidum & leviter viscosum præbent sa-
 porem & vel sola vel cum cæteris oleribus
 cocta ab Indis comeduntur. Caules, non
 minus quàm apud nos Cannabini, in fila
 ducuntur, & ad funes texendos usur-
 pantur; Hinc in agris & hortis Indo-
 rum quotannis feruntur. Hujus & alia
 datur species foliis Cannabinis, à *Gar-
 zia ab Horto* BANGUE dicta, cujus
 integra historia tractabitur in Musæo Zey-
 lanico, quod in lucem aliquando prodit-
 bit.

Althæa Indica Vitis folio, flore amplo flavo
 pendente. *Althæa Indica* non spinosa flo-
 re amplo pendulo flavo. *Breyn. Prod. 2.*

Ex seminibus, in Insulâ Zeylonâ collectis,
 germinavit nobis hæc elegantissima planta,
 quæ ex radice albâ, lignosâ protrudit caules,
 modò unicum, modò plures, bicubitales,
 lignosos, rectos, glabros, aliquando sub-
 hirsutos, imâ parte rubentes, summâ viri-
 dantes, in multos ramos brachiatos; Cum
 his simul exurgunt folia longis insidentia

petiolis , tribus quinifve ſegmentis diviſa, foliis *Vitis* haud abſimilia, ſed rigidiora, craſſiora, aliquot venis ac inſignibus nervis donata ; Ad alarum ſummitates prodeunt breves tenuiſſimi pedicelli , quibus nolarum inſtar appendent flores ampli *Rosæ* minoris magnitudine , ad ſolem aperti, cæteroquin clauſi , quinque petalis flaveſcentibus , unguibus violaceis hoſericis, in fundo junctis , conflati , prominente è medio piſtillo , copioſis apiculis puniceis eleganter paniculato ; Floris baſin tegit caliculus parvus in quinque profundas acuminatas viridantes crenas , quaſi totidem foliola , diſſectus ; Huic verò incumbunt quina aut ſeptena anguſtiſſima ſetacea foliola ſtellatim deſcuſſata. Floribus emarcidis ſuccedunt vaſcula membranacea , duriuſcula , ſubhirmiſuta, ex quinque ſulcis vel alis, totidemque loculamentiſ constantia , in quibus continentur ſemina compreſſa , fuſca, reniformia, congenerum more. Viribus convenit cum *Alcea* noſtra vulgari. Iiſdem in locis, ubi hæc provenit, invenitur & alia ſpecies foliis aſperis profundè laciniatis , foliorum *Cannabis* inſtar, ſaporis acidi ; Caulibus, aduncis hamis undique armatis, ceteris verò partibus ſuperiori ſimillimis. Videatur *Bontius* l. 6. 113. qui hanc alteram ſpeciem videtur deſcripſiſſe.

Al-

ALTHÆA INDICA FOLIO VITIS, FLORE
AMPLO FLAVO PENDENTE.



Althæa vesicaria Veneta Moris. Hist. 2. 533. Alcea Vesicaria C. P. B. 317. Alcea solisequa, multis Veneta I. B. tom. 2. l. 21. app. 1068. ANN.

Althæa vesicaria Capitis Bonæ Spei Moris. Hist. 2. 533. ANN.

Althæa Diosc. & Plinii C. B. P. v. Malva.

Althæa frutescens folio rotundiori incano C. B. P. v. Alcea.

Althæa frutescens folio acuto parvo flore C. B. P. v. Malva.

Althæa peregrina semine rostrato flore luteo minimo Bocc. v. Alcea.

Alysson siliquâ latâ asperâ I. B. v. Leucojum.

Alyssum verticillatum foliis profunde incisiss C. B. P. v. Marrubium.

Amara dulcis I. B. v. Solanum.

A M A R A N T H U S foliis variegatis, seu tricoloribus, seu variè coloratis Psittaci plumas referentibus *Moris. Hist. 2. 602. Amaranthus folio variegato C. B. P. 121. Symphonia Dalechampsio, sive Amaranthus tricolor I. B. tom. 2. l. 23. 970. folio colore hilariori extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi C. B. P. var. 121. ANN.*

Idem folio colore obscuriori C. B. P. Var. 121.

Serotinus Cat. Hort. Reg. Pars. II. ANN.

Amaranthus paniculis propendentibus, semine rubro, flore serotino elegantis coccinei coloris Moris. Hist. 2. 602. ANN.

Ama-

Amaranthus maximus *C. B. P.* 120. paniculus
 erectis femine albo. **Blitum maximum** sive
Amaranthus major, femine albo *I. B. tom.* 2.
l. 23. 968. ANN.

Idem Semine rubello: qui granis rubris *Petri*
Cicræ C. B. P. Var. 121. ANN.

Idem Semine fusco. ANN.

Idem paniculis viridantibus seu herbaceis.
 ANN.

Amaranthus major paniculis surrectis rubris
Morif. Hist. 2. 602. **Amaranthus simplici**
 paniculâ *C. B. P.* 121. **Amaranthus purpu-**
reus *I. B. tom.* 2. *l.* 23. 968. ANN.

Idem paniculis coccineis seu phœniceis *Morif.*
Hist. 2. 602. ANN.

Idem paniculis viridibus *Morif. Hist.* 2. 502.
 ANN.

Idem paniculis flavescentibus. ANN.

Amaranthus spicatus sericus, flore luteo vire-
 scente *Cat. Hort. Reg. Par.* 16. ANN.

Amaranthus spicis carneis interfusâ flavedine
 micantibus. *ibid.* ANN.

Amaranthus singularibus paniculis flammeo
 colore lucentibus. *ibid.* ANN.

Amaranthus paniculis obsoletè violaceis.
 ANN.

Amaranthus paniculis ex fusco purpurascen-
 tibus. ANN.

Amaranthus minor paniculis surrectis, aut
 stramineis spicis cristatis *Morif. Hist.* 2. 603.

Ama-

Amaranthus paniculâ incurvâ C. B. P. 121.

Paniculis purpureis. ANN.

Idem paniculis luteis. ANN.

Idem paniculis coccineis. ANN.

Idem paniculis luteo pallidis. ANN.

Amaranthus cristatus rubicundissimo florâ

Cat. Hort. Reg. Paris. 10. purpureus paniculâ speciosâ cristatâ I. B. tom. 2. l. 23. 969.

ANN.

Amaranthus reticulatus seu corniculatus serotinus minor Cat. Hort. Reg. Paris. 10.

ANN.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ majori

puniceo colore splendidâ Cat. Hort. Reg.

Paris. ANN.

Amaranthus Indicus spinosus spicâ herbaceâ

Blitum monospermum Indicum aculeatum

Breyn. Prodr. 18. Kathutampala Zeylonensis. ANN.

Satis amplâ pro plantæ ratione nititur radice, albente lignosâ & parùm fibrosâ, ex cujus capite oriuntur caules quàmplures, duorum triumvè pedum longitudine, succulenti, lucidi, rotundi, leviter striati, viridantes, parte quâ solem respiciunt rufescentes, frequentibus inæqualibus ramis & foliis intra binos herbaceos breves pungentes aculeos prodeuntibus, vestiti. Folia longis adhærentia pediculis Bliti foliis sunt longiora & angustiora, obtusè

tusè mucronata, sinuata, rugosa, circa margines sæpe, undulatâ, parte infernâ ex viridi candicantia, supernâ verò atro-viridia, in sinu aliquandò obscuris maculis affecta. Flores tùm è summo caulis tùm è foliorum alis emicant in spicas vel simplices vel multiplices quasque paniculatas densissimè congesti, exiguis quinque angustissimis & tenuissimis petalis herbacei coloris conflati, quibus subjicitur capsula rotunda parva, in quâ semen nigrum lucidum compressum more affinium. Annua hæc planta provenit passim in India, locis cultis & incultis sese propagans ex seminibus deciduis. In hortis nostris perficitur autumno. Hujus folia una cum reliquorum Amaranthorum in India nascentium foliis cocta comeduntur. Zeylonensibus audit Kathutampala, hoc est, Pala sive Amaranthus spinosus.

Amarantho adfinis Breyn. v. Gnaphalium.

Ambervalis flos vulgò. v. Polygala.

Ambrette vulgò. v. Cyanus.

AMBROSIA maritima *C. B. P.* 138. Ambrosia quibusdam *I. B. tom. 3. l. 26.* 190. Foliis Absinthii odoratis humilior ANN.

Eadem foliis Artemisiæ inodoris elatior. ANN.

Hujus virgultis trium quatuorve pedum altitudine assurgentibus adhærent folia
priori

AMARANTHUS INDICUS, SPINOSUS,
SPICA HERBACEA.]

33



priori ampliora, Artemisiæ foliis proxima, profundius laciniata, supernè viridia, infernè pallescentia, odoris nullius evidentis. Flores in summis spicis apparent minores, foris viridantes, intus nigricantes, quos singulos excipit semen unicum, muricatum, vulgari simillimum. Prodiit nobis ex seminibus à Nobilissimo Domino Johanne Baptista Ciasii Venetiis huc transmissis.

Ambrosia campestris repens C. B. P. v. Nasturtium.

AMMI majus C. B. P. 159. Ammi annum *Morif. Umbellif.* 21. Ammi vulgare majus latioribus foliis, semine minus odorato *I. B. tom. 3. l. 27. 27. ANN.*

Ammi perenne *Morif. Umbellif.* 22. Eryngium arvense, foliis ferræ similibus C. B. P. 386. Crithmum quartum Matthioli umbelliferum *I. B. tom. 3. l. 27. 195.*

Ammi semine tenuissimo & odoratissimo *I. B. tom. 3. l. 27. 25.* Ammi alterum semine Apii C. B. P. 159. ANN.

Amomum Plinii vulgò. v. Solanum.

AMYGDALUS fativa C. B. P. 441. putamine duro C. B. P. var. 442. Amygdalus dulcis *I. B. tom. 1. l. 2. 174.*

Amygdalus dulcis putamine molliore C. B. P. var. 442.

Amygda-

AMBROSIA MARITIMA ARTEMISIÆ FOLIIS 35
INODORIS ELATIOR,



Amygdalus amara C. B. P. *Var.* 441. I. B. *tom.* 1.
l. 2. 174.

Amygdalus Indica nana. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 11.

Arbustula est fruticosa, radice tenui, albâ, reptatrice; Caudice digitum crasso, trium quatuorve pedum altitudine, Ramis crebris, gracilibus, quos pallidè flavescentis tegit cortex; Foliis, Floribus, & Fructibus ab *Amygdalo sativa*, non nisi parvitate, differentibus. Frequens occurrit in Belgarum hortis, Flores Vere, Fructus autumnoperciciens, veluti ceteræ hujus sortis species.

Amygdalus Africana flore simplici plenove vulgò. v. *Persica malus.*

Anacamferos I. B. *ejusque species.* v. *Telephium.*

A NACARDIUM occidentale Cajous dictum osficulo reni leporis figurâ. *Anacardii alia species* C. B. P. 512. *Cajous* I. B. *tom.* 1. l. 3. 336. *Kapa-Mava Hort. Mal. tom.* 3. 65. *Arbor Acajou, vulgò Cajou.* *Pis. Mantiss. arom.* 193.

* **A** NAGALLIS flore phoeniceo C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 568. *Anagallis phoenicea mas* I. B. *tom.* 3. l. 29. 369. ANN.

* *Anagallis flore purpurascente* C. B. P. *var.* 252. ANN

Ana-

* *Anagallis flore cœruleo* C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 569. *Anagallis cœrulea* *Fœmina* l. B. tom. 3. l. 369. ANN.

Anagallis flore carneo *Park. Theatr.* 558. ANN

Anagallis cœrulea, foliis binis ternilve ex ad-
verso nascentibus C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2.
569. ANN.

Eadem foliis quaternis ex adverso nascenti-
bus, flore ampliore. ANN.

Anagallis lutea nemorum C. B. P. 252. *Morif. Hist.* 2. 569. *Anagallis lutea Nummulariæ*
similis l. B. tom. 3. l. 29. 370.

Anagallis aquatica major ejusquè species C. B. P.
v. *Veronica*.

Anagallis aquatica minor ejusquè species C. B. P.
v. *Veronica*.

A NAGYRIS foetida C. B. P. 391. *Anagyris*
vera foetida l. B. tom. 2. l. 11. 364.

Anagyris non foetida major vel Alpina C. B. P.
391. *Laburnum arbor trifolia*, *Anagyridi*
similis l. B. tom. 1. l. 11. 361.

Eadem folio variegato.

Anagyris non foetens minor C. B. P. 391.

A NANAS Acoftæ & Linscotti l. B. tom. 3. l.
25. 95. *Ananas fructus Bonti* l. 6. 145.
Ananas Pifon. l. 4. 195. *Matzatli* feu *Pinea*
Indica Hernand. 311. *Carduus Brasilianus*
foliis *Aloes* C. B. P. 384.

ANCHUSA prima Matthioli C. B. *Matth.*
703.

Eadem Cretica perennis foliis asperis bullatis verrucosis. Borrigo sylvestris perennis Candia, flore puniceo *Zanon. Hist. Bot.* 49.

Anchusa lanuginosa incana, pullo flore. Echium sylvestre lanuginosum C. B. P. 254. Echium pullo flore I. B. tom. 3. l. 33. 588.

ANN.

* Anchusa angustifolia procumbens, Lithospermum flore albo. Lithospermum arvense, radice rubra C. B. P. 258. Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echi I. B. tom. 3. l. 33. c. 8. 592. ANN.

* Eadem latifolia, flore purpureo. Lithospermum minus repens latifolium C. B. P. 258. Lithospermum majus Dodonci, flore purpureo, semine Anchusæ I. B. tom. 3. l. 33. 592.

* Anchusa Scorpioides hirsuta arvensis. Echium Scorpioides arvense C. B. P. 254. Echium Scorpioides Solisequum, flore minore I. B. tom. 3. l. 33. 589. ANN.

* Eadem glabra palustris. Echium Scorpioide palustre C. B. P. 254. Echium Scorpioide solisequum, flore majore I. B. tom. 3. l. 33. 589.

Androsace Matthioli altera I. B. v. Auricula urfi adfinis.

Androsæmum ejusque species. v. Hypericum.

ANEMONE sylvestris alba major C. B. P. 176.

Morif. Hist. 2. 425. Anemone magna alba, plurimâ parte anni florens I. B. tom. 3. l. 30. 411.

Anemone Geranii rotundo folio, purpurascens C. B. P. 173. *Morif. Hist. 2. 425.*

Anemone Italica latiusculis spinosis foliis, 3. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè purpurascens C. B. P. 173. Anemone latifolia ex purpurâ dilutiore albicante flore, 4. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè rubens C. B. P. 173. Anemone latifolia flore ad carneum colorem tendente, albicantibus unguibus 5. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Anemone latifolia simplici carneo flore C. B. P. 173. *Morif. Hist. 2. 425.* Anemone latifolia purpurei ferè coloris, unguibus albicantibus, Byzantina, 6. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore purpureo saturo C. B. P. 173. Anemone latifolia, flore coloris purpurei saturi, magnis unguibus, albis, infimâ parte purpureis, 8. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore purpureo violaceo C. B. P. 173. Anemone latifolia violacea, unguibus argenteis, 12. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore carneo C. B. P. 173. Anemone

latifolia flore veluti carneo, unguibus albis,
14. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore variegato *C. B. P. 173.* Anemone
colore saturatiùs ex purpureo rubens, oris
coccineis, unguibus albis magnis, Byzanti-
na, 7. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore coccineo *C. B. P. 174.* Anemone
latifolia flore coccineo, itemquè unguibus,
16. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 404.*

Ejusdem variæ species, floris colore invicem
discrepantes.

Anemone tenuifolia, flore multifido dilutè
purpurascente *C. B. P. 174.* Anemone te-
nuifolia, flore pluribus foliis constante, car-
nei quasi coloris, 9. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 406.*

Eadem Oenantes foliis, flore violaceo hexa-
phyлло *C. B. P. 174. Moris. Hist. 525.* Ane-
mone tenuifolia purpurea, foliis, oris in acu-
tum desinentibus, 2. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Eadem coccineo flore hexaphyllo *C. B. P. 174.*
Anemone tenuifolia coccinea, unguibus ex
pallido fusco & albo coloribus mixtis, 3.
Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Ejusdem varietates aliæ, mirâ colorum in flo-
ribus elegantia se commendant.

Anemone latifolia maxima versicolor *C. B. P. 176.*
Anemone hortensis pleno flore versi-
color *Moris. Hist. 2. 426.* Anemone latifo-
lia

lia, flore pleno variegato *I. B. tom. 3. l. 30.*
404.

Eadem flore coccineo *C. B. P. 176. Moris. Hist.*
2. 426. *Anemone latifolia*, pleno flore coc-
cineo, sive Pavo major. 2. *Clusii I. B. tom. 3. l.*
30. 405.

Ejusdem species variæ, coloris in flore diver-
sitate invicem discretæ.

Anemone tenuifolia multiplex rubra C. B. P.
167. *Anemone tenuifolia*, flore coccineo
pleno. *Eyst. Moris. Hist. 2. 426.*

Eadem flore cœruleo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore purpureo, seu multiplex purpu-
rea *C. B. P. 176.*

Eadem flore ex atro purpurascens, seu multi-
plex atro purpurascens *C. B. P. 176.*

Eadem Byzantina, flore carneo vivacissimo
Moris. Hist. 2. 426.

Ejusdem varietates plurimæ, petalorum nume-
ro, magnitudine, colore & formâ, pro vario
lascivientis naturæ lusu inter se certantes.

Anemonæ affinis Æthiopica, fibrosâ radice,
flore Asteris, *Taraxaci* foliis subincanis.
Chrysanthemum, *Stoebes* foliis latioribus.
Breyn. Prod. 23. *Aster Jacobææ* foliis la-
tioribus vulgò. ANN.

Eadem foliis angustioribus. *Chrysanthemum*
Africanum, *Stoebes* foliis angustioribus
Breyn. Prod. 23. ANN.

43 ANEMONÆ AFFINIS ÆTHIOPICA, FIBROSA
RADICE, FLORE ASTERIS, TARAXACI
FOLIIS SUB INCANIS.



Prior spargit per terram folia digito longiora, formâ inter Taraxacum & Stoebem mediâ, pronâ parte pallidè virentia, supinâ incana & subhirsuta, in aliquot lacinias, situ modò opposito, modò alterno, intercedentibus longioribus intervallis, dissecta; Inter hæc prodeunt cauliculi terni, quaterni, pluresve, dodrонтales, molleculi, succo aquoso pleni, angulosi, viridantes, atro puniceis latiusculis, per longitudinem excurrentibus, striis inscripti, quæ caules eâ potissimùm parte, quâ humi procumbunt, penitus videntur obliterare; ita ut nihil aut parùm viriditatis in iis appareat. E medio caulis eriguntur aliquot alæ, digito longiores, sustinentes è capitulo rotundo squamato florem amœnum, amplum, radiatum, discoideum, facie Asteris, radiis interioribus omninò aureis, exterioribus pallidè puniceantibus striis inscriptis; medio verò disco expuniceo nigricante, qui cœlo sereno croceum spirat odorem. Post hujus exanthemum sequuntur capitula facie Anemonum rotunda, nuda, tomentosa, pallida, quibus involvuntur semina parva, spadicea, dura, quæ autumnò fata, subsequente vere progerminant, Radice fibrosâ albâ tenui quotannis pereunte. Nascitur aridis, montosis, apricis, ad Promontorium Bonæ Spei, unde semina ad nos sunt delata.

Posterior iisdem locis reperitur, Foliis priori angustioribus; cætera, verò simillimis. De utriusque viribus nihil certi constat. Turgent succo aquoso, nullo evidenti prædito sapore.

Anemone trifolia Dodonæi Moris. I. B. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore majori C. P. B. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore carneo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno albo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno purpureo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno roseo C. B. P. v. Ranunculus.

Anemone nemorosæ adfinis peregrina, 2. Clusii herbaceæ caloris C. B. P. v. Ranunculus.

ANETHUM hortense C. B. P. 147. Anethum Moris. Umbellif. 36. I. B. tom. 3. l. 27, 6. ANN.

Anethum Pernambuccense. ANN.

Convenit cum præcedenti, nisi quod semina sint minora, sapore & odore gratiora.

ANGELICA fativa C. B. P. 155. I. B. tom. 3. l. 27. 140. Angelica fativa, seu Officinarum Moris. Umbell. 9. ANN.

* An-

* *Angelica sylvestris major, & Angelica aquatica* C. B. P. 155. *Angelica sylvestris magna vulgarior* I. B. tom. 3. lib. 27. 144. *Angelica sylvestris Moris. Umbell. 9. ANN.*

Angelica sylvestris montana C. B. P. 156. *Moris. Umbell. 9. Archangelica* I. B. tom. 3. l. 27. 143. ANN.

Angelica Acadiensis flore luteo *Dodart. Mem.* 55.

* *Angelica sylvestris minor sive erratica* C. B. P. 155. *Angelica Podagraria dicta Moris. Umbell. 9. Angelica sylvestris repens* I. B. tom. 3. l. 27. 145.

Angelica lucida Canadensis Cornuti 97. *Moris. Umbell. 9. ANN.*

Angelica baccifera Canadensis Park. v. Christophoriana.

ANGURIA *Citrullus dicta* C. B. P. 312. *Moris. Hist. 2. 28. Citrullus folio Colocynthis secto, semine nigro, quibusdam Anguria* I. B. tom. 3. l. 16. 235. ANN.

Eadem Indica maxima. ANN.

Anil, seu Anir. v. Colutea.

ANISUM *herbariis* 159. C. B. P. *Moris. Umbell. 25. I. B. tom. 3. l. 27. 92. ANN.*

Anisum dulce Melitense Moris. Umbell. 75.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce Melitensibus C. B. P. 146.

* ANO-

- * *ANONIS* purpurea vulgaris spinosa, flore purpureo, siliquis erectis, lentiformibus *Morif. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinosa flore purpureo *C. B. P. 389.* *Anonis* sive *Resta bovis* vulgaris, purpurea, spinosa *I. B. tom. 2. l. 17. 391.*
- * *Eadem* albido flore *C. B. P. Var. 389.* *Anonis* sive *Resta bovis* vulgaris, alba, spinosa *I. B. tom. 2. l. 17. 391.*
- Anonis* non spinosa, cauliculis procumbentibus. *An Anonis non spinosa repens Morif. Hist. 2. 169.*
- * *Anonis* purpurea, spicata, erecta, perennis, longifolia, siliquis erectis lentiformibus *Morif. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinis carens purpurea *C. B. P. 389.* *Anonis* non spinosa, purpureo flore *I. B. tom. 2. l. 2. 17. 393.*
- Anonis* purpurea procumbens verna seu præcox, fruticosa, annua, viscosa, siliquis crassioribus, lentiformibus, rariùs dispositis *Morif. Hist. 2. 169.* ANN.
- Anonis* lutea sylvestris minima, siliculis lentiformibus, erectis, bivalvibus *Morif. Hist. 2. 170.* *Anonis* spinosa lutea minor *C. B. P. 389.*
- Anonis* purpurea perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè serratis *Morif. Hist. 2. 170.* *Cicer* sylvestre latifolium tryphyl-
lum *C. B. P. 34.* *Cicer* sylvestre trifolium *I. B. tom. 2. l. 17. 295.*

Omnibus partibus major & elatior est
priori.

Anonis purpurea verna seu præcox perennis,
frutescens, flore rubro amplo *Morif. Hist. 2.*
170. Cicer Arboreum Indicum perenne.
Zanon. 66. Annonis purpurea frutescens,
non spinosa. *Dodart. Mem. 57.*

Anonis lutea, annua, recta, hirsuta, viscosa, si-
liquis hirsutis brevioribus *Morif. Hist. 2.*
171. Trifolius adfinis Anonis minima, hir-
suta Cherleri *I. B. tom. 2. l. 17. 394. ANN.*

Anonis lutea annua filiquâ glabrâ longiore
& crassiore *Morif. Hist. 2. 171.* Anonis vi-
scosa, spinis carens, lutea minor, flore pendu-
lo *C. B. P. 389.* Trifolius adfinis Anonis pu-
silla, glabra, fruticans Cherleri *I. B. tom. 2. l.*
17. 394. ANN.

Anserina vulgò. v. Pentaphylloides.

Anthora C. B. P. v. Aconitum.

ANTIRRHINUM majus rotundiori folio
C. B. P. 21. ANN.

Antirrhinum majus longiore folio *Morif. Hist.*
2. 505. Antirrhinum majus alterum, folio
longiore *C. B. P. 211.* Antirrhinum vulgare
I. B. tom. 30. l. 30. 462. flore roseo. ANN.

Idem flore rubente *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem ex candido dilutè purpurascente *C. B. P.*
Var. 211. ANN.

Idem flore albo, oris rubris *C. B. P. Var. 211.*
ANN. Idem

Idem oris rubentibus *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem oris luteis *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Antirrhinum longifolium majus Italicum flore amplo, niveo, lactescente *Cat. Hort. Reg. Paris. 21. ANN.*

Antirrhinum angustifolium, flore rubro. Antirrhinum arvense majus *C. B. P. 212. Antirrhinum arvense minus Moris. Hist. 2. 505.*

Antirrhinum angustifolium sylvestre *I. B. tom. 3. l. 30. 464. ANN.*

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 22. ANN.*

Antirrhinum arvense minus C. B. P. v. Linaria.

ANTHYLLIS leguminosa Loto affinis, Vulneraria pratensis *Moris. Hist. 2. 182. Loto affinis Vulneraria pratensis C. B. P. 332. Vulneraria rustica I. B. tom. 2. l. 17. 362.*

Eadem, hirsuta herba, flore suavè rubente *Moris. Hist. 2. 181. Loto affinis hirsuta flore subrubente C. B. P. 333.*

Anthyllis leguminosa Loto affinis major vesicaria, Hispanica *Hist. Moris. 2. 181. Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P. 332. Trifolium Halicacabum, sive vesicarium I. B. tom. 2. l. 17. 361. ANN.*

Anthyllis nivea I. B. v. Polygonum.

Anthyllis maritima Alfine foliis C. B. P. v. Polygonum.

An.

Anthyllis Chamæpithyides frutescens C. B. P.
v. Kali.

Anthyllis maritima Lentifolia C. B. P. v. Ti-
thymalus.

* **A**PARINE vulgaris C. B. P. 334. I. B. tom.
3. l. 36. 713.

Aparine semine levi *Cat. Hort. Reg. Paris.* 21.

Aparine levis *Park. Theat.* 567. ANN.

Aphaca vulgò. v. Lathyrus.

Aphyllantes Monspeliensibus I. B. v. Caryo-
phyllus.

Apios Americana Corn. v. Astragalus.

APIUM hortense maximum C. B. P. 153;
ANN.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgò
C. B. P. 153. Apium sativum, seu hortense

vulgatius, latifolium planum *Morif. Umbell.*

23. Apium hortense, vulgò Petroselinum
planum I. B. tom. 3. l. 27. 97. ANN.

Apium, vel Petroselinum crispum C. B. P. 153.

Morif. Umbell. 23. Apium hortense vulgò

Petroselinum crispum I. B. tom. 3. l. 27. 97.

ANN.

Apium montanum, folio tenuiori C. B. P. 153.

Apium sativum hortense angustifolium

Morif. Umbell. 23. ANN.

Apium hortense latifolium C. B. P. 153. Apium

latifolium, seu hortense maximum *Morif.*

D

Um-

Umbell. 21. Apium hortense magnum, vulgari hortensi seu Petroselino vocato, sapore idem, sive Anglicanum quibusdam *I. B. tom. 3. l. 27. 99. ANN.*

* Apium palustre & Apium Officinarum *C. B. P. 154.* Apium palustre, Paludapium dictum *Morisf. Umbell.* 21. & 23. Apium vulgare ingratius *I. B. tom. 3. l. 27. 100. ANN.*

* Apium palustre minus cauliculis procumbentibus, ad alas floridum. *ANN.*

Hoc præcedenti est conforme; ast omnibus partibus minus & gracilius, cauliculis humi procumbentibus, alis quàm plurimis donatis, ad quarum sinus oriuntur parvæ florum albicantium umbellæ, quos excipiunt semina exigua, striata. Facultatibus nihil aut parum differt à vulgari. Luxuriat locis undosis, & aquosis Belgicæ.

Apium dulce Celeri Italorum *Hort. Reg. Parisf. 22.* Apium palustre Seleri dictum *Morisf. 21.* Apium Italicum Seleri dictum. *ibid. 22. ANN.*

Apium Macedonicum *C. B. P. 154.* Apium semine villoso seu incano Macedonicum *Morisf. Umb. 21.* Apium, sive Petroselinum Macedonicum *I. B.*

Apium peregrinum foliis subrotundis *C. B. P. 153.* Apium semine villoso, seu incano

pe-

peregrinum 1. *Clusii. Moris. Umbell.* 21.
ANN.

Apium montanum, folio ampliore C. B. P. v.
Oreoselinum.

Apium sylvestre, lacteo succo turgens C. B. P.
v. Thysselinum.

Apium peregrinum, *Cicutæ* folio C. B. P. v.
Oreoselinum.

APOCYNUM folio subrotundo C. B. P. 302.
Apocynum folio rotundiore, flore ex albo
palescente *I. B. tom. 2. l. 15.* 134.

Apocynum folio oblongo C. B. P. 303, Apo-
cynum, sive Periploca scandens, folio lon-
go, flore purpurante *I. B. tom. 2. l. 15.*
133.

Apocynum Scammoniaæ facie Monspeliacum,
foliis rotundioribus. Scammonia Monspe-
liaca, foliis rotundioribus C. B. P. 294.
Scammonea Monspeliaca, flore parvo *I. B.*
tom. 2. l. 15. 136.

Apocynum Scammoniaæ facie, Monspeliaco
affine, foliis acutioribus. Scammonia Mon-
speliacæ affinis, foliis acutioribus C. B. P. 294.
Apocynum latifolium, amplexicaule *I. B.*
tom. 2. l. 15. 135.

Apocynum Asclepiadis folio, flore nigro.
Asclepias nigro flore C. B. P. 303. Ascle-
pias flore nigro quorundam *I. B. tom. 2. l. 15.*
140.

Apocynum rectum latifolium Americanum majus *Park. Theatr.* 385.

Apocynum latifolium Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus spicatis maximis pallidè violaceis, filiquis folliculatis rugosis. Apocynum Ægyptiacum lactescens, filiquâ Asclepiadis *C. B. P.* 303. Beidelsar Alpini, sive Apocynum Syriacum *I. B. tom.* 2. l. 15. 136. *Beideloffar. Alpin. de Plant. Ægypt.* 85. *Ericu Hort. Malab. tom.* 2.

53.

Apocynum latifolium Syriacum incanum erectum, floribus umbellatis minoribus, obsoletè purpurascentibus, filiquis folliculatis rugosis. Apocynum majus Syriacum rectum *Corn.* 91. *Beideloffar. Observ. Veslin. in Alpin.* 28.

Apocynum angustifolium Canadense viride erectum, floribus umbellatis minoribus rubicundis. Apocynum minus rectum Canadense *Corn.* 93.

Idem humilius folio angustissimo.

Apocynum Americanum, folius Androsæmi majoris, floris Lili convallium suave rubentis, *Cat. Hort. Reg. Paris.* 22. *Boccon de Pl. Sic.* 32. *Dodart. Mem.* 59.

Apocynum humile Aizoides filiquis erectis Africanum. Fritillaria crassa Promontorii Bonæ Spei *Stapel. in not. ad Theophr.* 335.

Hujus

APOCTNUM HUMILE AIZOIDES, SILI-
QUIS ERECTIS, AFRICANUM.



Hujus Plantæ iconem inepto nomine Fritillariæ crassæ à Justo Heurnio in Belgiam transmissam, exhibet Bodæus à Stapel in notis ad Theophrastum ; Quoniam verò ico & eidem subnexa descriptio imperfecta & mendosa est, placuit, accuratiorem plantæ historiam hîc proponere. Locis montosis, saxosis, præruptis, aridis ad Promontorium Bonæ spei luxuriant è radice albâ exili fibrosâ, cauliculi, modo humi prostrati, modo obliquè ascendentes, spithamum & amplius longi, valdè ramosi, digitum crassi, aphylli, læte viridantes, ingruente verò tempestate rigidiori, ex livore ad purpureum vergentes, propemodum trigoni, denticulati, & circumquaque brevibus, crassis, obtusis quasi aculeis, seu prominentibus dentibus, angulorum præruptorum rupium instar, stipati, succo viscido acri amaricante, viroso & nauseoso turgentes. Ad dentium sinus prodit pediculus digito brevior, tenuis, pallidè virescens, vel ex livido purpurascens, communiter in tres, rarò in quinque foliaceos cuspides abiens, sustinens florem amplum, planum, monopetalum, crassum, quinque acuminatis laciniis expansum ; foris glabrum viridantem, quinque purpurascens per longirudinem striis inscriptum ; intus tenacem, coriaceum, rugosum, flavescens, puniceis maculis ele-

eleganter conspersum, odoris foetidi, viperini; ex hoc protuberat umbilicus orbicularis, ejusdem cum flore consistentiæ & coloris, occupans ferme mediam floris partem, cujus centrum concavum tegit stella quinque radiis compressis puniceis in extremo bifidis lividisque constructa, huic insidet brevissima crassiuscula columella, emittens in imo radios quinque, teretes rigidos, pallide punicantes, in summo totidem alios brevissimos concolores. Florem deciduum sequuntur, siliquæ gemellæ erectæ virides spithamum longæ, digiti crassitie, includentes Apocynorum more semina orbiculata, compressa, tenuia, marginibus crassiusculis, castanei coloris, imbricatim invicem incumbentia, quibus singulis insident flocci sericei candidi, ad solem aureis micis fulgentes. Culturam exigit quam Opuntia spinosa; Solem auramquæ calidiorem amat, Septentrionalem verò &, hyemale frigus in tantum reformidat, ut illicò livefcet, arefcet & pereat. Propagatur tam semine, quàm avulsis ramulis, in terram depactis. Virtutem possidere cum Apocynis communem, indicant acris, amarus, nauseosus sapor & virosus odor.

AQUIFOLIUM baccis rubris. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato C. B. P. 425. Aquifolium, sive Agrifolium vulgò I. B. tom. 1. l. 7. 114.

Idem foliis ex luteo variegatis, *Cat. Hort, Reg. Paris. 22.*

Idem foliis ex albo variegatis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis aureis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis aureis.

Aquifolium baccis luteis.

Hoc à vulgari differt baccis luteis, & foliis ex viridi nigricantibus. Luxuriat in Angliâ cum cæteris suæ fortis.

* **A**QUILEGIA sylvestris C. B. P. 144. Aquilegia flore simplici I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia hortensis simplex C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia flore albo simplici C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484. *Descr.*

Eadem castanei coloris C. B. P. 144.

Aquilegia montana magno flore C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia hortensis multiplex, flore magno C. B. P. 144. Aquilegia flore pleno, sive multi-

tiplici *I. B. tom. 3. l. 30. 485.* flore coeruleo pleno *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno albo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno incarnato *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore purpureo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore rubro *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno, castanei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 23.*

Eadem variegata *C. B. P. Var. 145.* flore variè mixto, maculato *ibid. 144.*

Aquilegia hortensis multiplex, flore parvo *C. B. P. 145.*

Aquilegia hortensis, multiplici flore inverso *C. B. P. 145.* *Aquilegia* flore pleno inverso *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Aquilegia flore roseo multiplici *C. B. P. 245.*

Stellata, flore purpureo *C. B. P. Var. 245.*

Aquilegia flore simplici & pleno, non corniculato *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Eadem stellata, rubescens *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore violaceo *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore albo, minutissimis nigris punctis ornata *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore cinereo, punctis purpureis asperso, *Cat. Hort. Reg. Paris. 23.*

Eadem stellata, flore carneo *C. B. P. Var. 145.*

Aquilegia degener, virescens *C. B. P. 245.*

Aquilegia degener *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Archidna vulgò. v. *Lathyrus.*

Aracus, sive *Arachus* vulgò v. *Vicia.*

Arantia vulgò. v. *Malus Arantia*.

Arbor Fraxini folio C. B. P. v. *Azadarach*.

Arbor Judæ vulgò. v. *Siliqua sylvestris*.

Arbor lanigera Bontii v. *Gossampinus*.

Arbor Platani folio, fructu Peponum magnitudine C. B. P. v. *Pepo arborescens*.

Arbor Solis. v. *Althea*.

ARBUTUS folio serrato C. B. P. 560. *Arbutus* : *Comarus Theophrasti* I. B. tom. I. l. I. 83. *Unedo Plinii* vulgò.

Arbutus folio non serrato C. B. P. 460. *Andrachne Theophr.* I. B. tom. I. l. I. 87.

Arbutus non Arbutus Virginiana vulgò. v. *Sorbus*.

Archangelica I. B. v. *Archangelica*.

Arenaria I. B. v. *Alfine*.

Argemone vulgò ejusque species. v. *Papaver*.

Argentina I. B. v. *Pentaphylloides*.

Aria Theophrasti vulgò. v. *Mespilus*.

Arisarum latifolium & angustifolium C. B. P. v. *Arum*.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpura nigro C. B. P. 307. *Aristolochia rotunda* I. B. tom. 3. l. 32. 559.

Aristolochia longa vera C. B. P. 307. *Aristolochia longa* I. B. tom. 3. l. 32. 560.

* *Aristolochia Clematidis recta* C. B. P. 307. *Aristo-*

stolochia Clematidis vulgaris I. B. *tom.* 3. l. 32. 560.

Aristolochia Piftolochia dicta C. B. P. 307.

Aristolochia polyrrhizos I. B. *tom.* 3. l. 32. 561.

Aristolochia Piftolochia dicta Cretica, *Smilacis folio*, *semper virens*. *Piftolochia Cretica* C. B. P. 307. *Aristolochia Piftolochia altera* I. B. *tom.* 3. l. 32. 563.

ARMENIACA *malus*, *fructu majori ex luteo rubefcente*. *Mala Armeniaca majora* C. B. P. 442. I. B. *tom.* 1. l. 2. 167.

Eadem fructu minori. *Malus Armeniaca minor* C. B. P. 442. *Armeniaca mala minora* I. B. *tom.* 1. l. 2. 167.

Armeniaca Malus, *fructu majori albescente*, *nucleo dulci*. *Mala Armeniaca majora*, *nucleo dulci* C. B. P. 442.

Armoracia multis I. B. v. *Rhaphanus rusticanus*.

* **A**RTEMISIA *vulgaris major* C. B. P. 137. *Artemisia vulgaris* I. B. *tom.* 3. l. 26. 184.

Caule ex viridi albicante C. B. P. *var.* 137.

Eadem caule subpurpurafcente C. B. P. *Var.* 137.

Artemisia foliis ex luteo variegatis, *Cat. Hort. Reg. Paris.* 24.

Artemisia tenuifolia, *sive leptophyllos* I. B. v. *Abrotanum*.

ARUM

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocasía *C. B. P.* 195. Colocasía *I. B. tom. 2. l. 19. 790.* Culcas Vesling. in *Alp.* 38.

Idem cauliculis nigricantibus Zeylanicum.

Arum Æthiopicum, flore albo odorato, moschum redolente.

Arum venis albis *C. B. P.* 195.

* Arum maculatum, maculis candidis *C. B. P.* 195

* Arum maculatum, maculis nigris *C. B. P.* 195.

Arum *I. B. tom. 2. l. 19. 783.*

* Arum vulgare non maculatum *C. B. P.* 195.

Arum humile Arisarum dictum, latifolium, pistillo brevi, incurvo, obfuso. Arisarum latifolium *C. B. P.* 196. *I. B. tom. 2. l. 19. 786.*

Idem angustifolium, pistilo longissimo, tenui, inflexo, mucronato. Arisarum angustifolium Dioscoriis fortè *C. B. P.* 196. *I. B. tom. 2. l. 19. 787.*

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule maculato, majus & elatius. Dracunculus polyphyllus *C. B. P.* 195.

Dracunculus major vulgaris *I. B. tom. 2. l. 19. 789.* Erva de Sancta Maria Pison. *l. 4. c. 57.*

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, caule non maculato, minus & humilius.

Arum

Arum triphyllum, Dracunculus & Serpentaria dictum, Indicum. Dracunculus, five Serpentaria triphylla, Brasiliiana C. B. P. 135. Dodart. Mem. 81.

Arum palustre, radice Arundinaceâ. Dracunculus palustris, five radice Arundinaceâ C. B. P. 195. Dracunculus aquaticus I. B. tom. 2. l. 19. 789.

* ARUNDO vulgaris, five φεγγυίτης Diosc. C. B. P. 17. Arundo vulgaris palustris I. B. tom. 2. l. 18. 485.

Arundo sativa, quæ δόναξ Diosc. & Theophr. C. B. P. 17. Arundo maxima & hortensis I. B. tom. 2. l. 18. 486.

Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti Corn. 55. Arundo Laconica à Petro Mullerio Stapel. 440.

Arundo Sacharifera C. B. P. 18. Arundo Saccharina I. B. tom. 2. l. 18. 531.

Arundo Indica latifolia ejusque species C. B. P. & I. B. v. Canna Indica.

* ASARUM C. B. P. 197. I. B. tom. 3. l. 32. 548.

Afarum Canadense Corn. 24. Asarum Americanum majus Cat. Hort. Reg. Paris. 25.

Ascyrum C. B. P. ejusque species. v. Hypericum.

ASCLE-

ASCLEPIAS flore albo C. B. P. 303. Asclepias five Vincetoxicum, cum multis floribus albicantibus *I. B. tom. 2. l. 15. 138.*

Asclepias angustifolia, flore flavescente *Cat. Hort. Reg. Paris. 25.*

Asclepias nigro flore C. B. P. v. Apocynum.

* **A**SPARAGUS sativa C. B. P. 489. Asparagus domesticus *Morif. Hist. 2. 3.* Asparagus hortensis *I. B. tom. 3. l. 36. 725.*

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio C. B. P. 490. Asparagus pratensis *I. B. tom. 3. l. 36. 725.*


Asparagus maritimus, crassiore folio C. B. P. 490. Asparagus marinus *I. B. tom. 3. l. 36. 726.*

Asparagus foliis acutis C. B. P. 490. *Morif. Hist. 2. 3.* Corruda *I. B. tom. 3. l. 36. 726.*

Asparagus aculeatus, maximus, farmentosus, Zeylanicus.

Huic subsunt radices longæ, fusiformes, plures ex uno capite propendentes, albicantes, carnosæ, pollicem crassæ, sapore subdulci, grato, ad Scorzoneram nostram accedente. Ex hac pullulant aliquot farmenta longissima, in multas alas divisa, brevibus pungentibus aculeis, modò sursum modò deorsum spectantibus, armata, vicinas arbores scandentia easque amplectentia. His adhærent folia reliquis hujus familiæ speciebus

ASPARAGUS ACULEATUS MAXIMUS;
SARMENTOSUS ZEYLANICUS.



bus omnibus latiora, longiora & robustiora; Ad quorum sinus prodeunt ex caliculis exiguis flores parvi, pallidi, hexapetali, fulciti brevibus tenuissimis pedicellis. Hos excipiunt baccæ rubentes, in quibus continentur ut plurimum terni angulosi nigricantes acini, velut in speciebus consimilibus. Sponte nascitur in sylvis Insule zeylonæ, Indigenis Hatawarija; Europæis verò ibidem degentibus, Scorzonera dicta. Radices vel cum lacte aut brodio carniū coctæ, vel sale, aceto & pipere conditæ, ab incolis habentur in delitiis.

Asparagus aculeatus Africanus.

A Corrudâ vulgari nihil discrepat, nisi radicibus crassioribus, rotundioribus, bulbilorum instar, ex uno cespite dependentibus, sapore cum Asparago Zeylanico consimili. Attuli in Hortum ex Capite Bonæ Spei, ubi ad rivulorum margines luxuriantem offendi.

Asperula I. B. v. Rubia.

Asphalatus secunda trifolia I. B. v. Cytisus.

Aspalatus secunda Monspeliensium I. B. v. Genista.

ASPHODELUS albus ramosus *Morif. Hist. 2.*
 330. Asphodelus albus ramosus mas *C. B.*
P. 28. Asphodelus major, flore albo ramosus *I. B. tom. 2. l. 19. 626.*

Idem

Idem non ramosus *Morif. Hist.* 2. 330. *C. B. P.* 28. *Asphodelus major*, flore albo non ramosus *I. B. tom.* 2. l. 19. 625.

Asphodelus folio fistuloso striato, non ramosus, luteus & flore & radice *Morif. Hist.* 2. 331. *Asphodelus luteus* & flore & radice *C. B. P.* 28. *Asphodelus luteus I. B. tom.* 2. l. 19. 632.

Asphodelus Allobrogicus, magno flore *Lilii*. *Phalangium magno flore C. B. P.* 29. *Phalangium Allobrogicum*, magno flore *Lilii Morif. Hist.* 2. 333. *Phalangium Lilii* flore *I. B. t.* 2. l. 19. 636.

Asphodelus minimus luteus palustris, *Acori folio Morif. Hist.* 2. 332. *Pseudo Asphodelus palustris Scoticus C. B. P.* 29. *Asphodelus luteus, Acori foliis, palustris, Anglicus Lobelii I. B. tom.* 2. l. 19. 633.

Asphodelus bulbosus Dodonæi I. B. v. Ornithogalum.

Asphodelus foliis fistulosis C. B. P. I. B. Morif. v. Phalangium.

Asplenium I. B. v. Ceterach.

Aster *Novæ Belgix latifolius paniculatus, floribus saturatè violaceis.*

Elegantissimus hic Aster humanam altitudinem longè superans, fundit radicem albam, lignosam, perennantem, innumbris tenuissimis fibris capillatam, ex quâ as-

E

fur-

surgunt virgulta quàm plurima, glabra, purpurascencia, calami crassitie, infirma, circa fastigia in frequentes furculos, quasi in speciosam paniculam collectos, subdivisa. His strictè adherent folia absque petiolis, digitum longa, duosque transversos lata, plana, crassiuscula, mucronata, alterâ parte glabra, lætè viridia; alterâ ex viridi pallescencia, numerosis exiguis venulis, è mediâ costâ oriundis, inscripta, ad extimos limbos purpurascencia, & aliquando levissimis vix conspicuis crenulis exasperata; quæ verò immediatè ex radice prodeunt, superioribus ampliora sunt, fulta petiolis digitalibus alatis, ex viridi rufescentibus. Juxta furculorum fastigia eminent capitula parva brevibus angustissimis foliolis, squamatim dispositis, vestita, quibus singulis insidet flos stellatus Asteris Attici facie, inodorus, radiatus, discoideus, radiis purpureo violaceis, disco parvo flavescente, abeunte in semina papposa cinerea, more congenerum.

Aster Novæ Belgicæ latifolius, umbellatus floribus dilutè violaceis.

Formâ & crescendi modo cum superiori congruit, ferens radicem longè latè que repentem, albam parùm fibrosam, ex quâ prodeunt folia, præcedenti haud absimilia,

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, PANICULATUS, FLORIBUS SATURATE VIOLACEIS.



at paulò angustiora , rigidiora , minus glabra , & quadantenus sinuata ; intrà hæc eriguntur caules bicubitales , viridantes , ad radicem nihil aut parùm rubentes , striati superioribus rigidiores , duriores , & robustiores , circa summa fastigia in frequentes foliosas alas magis expansas , umbellamentientes , divisi , sustinentes in capitulis parvis ; ex longioribus foliolis squamatim dispositis , flores priori paulò majores , ex dilutâ purpurâ violaceos , petalis duplici seriè sibi invicem incumbentibus , disco luteo , fatiscente in semina cinerea papposa priori simillima . Utriusque Asteris species anno superiori in Horto excrevère , seminibus ex Novâ Belgiâ transmissis à Dn. D. Johanne Kerfpyl Medicinæ Practicæ felicissimo .

Aster autumnalis Americanus , foliis latis crenatis , parvo purpurascēte flore . Asteriscus latifolius autumnalis *Corn* 4

Aster Virginianus serotinus , parvo albente flore *Park. Theatr.* 132.

Aster Æthiopicus , Stoechadis foliis flore aureo .

In montosis aridis ad Caput Bonæ Spei perrara & speciosa hujus Asteris species reperitur . Constat radice parvâ , lignosâ , fibrosâ , fuscâ ; Caule itidem lignoso , dorontali , modò simplici , modò multiplici , can-

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, UMBELLATUS, FLORIBUS DILUTE VIOLACEIS.



candicante, in ramulos divaricato, undique foliis setaceis tenuissimis incanis, Stoechadi citrinæ æmulis, vestito. Horum summitatibus infidet é capitulo oblongo squamato, flos luteus, stellæ instar, cujus medium umbonem, pallidè flavescentem, cingunt foliola, radiorum instar, aureo colore fulgentia. His senescentibus, succedunt semina papposa, velut in congeneribus. Viget & floret per totum annum, dummodo ab aëris frigidioris injuriis vindicatur.

Aster maritimus, folio tereti crasso, in summo tricuspidato. *Crithmum maritimum*, flore Asteris Attici *C. B. P.* 288. *Crithmum marinum* tertium Matthiolo, flore luteo Buphthalmi *I. B. tom. 3. l. 26.* 106.

Idem folio in summo obtuso.

Aster Atticus luteus montanus villosus, magno flore *C. B. P.* 267. **Aster montanus**, flore luteo magno, hirsutus, quibusdam *Oculus Christi* *I. B. tom. 2. l. 24.* 1046.

Aster luteus, hirsuto Salicis folio *C. B. P.* 266.

Aster tertius Pannonicus Clusii luteus, folio hirsuto Salicis *I. B. tom. 2. l. 24.* 1047.

Aster montanus luteus, Salicis glabro folio *C. B. P.* 266. *Conyza media Monspeliensis*, quibusdam Asteris Attici genus, folio glabro rigido *I. B. tom. 2. l. 24.* 1049.

Aster

LUGDUNO-BATAVUS. 71
ASTER ÆTHIOPICUS, STOECHADIS
FOLIIS, FLORE AUREO.



Aster Atticus cœruleus vulgaris C. B. P. 267.

Aster Atticus, purpureo flore I. B. tom. 2. l.

24. 104†

Aster Pyrenæus præcox, flore cœruleo majore
Dodart: Mem. 63.

Aster jacobææ folio vulgò. v. Anemonæ affinis.

Aster luteus, foliis ad florem rigidis C. B. P. v.
Chrysanthemum.

Aster Atticus, foliis circa florem mollibus C. B. P.
v. Chrysanthemum.

Aster luteus major, foliis Succisæ C. B. P. v.
Chrysanthemum.

Aster luteus supinus C. B. P. v. Chrysanthe-
mum.

Aster supinus Conyzoides, Africanus Park. v.
Chrysanthemum.

Asteri montano hirsuto magno similis I. B. v.
Conyza.

Aster Canadensis annuus, flore papposo Hort.
Paris. v. Conyza.

Aster luteus alatus Cornut. v. Chrysanthe-
mum.

Aster latifolius, Tripolii flore Dodart. v. Tri-
polium.

Aster Aizoides Prom. Bon. Sp. Zan. 35. v.
Ficoides.

Asteriscus latifolius autumnalis Corn. v. Aster.

ASTRAGALUS perennis spicatus America-
nus scandens caulibus, radice tuberosâ do-
natus

natus *Morif. Hist. 2. 102.* Apios Americana
Cornuti 201.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, filiquis utrinquè ferræ similibus Morif. Hist. 2. 107. Securidaca, filiquis planis utrinquè dentatis C. B. P. 349. Lunaria radiata Robini *I. B. tom. 2. l. 17. 348.*

Astragalus luteus perennis, procumbens vulgaris sylvestris Morif. Hist. 2. 107. Glyzyrrhiza sylvestris, floribus luteo pallescentibus C. B. P. 352. Fœnum græcum sylvestre, sive Glyzyrrhiza sylvestris quibusdam *I. B. tom. 2. l. 17. 365.*

Astragalus luteus perennis, filiquâ gemellâ rotundâ, vesicam referente Morif. Hist. 2. 108. Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. P. 347. Cicer sylvestre, folliculis rotundis C. B. P. *Matth. 336.* Cicer sylvestre multifolium *I. B. tom. 2. l. 17. 294*

Astragalus luteus annuus Boëticus maritimus rectus Morif. Hist. 2. 108. Vicia Sesamea Apula *Column. Ecphr. p. 1. 301.* Securidaca Sicula, filiquis foliaceis *Bocc. ic. & descr. 7. ANN.*

Astragalus perennis spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Morif. Hist. 2. 107. Onobrychis spicata, floribus pallidis nigris radiis notatis C. B. P. 350

Astragalus Canadensis flore viridi flavescente. Dod. Mem. 65. ANN

Astragalus Africanus luteus odoratus Magnol.
Botan. 285.

Astragalus humilis Buxifolius. Chamæbuxus , flore Coluteæ *C. B. P.* 471. Chamæbuxus , sive Chamæbixos *L. B. tom. I.* l. 5. 24.

Astragalus Hispanicus, siliquâ epiglottidi simili , flore purpureo major, Turnefortii.
 ANN.

Ex parvâ fibrosâ albente radice, spargit per terram cauliculos non nihil hirsutos, ex viridi rubentes, dodrantis longitudine, in quibus sunt folia Lenti similia, subhirsuta, conjugatim ex opposito sita, unico in summo impari ; Ad horum sinus exit petiolus tenuis, sustinens, ex caliculis parvis villosis quinquifidis , flosculos purpurascens, quinos pluresve in capitulum congestos, ritu Trifolii pratensis, quos singulos sequuntur siliculæ gemellæ, incanæ, depressæ, in duos lobos divisæ, formam complicatæ epiglottidis , in oblongum apicem productæ, referentes, quorum valva superior & externa est coriacea, crassa, hirta, villosa ; inferior verò & interna , tenuis & glabra. Lobis, singulis includuntur semina , rarius bina, frequentius unicum, Lenticulæ magnitudine, depressum, orbiculatum, profundior in ambitu sinu inscriptum.

Astra

ASTRAGALUS HISPANICUS, SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE PURPUREO MAIOR,
TURNEFORTII.



Astragalus Hispanicus siliquâ epiglottidi simili, flore albo minor Turnefortii. ANN.

Hujus exigua candicans radícula emittit coliculum digitale, erectum, subincanum, in aliquot tenellos ramulos divisum; Folia superiori minora, non nihil incana & subhirsuta, novena aliquando septena unicastæ ex adverso hærentia; Flores pallidos exiguos papilionaceos, sex septemve in perbrevis racemulo junctos. Hos excipiunt siliculæ depressæ, rigidæ, hirtæ, incanæ, mucrone brevi, siliculis superioris *Astragali* triplo minores, epiglottidem perfectius exprimentes, ex maturitate in duos loculos dehiscentes, qui condunt semen, solâ exilitate à superiori distinctum. Utrumquæ. *Astragalum* nomine *Epiglottidis* leguminosæ vel *Astragali* siliquâ epiglottidi simili, inter alia curiosissima ex Gallis ad nos transmissit Clarissimus Dominus Josephus Tournefortius.

Astragalus Boëticus lanuginosus, radice amplissima C. B. P. v. *Orob.*

Astragalus Romanus I. B. v. *Onobrychis*.

ASTRANTIA major *Morif. Umbell.* 7. & 10. *Helleborus niger*, Saniculæ folio major C. B. P. 186. Sanicula *Fœmina* quibusdam, aliis *Elleborus niger* I. B. tom. 3. l. 34. 638.

Ea-

ASTRAGALUS HISPANICUS SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE ALBO MINOR
TURNEFORTII.



Eadem minor *Morif. Umbell.* 7. & 10. Hel-
leborine *Saniculæ folio minor C. B. P.* 186.

Atragene quibusdam I. B. v. Clematitis.

* **A**TRIPLEX sylvestris latifolia C. B. P. 119.
Morif. Hist. 2. 604. Atriplex dicta Pes An-
serinus *I. B. tom. 2. l. 23. 975. ANN.*

* Atriplex sylvestris latifolia, acutiori folio
C. B. P. 119. *Morif. Hist.* 2. 604. Atriplex,
dicta Pes Anserinus, altera sive ramosior
I. B. tom. 2. l. 23. 976.

* Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante
C. B. P. 119. *Morif. Hist.* 2. 604. ANN

* Atriplex sylvestris, folio sinuato saturatè vi-
rente, spicâ rubrâ *Morif. Hist.* 2. 604. Atri-
plex sylvestris altera C. B. P. 119. Atriplex
sylvestris *I. B. tom. 2. l. 23. 972. ANN.*

Atriplex procumbens, folio sinuato lucido
crasso *Morif. Hist.* 2. 605. ANN.

Atriplex fetida C. B. P. 119. *Morif. Hist.* 2. 605.
I. B. tom. 2. l. 23. 974. ANN.

Atriplex odora, sive suaveolens *Morif. Hist.*
2. 605. Botrys Ambrosioides vulgaris C. B. P.
138. ANN.

Atriplex odorata suaveolens Americana Mexi-
canave *Morif. Hist.* 2. 605. Botrys Ambro-
sioides Mexiocana C. B. P. 138. Epazotl.
Atriplex odorata Mexicana. *Rech. Hist.*
Mexic. p. 159. ANN.

Atriplex Mori fructu major, seu fragifera ma-
jor

ior *Morif. Hist.* 2. 606. *Spinachia fragifera Horti Farnesiani Aldin.* 85. ANN.

Atriplex Morifructu minor, seu fragifera minor, *Morif. Hist.* 2. 604. *Atriplex sylvestris*, *Mori fructu C. B. P.* 119. ANN.

Atriplex, *Mori fructu*, minima *Morif. Hist.* 2. 607. *Atriplex sylvestris*, lappulas ferens *C. B. P.* 119. ANN.

Atriplex hortensis alba, seu pallidè virens *C. B. P.* 119. *Morif. Hist.* 2. 606. *Atriplex. alba I. B. tom.* 2. l. 23. 670. ANN.

Eadem nigricans C. B. P. Var. 119. *Morif. Hist.* 606. ANN.

* *Atriplex sylvestris annua*, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato, hastæ cuspidi simili *Morif. Hist.* 2. 607. ANN.

* *Atriplex*, angusto oblongo folio *C. B. P.* 119 *Morif. Hist.* 2. 607. *Atriplex vulgaris angustifolia*, cum folliculis *I. B. tom.* 2. l. 23. 973. ANN.

Eadem angustissimo & longissimo folio. ANN.

Atriplex angusti folia laciniata minor I. B. tom. 2. l. 23. 972. *Morif. Hist.* 2. 607. *Atriplex sylvestris*, folio oblongo glauco aut coesio *Morif. ib.* 604. ANN.

* *Atriplex maritima laciniata C. B. P.* 120. *Morif. Hist.* 2. 607. *Atriplex maritima I. B. tom.* 2. l. 23. 974. ANN.

* *Atriplex maritima*, folio integro angustissimo. *Atriplex minima*, angustifolia maritima.

tima. *Bocc. de Pl. sic.* 29. *Moris. Hist.* 2. 607. ANN.

Atriplex latifolia, seu *Halimus fruticosus latifolius*, *Moris. Hist.* 2. 607. *Halimus latifolius*, sive *fruticosus* C. B. P. 120. *Halimus Clusii* I. B. tom. 1. l. 8. 227.

Atriplex maritima angustifolia procumbens *Moris.* 2. 608. *Halimus angustifolius procumbens* C. B. P. 120. *Portulaca marina fruticosa*, quæ *Halimus* 2. *Clusii* I. B. tom. 1. l. 8. 228.

* *Atriplex maritima*, angustissimo folio *Moris. Hist.* 2. 608. *Halimus*, seu *Portulaca marina* C. B. P. 120.

ATRIPLICI affinis *Linariæ* foliis, *Belvidere dicta*. *Linaria scoparia* C. B. P. 212. *Linaria Belvidere dicta* I. B. tom. 3. l. 30. 462. ANN.

Attractylis lutea C. B. P. v. *Cnicus*.

Attractylis I. B. v. *Cnicus*.

Atzoyatl. Rech. v. *Mirabilis Peruviana*.

Avellana vulgò ejusque species. v. *Corylus*.

AVENA vulgaris, seu alba C. B. P. 23. *Avena alba* I. B. tom. 2. l. 18. 432. ANN.

Avena nigra C. B. P. 23. I. B. tom. 2. l. 18. 432. ANN.

* *Avena nuda* C. B. P. 23. I. B. tom. 2. l. 18. 433. ANN.

Avena

Avena pilosa I. B. v. *Festuca*

Avicularia Sylvii quibusdam I. B. v. *Campanula*.

Aurantia poma. v. *Malum Aurantium*.

Auricula leporis I. B. *ejusque species*. v. *Bupleurum*.

Auricula muris, *pulchro flore albo* I. B. v. *Lychnis*.

AURICULA urfi lutea. *Sanicula Alpina lutea* C. B. P. 242. *Morif. Hist.* 2. 557. *Auricula urfi flore luteo* I. B. tom. 3. l. 30. 499. flore simplici.

Auricularum plurimæ varietates; Folio vel viridi, vel quasi farinâ asperso, eoque vel serrato, vel non serrato; Flore vel parvo, vel magno; Ejusque umbone vel angusto, vel amplo, vel plano vel stellato; Petalis vel marginibus integris, cordiformibus, vel undulatis, modò simplicibus, modò multiplicibus, vel unicoloribus vel multicoloribus, variis elegantissimis, interquas formæ maximè excellentes in horto sunt sequentes:

Auricula urfi, flore magno atropurpureo holoserico simplici, umbone candido amplissimo.

Eadem flore magno undulato obsoletè incarnato, umbone pallido amplissimo.

Eadem flore magno undulato colore vario, umbone amplissimo flavescente.

Eadem umbone triplici vario.

Eadem umbone amplissimo radiato aureo.

Eadem umbone amplissimo stellato aureo.

Auricula urfi flore magno pleno flavo.

Eadem flore magno pleno albo.

Eadem flore magno pleno purpureo.

Eadem flore magno pleno atropuniceo holoserico.

Eadem flore magno pleno coccineo.

Eadem flore magno pleno, ex aureo albo & puniceo variegato.

Eadem flore magno pleno, ex flavo & coccineo variegato.

Auricula urfi alpina, minima carnea. Sanicula alpina minima carnea. *C. B. P.* 243.

Auricula urfi minima, folio inferius venoso & incano, flore suave rubente Ciasli.

Discriminatur à præcedente, foliis longioribus infernè venosis, non nihil incanis, supernè viridibus, summis marginibus crenatis; Floribus quinis vel septenis, coloris suavè rubentis, quasi in umbellâ caulis fastigio insidentibus. Hanc Dominus Ciasli Venetiis transmisit ad honestissimam matronam Agnitam de Block, cujus liberalitate accepimus.

Auriculæ urfi affinis, Androsace dicta major.

Saniculæ affinis planta, Androsace dicta major *Morif. Hist.* 2. 556. Alsine affinis, Androsace dicta major *C. B. P.* 251. Androsace

face Matthioli altera *I. B. tom. 3. l. 29. 368.*
Auricula ursi Mycon. v. Verbascum.

AZEDARACH *Dod. Pent. 6. l. 4. c. 26.* Ar-
 bor Fraxini folio, cœruleo flore *C.B.P. 415.*
Azadaracheni arbor I. B. tom. 1. l. 5. 554.

B.

Baccharis quibusdam *I. B. v. Conyza.*
Bala Hort. Mal. v. Ficus.
Balaustia flore pleno majori C. B. P. v.
Malus Punica.

Ballote Diosc. C. B. P. v. Marrubium.

Balsamina rotundifolia repens seu Mas C. B. P.
v. Cucumis.

BALSAMINA, Herba impatiens, seu Noli me
 tangere, flore patulo eleganter dilutè ru-
 bente *Morif. Hist. 2. 281.* Balsamina Fœ-
 mina *C.B.P. 306.* Balsamina Fœmina, Persici
 folio, vel Salicis folio *I. B. tom. 2. l. 21. 909.*
 flore incarnato. ANN.

Eadem flore candido. ANN.

Eadem flore partim candido, partim rubro.
 ANN.

* Balsamina, Herba impatiens, seu Noli me tan-
 gere flore, patulo luteo *Morif. Hist. 2. 282.* Bal-
 samina lutea, sive Noli me tangere *C.P.B. 306.*
 Noli me tangere *I. B. tom. 2. l. 21. 903.* ANN.

Bamia I. B. v. *Althæa*.

Bananiera *Pison*. v. *Ficus*.

BARBA capræ floribus oblongis C. B. P. 163.

Barba capræ I. B. tom. 3. l. 30. 488.

* Barba capræ floribus compactis C. B. P. 163.

Ulmaria I. B. 3. l. 30. 488.

BARBA Jovis C. B. P. 397. Jovis barba pulchre lucens I. B. tom. 1. l. 11. 385.

Barbarea C. B. P. v. *Eruca*.

* *Bardana* I. B. v. *Lappa*.

Basilicum vulgò. v. *Ocimum*.

Batatas C. P. B. & I. B. v. *Convolvulus*.

Beccabunga vulgò. v. *Veronica*.

Beidelssar *Alpini* I. B. v. *Apocynum*.

Been album I. B. v. *Lychnis*.

Behen rubrum I. B. v. *Limonium*.

Bella donna I. B. v. *Solanum*.

Belle videre I. B. v. *Atriplici* affinis.

* **B**ELLIS sylvestris, caule folioso major C. B. P. 261. Bellis major I. B. tom. 3. l. 26. 114.

Caule glabro C. B. P. Var. 261.

* Eadem caule hirsuto C. B. P. Var. 261.

Bellis Alpina major, rigido folio C. B. P. 261.

Bellis Alpina major, foliis angustis rigidis

I. B. tom. 3. l. 26. 115.

* Eadem folio breviori & latiori.

Hæc præcedente humilior est & tenerior;

Fo-

Foliis latioribus, brevioribus, magis reflexis; Floribus minoribus. Floret in hybernaculo totâ hyeme.

Bellis Americana procerior serotina ramosa, flore amplissimo. An Aster serotinus procerior ramosus, Bellidis sylvestris flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 27?*

Bellis ramosa umbellifera *Cornuti 194.* Bellis major ramosa umbellifera Americana *Park. Theatr. 528.*

Bellis leucanthema, Tanaceti foliis inodoris, flore majori *Morif. Hort. Bles. 362.* Tanacetum inodorum, flore majori *C. B. P. 132.* Tanacetum album, flore ampliore *I. B. tom. 3. l. 29. 133. Descr.*

Eadem flore minori *Morif. Hist. Bles. 362.* Tanacetum montanum inodorum, minori flore *C. B. P. 132.* Tanacetum album *I. B. tom. 3. l. 26. 133.*

Bellis sylvestris media, caule carens *C. B. P. 261.* Bellis sylvatica *I. B. tom. 3. l. 26. 114.*

*Bellis sylvestris minor *C. B. P. 261.* Bellis minor sylvestris spontanea *I. B. tom. 3. l. 26. 111.* Petalis albis *C. B. P. Var. ibid.*

*Eadem petalis ex candido rubris *C. B. P. Var. 261.*

*Eadem petalis ex albo & rubro mixtis *C. B. P. Var. 261.*

*Eadem petalis intus rubris, in ambitu albis *C. B. P. Var. 261.*

Bellis hortensis, flore pleno, eoque magno vel parvo C. B. P. 261. Bellis hortensis, sive flore multiplicato I. B. tom. 3. l. 26. 113. flore albo.

Eadem flore incarnato C. B. P. Var. 261.

Eadem flore rubro C. B. P. Var. 261.

Eadem flore vario ex candido & rubro C. B. P. Var. 261.

Eadem pediculo folioso: quæ 7. in Prodr. C. B. P. 262.

Bellis hortensis prolifera C. B. P. 262. Bellis hortensis, flore multiplicato sive prolifera I. B. tom. 3. l. 26. 113.

[Bellis spinosa, foliis Agerati C. B. P. 264. Bellis spinosa Prosp. Alpin. Exot. 372. Capitulo aphylo luteo.

Eadem foliis non spinosis.

Bellis Africana capitulo aphylo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus. Chrysanthemum capitis Bonæ Spei repens flore aphylo Dn. Syens Breyn. Cent. 1. 156.

Eadem foliis & cauliculis junceis erectis.

Nata est ex feminibus Bonæ Spei, prioris similis; Ast foliis & cauliculis tenuioribus, erectis & junceis. Sapore & odore, veluti præcedens, fatuo.

Bellis lutea, foliis profunde incisiss major C. B. P. v. Chrysanthemum.

Bellis lutea, foliis profunde incisís minor. v.
Chrysanthemum.

Bellis lutea, foliis subrotundis C. B. P. v. Chrysanthemum.

Belmoscus Egyptia Honorio Bellio. v. Althæa.

BERBERIS dumetorum C. B. P. 454. Berberis vulgò, quæ & Oxyacantha putata I. B. tom. 1. l. 6. 52.

Berberis sine nucleo C. B. P. 454.

BETA spontanea maritima communis viridis *Morif. Hist.* 596. Beta sylvestris maritima C. B. P. ANN.

Beta alba, vel pallescens, quæ Sicula & Cicla Officinarum *Morif. Hist.* 2. 596. C. B. P. 118. ANN.

Beta communis sive viridis C. B. P. 118. ANN.

Beta rubra vulgaris C. B. P. 118 *Morif. Hist.* 1. 596. ANN.

Beta Sicula, seu Syriaca platineuros alba *Morif. Hist.* 2. 596. Beta pallidè virens major C. B. P. 118. ANN.

Eadem lutea *Morif. Hist.* 2. 596. Beta pallidè flavens major C. B. P. 118. ANN.

Eadem rubra *Morif. Hist.* 2. 596. Beta rubra major C. B. P. 118. ANN.

Eadem aurantiaca *Morif. Hist.* 2. 596. ANN.

Beta rubra, radice Rapæ C. B. P. 188. *Morif.*

Hist. 2. 596. Beta, radice rubrá crassâ *I. B. tom. 2. l. 23. 901. ANN.*

Beta Cretica, semine spinoso seu aculeato
Morif. Hist. 2. 597. *C. B. P.* 118. *I. B. tom. 2. l. 23. 963. ANN.*

BETONICA major Danica *Park. Theatr.* 614.

* Betonica purpurea *C. B. P.* 235. Betonica vulgaris purpurea *I. B. tom. 3. l. 38. 301.*

Eadem alba *C. B. P.* 235. Betonica, flore albo *I. B. tom. 3. l. 28. 302.*

Betonica minima alpina Helvetica *Park. Theatr.* 614.

Betonica Coronaria ejusque species *I. B. v. Caryophyllus.*

* **B**ETULA *C. B. P.* 427. Betula Theophrasti *I. B. tom. 1. l. 8. 148.*

Eadem virgulis pendulis *J. Löfel. Mentz. Ind.* 47.

Bifolium majus *I. B. v. Orchis.*

Bintamburu Zeylonensium. v. Convolvulus.

Bismalva *I. B. v. Malva.*

* **B**ISTORTA major, radice minus intortâ *C. B. P.* 192. *Morif. Hist.* 2. 585. Bistorta major, rugosioribus foliis *I. B. tom. 3. l. 31. 538.*

Bistorta major, radice magis intortâ *C. B. P.*

192. *Morif. Hist.* 2. 585. Bistorta media, folio minus rugoso *I. B. tom.* 3. l. 31. 531.

Bistorta Alpina minima sobolifera *Morif. Hist.*

2. 585. Bistorta minima *I. B. tom.* 3. l. 31.

539. An Bistorta Alpina media *C. P. P.*

192?

BLATTARIA perennis, Verbasci folio, flore luteo, amplo *Morif. Hort. Bles.* 239. capsulis minoribus.

Blattaria perennis, flore violaceo *Morif. Hist.*

2. 488. Blattaria purpurea, radice perenni

Morif. Hort. Bles. 240. Blattaria purpurea

C. B. P. 241. Blattaria flore cœruleo vel

purpureo *I. B. tom.* 3. app. 875. Folio subrotundo.

Blattaria flore gilvo seu obsoleti coloris *Morif.*

Hist. 2. 488. Blattaria lutea folio longe laci-

niato *C. B. P.* 240. Folio oblongo.

Eadem Anglicana perennis, flore obsoletè

phœniceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 31.

Eadem flore ferrugineo *Cat. Hort. Reg. Paris.*

31.

Eadem flore flavo.

Blattaria annua ramosa, floribus luteis stami-

nibus purpureis *Morif. Hist.* 2. 498. Blatta-

ria vulgaris lutea *I. B. tom.* 3. appen. 874.

ANN.

Eadem flore albo. Blattaria alba *C. B. P.* 241.

I. B. tom. 3. app. 874. ANN.

Eadem flore purpureo. ANN.

Eadem obsoleto colore purpurascente C. B. P.

Var. 241. ANN.

Eadem nigro Violæ eleganti colore nitens C. B.

P. Var. 241. ANN.

Eadem obsoleto flavescente colore. ANN.

Blattaria annua flore majore luteo, capsulâ item majore *Morif. Hist.* 2. 498. Floribus longioribus insidentibus petiolis. Blattaria magno flore C. B. P. 241. I. B. tom. 3. app. 875. ANN.

Eadem flore intus albo, extus incarnato. ANN.

Blattaria Zeylanica, flore amplo miniato. ANN.

Blattaria rubra spicata major glabra communis, folio acuto Morif. v. Lyfimachia spicata purpurea.

Blattariæ adfinis planta, major flore luteo Morif. v. Lyfimachia.

Eadem minor, foliis nigris punctis notatis Morif. v. Lyfimachia.

Blattariæ adfinis planta, bifolia levis flore albo. Ephemeron Morif. v. Lyfimachia.

* **BLITUM** perenne, Spinachiae facie *Morif. Hist.* 2. 599. Lapathum unctuosum, folio triangulo seu Bonus Henricus C. B. P. 115. Bonus Henricus I. B. tom. 2. l. 23. 965.

Blitum rubrum majus C. B. P. 118. *Morif. Hist.*

2. 599. Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I. B. tom. 2. l. 23. 966. ANN.

Bli-

Blitum album majus C. B. P. 118. *Morif. Hist.* 2.

599. *Blitum pulchrum magnum album* I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum rubrum minus C. B. P. 118. *Morif. Hist.*

2. 599. I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

* *Blitum album minus* C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 599.

I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum minus polyspermum, à seminis copiâ C.

B. P. 118. *Morif. Hist.* 2. 599. *Blitum erectius*

sive 3. *Tragi* I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum monospermum Indicum aculeatum, capsulâ rotundâ Breyn. Pr. v. *Amaranthus*.

Blitum spinosum Americanum Sutherl. Catal.

Edinb. v. *Amaranthus*.

Blitum maximum I. B. v. *Amaranthus*.

Bona major Dod. *Morif.* v. *Faba*.

Bonus Henricus I. B. v. *Blitum*.

* **B**ORRAGO floribus cœruleis I. B. tom. 3. l. 33. 574. *Buglossum latifolium* Borrage C. B. P. 256.

* Eadem floribus albis I. B. tom. 3. l. 33. 574. Floribus candidis C. B. P. Var. 256.

Eadem folio & flore albo.

Borrage Cretica vulgò. v. *Buglossum*.

Borrago minima Herbariorum I. B. v. *Buglossum*.

Borrage sylvestris perennis Candia, flore puniceo Zan. v. *Anchusa*.

Botrys Ambrosioides vulgaris C. B. P. v. *Atriplex*.

Botrys Ambrosioides Mexiocana C. B. P. *u*.
Atriplex.

Botrys verticillata I. B. *v*. Chamædris.

Botrys Chamædrioides C. B. P. *v*. Chamædris.

Branca ursina I. B. *v*. Acanthus.

BRASSICA capitata alba C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 206. I. B. *tom.* 2. l. 21. 826.
ANN.

Brassica capitata rubra C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. I. B. *tom.* 2. l. 21. 831. ANN.

Brassica capitata polycæphalos *Lugd. Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica* ex capitulis pluribus conglobata C. B. P. capite clauso penitus.
ANN.

Brassica alba, capite oblongo non penitus clauso C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica Italica* tenerrima glomerosa, flore albo. I. B. *tom.* 2. l. 21. 827. ANN.

Brassica alba crispa C. B. P. III. *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica Sabauda* rugosa I. B. *tom.* 2. l. 21. 828. ANN.

Brassica sativa alba vel viridis vulgaris, aperta lævis *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica alba* vel viridis C. B. P. III. *Brassica alba* vulgaris I. B. *tom.* 2. l. 21. 829. ANN.

Brassica sativa rubra, aperta lævis *Morif. Hist.* 2. 207. *Brassica rubra* C. B. P. III. *Brassica rubra* vulgaris I. B. *tom.* 2. l. 21. 830. ANN.

Bras-

Brassica fimbriata C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2.
207. *Brassica tophosa* I. B. tom. 2. l. 21. 830.
ANN.

Ejusdem varietates colore insignes. ANN.

Brassica fimbriata pumila C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2. 207. ANN.

Brassica cauliflora C. B. P. 111. *Morif. Hist.* 2.
208. *Brassica multiflora* I. B. tom. 21. 828.
ANN.

Brassica Asparagodes crispa C. B. P. 111. *Morif. Hist.* 2. 208. *Brassica thyrsoides* I. B. tom. 2.
l. 21. 833. ANN.

Brassica Gongylodes C. B. P. 111. *Morif. Hist.* 2.
208. *Brassica caulorapa* I. B. tom. 2. l. 21.
829. ANN.

Brassica lato Apii folio C. B. P. 112. *Morif. Hist.*
2. 208. ANN.

Brassica angusto Apii folio C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2. 208. *Brassica tenuissimè laciniata*
I. B. tom. 2. l. 21. 832. ANN.

Brassica maritima arborea, seu procerior ramosa *Morif. Hist.* 2. 208.

Brassica maritima major repens, multiflora alba monospermos *Morif. Hist.* 2. 209. *Brassica maritima monospermos* C. B. P. 112.
Brassica monospermos Anglica I. B. tom. 2.
l. 21. 830.

* *Brassica sylvestris*, *Crambe dicta* *Dod. Morif. Hist.* 2. 209. *Brassica arvensis* C. B. P. 112.
& *Brassica sylvestris* *Diosc. Dod. C. B. P.*
ibid.

ibid. Brassica sylvestris I. B. tom. 2. l. 21. 833.

ANN.

* Brassica campestris perfoliata, flore albo C. B. P. 112. *Morif. Hist.* 2. l. 210. Perfoliata filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 835. ANN.

Brassica sylvestris, Napobrasica dicta *Morif. Hist.* 2. 210. Napobrasica C. B. *Prodr.* & P. III. ANN.

* Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoraceis, asperis, caulibus autem adhaerentibus planis seu glabris *Morif. Hist.* 2. 210. Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoraceis C. B. P. Glastifolia Cichoroides I. B. & Turritis secunda Clusii I. B. tom. 2. l. 2. 837.

Brassica sylvestris hispida non ramosa C. B. P. v. Leucojum.

Britannica antiquorum vera Munt. v. Lappathum.

BRUNELLA Lusitanica, flore & spicâ majore *Dodart. Mem.* 67. Foliis Scrophulariæ.

Brunella, cœruleo magno flore C. B. P. 261.

Prunella magno folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 30. 429.

* Brunella major, folio non dissecto C. B. P. 260.

Prunella flore minore vulgaris I. B. tom. 3. l. 30. 428.

* Eadem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 32.

* Ea-

* Eadem flore purpurascence *Cat. Hort. Reg. Paris.* 32.

* *Brunella folio laciniato* C. B. P. 261. *Prunella laciniata*, flore magno purpureo *I. B. tom.* 3. l. 30. 429.

* Eadem flore albo. An *Prunella flore albo parvo*, folio laciniato *I. B. tom.* 3. l. 30. 429? *Bromos vulgò. v. Festuca*

* *BRYONIA aspera sive alba*, baccis rubris C. B. P. 297. *Bryonia aspera incana alba*, baccis rubris *Morif. Hist.* 2. 4. *Vitis alba*, sive *Bryonia* *I. B. tom.* 2. l. 15. 143.

Bryonia levis, sive *nigra racemosa* C. B. P. 297. *Morif. Hist.* 2. 15. *Vitis nigra* quibusdam, sive *Tamnus Plinii*, folio *Cyclaminis* *I. B. tom.* 2. l. 15. 147.

Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis.

Ingenium catharticum, congeneribus haud dissimile, probat hæc *Bryonia* tam gustu suo acri amaro & nauseoso, quàm etiam usu, *Zeylanensibus* in *Hydrope* frequenti, penes quos in parietinis rudibus aliisque incultis sordidis, sua sponte luxuriat. Spargit à radice albicante fibrosâ in modicum ventrem extumescente, flagella tenera flexibilia, longo varioque reptatu circinnatis suis claviculis vicina quævis apprehendentia; Folia atro viridia, asperiuscula, quinque vel sex profundis lacinis di-

vifa; Flores ad foliorum finus folitarios, aliquando binos ternosve, parvulos, ex quinque petalis reflexis pallide flavescentibus & subhirsutis compositos; Baccas Cerasi magnitudine, oblongo rotundas, primum virides, postmodum rubellas aliquot lacteis striis perbellè inscriptas, continentes in pallido lentoque succo acinos fuscus, duros, asperos, subrotundos, cingulo medio, quasi fasciâ, in obtusum apicem protuberante. Radix ad multos annos perennat in Zeylona; sub nostro verò du-
riori climate facilè perit.

BUGLOSSUM latifolium semper virens C. B. P. 256. Buglossum folio Borriginis, Hispanicum I. B. tom. 3. l. 33. 577.

Buglossum angustifolium majus C. B. P. 256. flore coeruleo C. B. P. Var. 256. Buglossum vulgare majus I. B. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

Idem flore rubeo C. B. P. Var. 256. flore purpureo I. B. Deser. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

* Buglossum angustifolium minus C. B. P. 256. Buglossum vulgare minus I. B. tom. 3. l. 33. 578. ANN.

Buglossum sylvestre majus nigrum C. B. P. 256. ANN.

* Buglossum sylvestre minus C. B. P. 256. Echium Fuchsi, sive Borrigo sylvestris I. B. tom. 3. l. 33. 581. ANN.

* Bu-

BRYONIA ZEYLANICA FOLIIS PROFUNDE
LACINIATIS.

* Buglossum sylvestre minus alterum & asperius C. B. P. 256. ANN.

* Buglossum sylvestre, cauliculis procumbentibus C. B. P. 257. Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, Echium lappulatum quibusdam I. B. tom. 3. l. 33. 590. ANN.

Buglossum minus Symphyti foliis. Symphytum pumilum repens, Borriginis facie C. B. P. 259. Symphytum pumilum repens, sive Borrigo minima herbariorum I. B. tom. 3. l. 33. 597.

Buglossum Creticum, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echii foliis verrucosis. Borrigo sylvestris annua Candia Zanon. Hist. 48. Buglossum Creticum verrucosum, perlatum quibusdam Cat. Hort. Reg. Paris. 33. Borrigo Cretica vulgò. ANN.

Buglossum marinum incanum cœruleo flore. Cynoglossum flore cœruleo Park. Theatr.

13.

Buglossum latifolium C. B. P. v. Borrigo.

Bugula quibusdam I. B. v. Consolida media.

* BULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. P. 162. Bulbocastanum Moris. Umbellif. 5. I. B. tom. 3. l. 27. 31.

Bulbocodium ejusque species I. B. v. Narcissus.

Bulbus eriophorus Orientalis C. B. P. v. Hyacinthus.

Bul-

Bulbus sylvestris Fuchsi I. B. v. *Ornithogalum*.

Bunias Moris. v. *Napus*.

Bupthalmum Creticum, *Cotulae facie* Breyn. v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Cotulae folio C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Dod. I. B. v. *Adonis*.

Bupthalmum Tanacetii minoris foliis C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

BUPLEURUM folio rigido C. B. P. 278. *Bupleurum perenne*, *latifolium Moris.* *Umbell.* 26. *Auricula leporis altera*, five rigidior I. B. tom. 3. l. 27. 200.

Bupleurum folio subrotundo, five vulgatissimum C. B. P. 278. *Bupleurum perenne*, *angustifolium Moris.* *Umbell.* 26. *Auricula leporis*, *umbellâ luteâ* I. B. tom. 3. l. 27. 200.

* **B**URSA pastoris major, capsulâ cordatâ, foliis non sinuatis *Moris.* *Hist.* 2. 304. *Bursa pastoris major*, folio non sinuato C. B. P. 108. ANN.

* Eadem foliis laciniatis *Moris.* *Hist.* 2. 304. *Bursa pastoris major*, folio sinuato C. B. P. 108. *Bursa pastoria* I. B. tom. 2. l. 22. 936. ANN.

* Eadem folio eleganter dissecto, instar *Coronopi repentis* C. B. P. *Var.* 108. ANN.

- * Eadem minor capsulâ brevi cordatâ, foliis sinuatis *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris media C. B. P. 108. ANN.
 - * Bursa pastoris minor, foliis alatis, costæ mediæ è regione adhærentibus, uno impare extremum claudente *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris minor, foliis incisfis C. B. P. 108. Bursa pastoris parva, folio glabro, spisso I. B. tom. 2. l. 22. 137. ANN.
 - * Bursa pastoris major hirsuta, capsulâ oblongâ *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoris major, loculo oblongo C. B. P. 108. Bursæ pastoriæ sublongo loculo affinis, pulchra planta I. B. tom. 2. l. 22. 938. ANN.
 - * Bursa pastoris minor, loculo oblongo C. B. P. 108. *Morif. Hist. 2. 305.* Bursa pastoria minima oblongis filiquis, verna, loculo oblongo I. B. tom. 2. l. 22. 937. ANN.
 - * Bursa pastoris minor, foliis trifidis, aliquando multifidis, florum petalis bifidis, loculo oblongo *Morif. Hist. 2. 306.* Bursa pastoria minima, oblongis filiquis, verna, loculo oblongo I. B. tom. 2. l. 22. 937. ANN.
- Bursæ pastoris similis filiquosa major, C. B. P. v. Draba.*
- Eadem minor C. B. P. v. Draba.*

BUXUS arborescens C. B. P. 471. Buxus I. B. tom 1. l. 4. 496.

Buxus foliis rotundioribus C. P. B. 471.

Buxus

Buxus foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg. Paris. 34.* *Buxus auratus Park.*

Buxus major, foliis per limbum aureis *Hort. Reg. Paris. 34.*

Buxus longioribus foliis, in acumen luteum desinentibus *Hort. Reg. Paris. 34.*

C.



aachira Pison. v. Colutea.

CACALIA foliis cutaneis acutioribus & glabris *C. B. P. 198.* *Cacalia quibusdam I. B. tom. 3. l. 32. 569.*

CACHRYS, seu Libanotis *Cachryphoros*, semine fungoso levi *Morif. Umb. 1.* *Libanotis Ferulae folio*, semine anguloso *C. B. P. 150.* *Libanotis Cachryphoros quibusdam, floribus luteis I. B. tom. 3. l. 27. 40.*

Eadem semine fungoso sulcato aspero *Morif. Umb. 2.*

Cacubalum quibusdam I. B. v. Solanum.

Cakile quibusdam I. B. v. Eruca.

CALAMINTHA incana, *Ocymi foliis C. B. P. 228.* *Calamintha folio & flore parvo incana I. B. tom. 3. l. 28. 230.*

* *Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta C. B.*

P. 228. Calamintha flore minore, odore Pulegii *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*

Calamintha vulgaris vel Officinarum Germaniæ *C. B. P. 228.* Calamintha flore magno vulgaris *I. B. tom. 3. l. 28. 228.*

Calamintha magno flore *C. B. P. 229.* Calamintha montana, flore magno ex calyce longo *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*

Eadem Pulegii odore, foliis latioribus.

Calamintha cattaria, seu Nepeta vulgaris & major. Mentha cattaria vulgaris & major *C. B. P. 228.* Mentha cattaria *I. B. tom. 3. l. 28. 225.*

Eadem minor. Mentha cattaria minor *C. B. P. 228.*

Calamintha cattaria latifolia *C. B. P.* Mentha cattaria Hispanica, olim Sideritis altissima flore albo *I. B. tom. 3. l. 28. 226. ANN.*

Eadem angustifolia. Mentha cattaria angustifolia *C. B. P. 228.* Mentha cattaria Hispanica, angustioribus foliis *I. B. tom. 3. l. 28. 226. ANN.*

Calamintha tuberosâ radice. Mentha tuberosâ radice *C. P. P. 227.* Menthastrum tuberosâ radice *I. B. tom. 3. l. 28. 227.*

Calamintha arvensis verticillata *C. B. P. v.* Mentha.

Calamus Aromaticus Officinarum *C. B. P. & vulgaris I. B. v.* Acorus.

Calcatrippa vulgò. *v.* Consolida Regalis.

Ca-

Calceolus D. Mariae I. B. v. Helleborine.

CALENDULA vulgaris, flore citrino simplici. *Caltha vulgaris C. B. P. 275. Caltha flore simplici I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN.*
Eadem flore pallido simplici *C. B. P. Var. 275. ANN.*

Eadem flore ruffo, seu luteo medio ruffo *C. B. P. Var. 275. ANN.*

Calendula polyanthos maxima. Caltha polyanthos maxima C. B. P. 275. ANN.

Calendula flore luteo, vel aureo pleno. Caltha polyanthos major C. B. P. 275. Caltha flore pleno I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN.

Eadem flore melino pleno *C. B. P. Var. 276. ANN.*

Calendula flore aureo pleno minor. Caltha polyanthos flore aureo Tab. ANN.

Calendula floribus reflexis. Caltha floribus reflexis C. B. P. 276. ANN.

Calendula prolifera, majoribus floribus. Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. P. 276.

Caltha prolifera I. B. tom. 3. l. 26. 102. ANN.

Calendula minor arvensis. Caltha arvensis C. B. P. 176. ANN.

Eadem Hispanica. ANN.

Minore arvense gracilior & humilior est, quotannis, ritu congenerum, ex semine deciduo propullulans.

Calendula Hieracii flore , Chondrillæ folio,
verrucaria. Cichorium verrucarium *Morif. Hort. Bles.* 361. Cichorium verrucosum,
five Zazinha , Hieraciis annumerandum
I. B. tom. 2. l. 24. 1013. Chondrilla verru-
caria, foliis Cichorii viridibus *C. B. P.* 330.
ANN.

Calendula Hieracii flore, semine falcato. Ci-
chorium falcatum *Morif. Hort. Bles.* 361.
Hieracium siliquâ falcatâ *C. B. P.* 128. Hie-
racium stellatum *I. B. tom. 2. l. 24.* 1014.
ANN.

Calendula procumbens, Hieracii flore , ca-
pitulum inclinans semine adunco. Cicho-
rium semine adunco *Morif. Hort. Bles.* 361.
Hieracium capitulum inclinans , semine
adunco *C. B. P.* 128. Hieracium florem in-
clinans *I. B. tom. 2. l. 24.* 1042. ANN.

Calendula humilis Africana , flore intus albo,
foris violaceo simplici. ANN.

Sequentes potius florum & seminum
dispositionem, quàm foliorum cœterarum-
quæ partium affinitatem, Calendulis inse-
rendam censuimus hanc plantam. Mittit ab
albente parvâ radice cauliculos multos ra-
mosos, dodrantem rarò superantes , nunc
erectos nunc reclinatos; Folia pingua cras-
siuscula, glabra, aliquot laciniis incisa, Erucae
maritimæ non adeo disparia; Flores in ramu-
lorum summitate, petalis simplicibus, Calen-
dula

CALENDULA HUMILIS AFRICANA, FLORE INTUS
ALBO, FORIS VIOLACEO SIMPLICI.



dulā vulgari longioribus, intus lacteis, extus violaceis, ad solem radiatæ stellæ in modum expansis, cœteroquin clausis, ad se collectis & in gyrum revolutis, medium occupante orbiculo croceo, aliquot purpureo-nigricantibus granulis, in tenuissimos villos fatiscentibus, insperso. Semina nuda in parvis capitulis disposita, ritu Calendulæ duplicis speciei, alia orbiculata membranacea compressa, instar Oreoselini Clusii, coloris dilutè castanei, alia, quæ his eleganti ordine, interjacent, teretia spadiceo-fusca, superficie granulata. Utraque fecunditatem probant suo partu, quem, vel autumnō decidua, vel vere studio sata, feliciter excludunt. Alumna est aridorum collium ad Promontorium Bonæ Spei, culturæ sub nostro climate patientissima. Ejus sapor percipitur fatuus aliquando subamaricans; Odor medii disci crocinus, debilis.

Cali. v. Kali.

CALTHA palustris, flore simplici *C.B.P.* 276.
Caltha palustris *I.B. tom. 3. l. 3. 470.*

Caltha palustris flore pleno *C.B.P.* 276. Caltha palustris flore multiplicato *I.B. tom. 3. l. 30. 471.*

Camelina I.B. v. Myagrum.

CAM-

CAMPANULA major lactescens Lobelii
Morif. Hist. 2. 452. Rapunculus hortensis, folio latiori, seu pyramidalis *C. B. P.* 93.
 Pyramidalis lævis *I. B. tom.* 2. l. 20. 808.

Campanula Persicæfolia Lobelii, flore cœruleo *Morif. Hist.* 2. 452. Rapunculus Persicifolius, magno flore *C. B. P.* 93. Campanula angustifolia, cœrulea *I. B. tom.* 2. l. 20. 803.

Eadem flore albo *Morif. Hist.* 2. 452. Rapunculus Persicifolius, magno flore albo *C. B. P.* *Var.* 93. Campanula angustifolia alba *I. B. tom.* 2. l. 20. 803.

Campanula minor Americana, foliis rigidis, cœruleo patulo. Trachelium minus Americanum, flore cœruleo patulo. *Dodart. Mem.* 119. Trachelium minus Americanum, foliis rigidioribus, flore cœruleo patulo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Eadem flore albo. Trachelium idem, flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Campanula radice esculentâ, flore cœruleo. Rapunculus esculentus *C. B. P.* 92. *Morif. Hist.* 2. 455. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B. tom.* 2. l. 20. 795.

Eadem flore candicante. Rapunculus esculentus, flore candicante *C. B. P. Var.* 92.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non ferratis, floribus cœruleis *Morif. Hist.* 2. 456. Campanula minor

rotundifolia vulgaris *C. B. P.* 93. Campanula parva. Anguillaræ Cantabrica *I. B. tom. 2. l. 20.* 798.

Eadem floribus candidis *C. B. P. Var. 93. Moris. Deser. Hist. 2. 456.*

Campanula arvensis erecta. Onobrychis arvensis *C. B. P.* 215. Campanula arvensis minima Dodonæi *Moris. Hist. 2. 457.* Avicularia Sylvii quibusdam *I. B. tom. 2. l. 20.* 800.


Campanula pentagonia perfoliata *Moris. Hist. 2. 457.* Onobrychis peregrina perfoliata, folio rotundiori *Cat. Hort. Reg. Paris. 132.*

Campanula minor annua, foliis incisfis *Moris. Hist. 2. 458.* Rapunculus minor, foliis incisfis *C. B. P.* 92. Erinos Fabii Columnæ minor *I. B. tom. 2. l. 20.* 799. ANN.

Campanula minima Africana, Erini facie, flore violaceo cauliculis procumbentibus. ANN.

Erino Fabii Columnæ accedens plantula in pascuis aliisque irriguis locis circa Promontotium Bonæ Spei reperitur, cujus semina huc advecta latè progerminarunt. Nititur radicè exiguâ, pallidâ, emittente cauliculos tenues, humi procumbentes, in aliquot ramulos divisos, quibus adstant foliola Erino Columnæ longiora, angustiora, pingua, crassiuscula, hilari virore nitentia
fi-

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FACIE,
FLORE VIOLACEO, CAULICULIS PROCUMBENTIBUS.



sinuata, per margines leviter crenata; Ad horum alas prodit tenuissimus pedicellus, sustinens ex caliculo exiguo subhirsuto quinque partito flosculum parvum, oblongum monopetalum campanulatum, quinque profundioribus crenis dissectum, coloris in purpurâ violacei; Hoc defluxo, succedit more congenerum vasculum oblongum exiguum, trigonum, tricapsulare, tribus foraminulis vix conspicuis pertusum, continens, semina minutissima rubiginea. Totâ plantula lacte tenui, aquoso, subdulci turget. Floret ab Augusto in mediam hyemem usque, seminibus deciduis sese propagans.

Eadem cauliculis erectis.

Hæc antedictæ adeò similis est, ut antequam adolescit, vix ab illâ discerni queat. Cauliculos acquirit robustiores rectâ assurgentes, dodrantes; Folia longiora & angustiora; Flosculos minores in pedunculis longioribus. Cætera verò conveniunt. Offendi cum superiori locis humentibus ad Promontorium Bonæ Spei.

Campanula maxima, foliis latissimis C. B. P.

94. *Morif. Hist.* 2. 459. flore cœruleo. Campanula pulchra, à Tosano Carolo missa
I. B. tom. 2. l. 20. 807.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 94.

Cam-

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FA-
CIE, FLORE VIOLACEO, CAULICULIS
ERECTIS.



Campanula vulgarior, foliis Urticæ, vel major & asperior C. B. P. 94. Moris. Hist. 2. 459. I. B. tom. 2. l. 20. 805. Flore cœruleo C. B. P. Var. 94.

Eadem flore candido C. B. P. Var. 94.

Eadem flore dilutè purpurascēte C. B. P. Var. 94.

Eadem flore duplici cœruleo, interdum triplici aut quadruplici Cat. Hort. Reg. Paris. 36.

Eadem flore duplici albo Cat. Hort. Reg. Paris. 36.

Campanula Urticæ foliis oblongis, minus asperis C. B. P. 94. Flore cœruleo.

Eadem flore albo. An Campanula sive Cervicaria major lævior, flore magno albo I. B. tom. 2. l. 20. 806?

Campanula hortensis, flore & folio oblongo C. B. P. 94. Moris. Hist. 2. 459. flore cœruleo. Viola Mariana Dodonæi, quibusdam Medium I. B. tom. 2. l. 20. 804. ANN.

Eadem flore subalbido C. B. P. Var. 94. Moris. Hist. 2. Descr. 495. ANN.

Campanula hortensis, Rapunculi radice C. B. P. 94. Campanula hortensis, Rapunculi radice repente Moris. Hist. 2. 460. Campanula repens, flore minore cœruleo I. B. tom. 2. l. 20. 706.

Campanula foliis Echii C. B. P. 94. Moris. Hist. 2. 460. Trachelium altissimum hirsutum aspe-

asperius, foliis angustis, floribus parvis *I. B. tom. 2. l. 20. 801.*

Campanula pratensis, flore conglomerato *C. B. P. 94. Morif. Hist. 2. 461.* *Trachelium minus* multis *I. B. tom. 2. l. 20. 800.* Flore cœruleo.

Eadem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 47.*

Campanula Indica. I. B. v. Convolvulus.

CAMPHORIFERA arbor, ex quâ Camphora Officinarum. Arbor Camphorifera Japonica *Breyn. Cent. 1. 11. Prodr. 4.* Camphora Officinarum *C. B. P. 500.* Camphura, quæ Salicis folio dicitur *I. B. tom. 1. l. 9. 338.*

Rarissimum & elegantissimum hoc arbutum, Horti nostri decus & ornamentum, acceptum referimus Illustrissimo Dn. Hieronymo Beverningio, rariorum plantarum æstimatori incomparabili, cui pro hōc splendidissimo munere & innumeris aliis in Rempublicam herbariam meritis laudes & gratias summas habendas esse censemus.

Canella C. B. P. & I. B. v. Cassia.

CANNA Indica latifolia maxima. Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo *Cat. Hort. Reg. Paris. 25.*

Canna Indica latifolia humilior, flore fatu-

H

ra-

ratiùs rubente. *Arundo Indica latifolia* C. B. P. 19. I. B. tom. 2. l. 18. 489. Langoas *Stapel* 334.

Eadem Americana, flore fulgenti cocco splendente.

Inter alia pulchra semina à Dno Henrico Meiero, Rei herbariæ studiosissimo, ex Surinamâ ad nos transmissa, prodiit hæc planta, quæ non nisi adulta à superiore dignoscitur. Stipites edit superiore paulò humiliores; Flores hilari cocco intensissimè rubentes; Semina minora in spadiceo nigrificantia; Cætera paria.

Eadem flore luteo punctato. *Arundo Indica latifolia*, flore luteo punctato C. B. P. 19. I. B. tom. 2. l. 18. 490.

Canna Indica angustifolia, flore flavo. *Albapison*. l. 5. 21.

Cannabina aquatica C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

CANNABIS sativa C. B. P. 320. Cannabis Mas. I. B. tom. 3. l. 30. 447. ANN.

Cannabis erratica C. B. P. 320. Cannabis Fœmina I. B. tom. 3. l. 30. 448. ANN.

Cannabis sylvestris quorundam, *Urticæ inerti affinis* I. B. v. *Sideritis*.

Canabrica Anguillaræ I. B. v. *Campanula*.

Caphura, quæ Salicis folio dicitur I. B. v. Camphora.

Capillus Veneris I. B. v. Adiantum.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. P. 480. *Morif. Hist.* 2. 284.

Capparis spinosa I. B. tom 2. l. 14. 63.

Capparis Portulacæ folio C. B. P. 480. *Capparis Fabaginea*, sive *Peplios Lutetianorum* I. B. tom. 2. l. 14. 66.

Caprifolium perfoliatum & non perfoliatum I. B. v. *Periclymenum*.

Capsicum vulgò. v. *Solanum*.

Caracalla vulgò. v. *Phaseolus*.

Carchichec Turcarum *Morif.* v. *Primula veris*.

Cardamine ejusque species I. B. v. *Nasturtium*.

CARDIACA Africana perennis, foliis Sideritidis, floribus longissimis phœniceis villosis. *Leonurus perennis Africanus vulgò.* *Leonurus Capitis Bonæ Spei Breyn. Cent.* 1. *Sideritis Cannabina Æthiopica frutescens, phœniceo flore maximo villoso Breyn. Prodr.* 47.

Cardiaca Americana annua, Nepetæ folio, floribus brevibus phœniceis villosis. Leonurus annuus Americanus vulgò

Si à florum & seminum, ceu partium
potiorum & magis constantium, consimi-
li dispositione plantæ reducendæ sunt in
consimilia genera & species, existimo, u-
trumquè Leonurum Africanum & Ameri-
canum nullibi aptius, quàm ad Cardiacam
esse referendum, & consimili nomine ap-
pellandum. Uterquè enim producit ver-
ticillatâ serie, veluti vulgaris Cardiacæ, flo-
res galeatos, labro exiguo trifido, & semi-
na quaterna oblonga angulosa. Africanum
curiosissimè descripsit Dn. Jacobus Brey-
nius in Centuriâ Plantarum exoticarum
primâ, ut & in Prodro-mo fasciculi Planta-
rum rariorum. Americanus verò adolescit
caule tricubitali & altiori, herbaceo, can-
dicante, quadrangulo, striato, solido, albâ
medullâ farcto, quem per remotiora inter-
valla, verticillato ambitu, amplectuntur
utriculi densâ numerosâquè congerie invi-
cem incumbentes, tubulosi, quinquanguli,
striati, superiore longiores, ex brevibus
pedunculis deorsum flexi, & quadante-
nus falcati, orificio ampliori, septem mol-
leculis aculeis, sex brevioribus, uno in
summo longiori & robustiori, armato; Ex
his exeunt flores galeati vix labiati, præ-
cedente Africanâ triplo breviores & gra-
tiliores, villosi, phœnicei coloris, succe-
dentibus quaternis seminibus oblongis,
an-

CARDIACA AMERICANA ANNUA NEPETÆ FOLIO,
FLORIBUS BREVIBUS PHOENICEIS VILLOSIS.



angulosis, spadiceis, superiore itidem brevioribus & angustioribus. Ad singula genicula ab imo caulibus ad summum usque nascuntur folia bina ex opposito alternatim, Nepetæ haud multum absimilia, ampliora tamen, non nihil incana, mollia, & in ambitu magis crenata. Radix subest lignosa albicans fibrosa, pro plantæ ratione sat parva; Nata, semine, ex Surinamâ advecto, eo, quo floruit, anno periit. Viribus non multum abluere à congeneribus, propter consimilem saporem & odorem non dubitandum arbitror.

Cardiaca *I. B. tom. 3. l. 28. 320.* Marrubium

Cardiaca dictum *C. B. P. 230.*

Eadem foliis eleganter crispis *Cat. Hort. Oxon. 38.*

Hæc à præcedenti Cardiaca vulgari differt tantum foliis imis mollioribus, amplioribus, profundius & crebrius laciniatis, marginibus pallidis, undulatis & incrispatis.

Carduncellus montis Lupi I. B. v. Cnicus.

CARDUUS pratensis latifolius *C. B. P. 376.*

Carduus pratensis Tragi *I. B. tom. 3. l. 25. 42.*

Carduus vinearum repens, folio Sonchi & Carduus in avenâ proveniens *C. B. P. 377.*

Ceanothus *Column. Ecphr. p. 1. 45.* Carduus serpens lævicaulis *I. B. tom. 3. l. 25. 59.*

Idem

Idem floribus albis, caule tuberoso, qui Hæ-
morrhoidalis Parisiensium *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 37.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris *C. B. P.*
381. Carduus Marianus, sive lacteis ma-
culis notatus *I. B. tom. 3. l. 25. 52. ANN.*

Carduus albis maculis notatus, exoticus *C. B.*
P. 381. Carduus lacteus peregrinus Camer
I. B. tom. 3. l. 25. 53. ANN.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 38.
ANN.

Carduus tomentosus latifolius, sylvestris, Spi-
na alba vel Acanthium dictus. Spina alba
tomentosa latifolia, sylvestris *C. B. P.* 382.
Spina alba sylvestris Fuchſio *I. B. tom. 3.*
l. 25. 54. Flore purpureo C. B. P. Var. 382.
Ann.

Idem flore albo *C. B. P. Var. 382. ANN.*

Idem Illyricus spinosior, capitulis maioribus.
Spina tomentosa altera spinosior *C. B. P.* 382.
Carduus quibusdam dictus Acanthium Il-
lyricum, alius verò Onopordum *I. B. tom. 3.*
l. 25. 55. ANN.

Carduus spinosissimus latifolius sphæroce-
phalus, vulgaris *C. B. P.* 385. Carduus lan-
ceolatus sive sylvestris Dodonæi *I. B. tom.*
3. l. 25. 58. ANN.

Carduus spinosissimus angustifolius, vulgaris
C. B. P. 385. Carduus caule crispo *I. B. tom.*
3. l. 25. 59.

Carduus nutans *I. B. tom. 3. l. 25. 56. ANN.*

* *Carduus lanceatus latifolius* *C. B. P. Flore purpureo. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38. ANN.*

Carduus lanceolatus ferocior *I. B. tom. 3. l. 25. 58. ANN.*

Carduus stellatus, foliis *Papaveris erratici* *C. B. P. 387. Carduus stellatus, five Calci-trappa* *I. B. tom. 3. l. 25. 89. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38. ANN.*

Carduus Chrysanthemus Africanus. Scolymus Chrysanthemus annuus *Dodart. Mem. III.*

Carduus Polyacanthus, folioso caule, *Acarna dictus. Polyacanthus Casabonæ, Acarnæ similis* *I. B. tom. 3. l. 25. 92. Acarna Theophrasti vulgò. ANN.*

Carduus Salmanticensis, Acarnæ foliis incanis. Acarna major caule folioso *C. B. P. 379. Acarnæ similis, flore purpureo; Chamæleon Salmanticensis Clusio* *I. B. tom. 3. l. 25. 91. ANN.*

Carduus humilis, minore flore, *Carlinae foliis. Carlina acaulos, minore purpureo flore* *C. B. P. 380. Chamæleon exiguus Tragi* *I. B. tom. 3. l. 27. 62. ANN.*

CARLINA acaulos, magno flore *C. B. P. 380. Carlina caulifera vel acaulos* *I. B. tom. 3. l. 25. 64.*

Car-

Carlina sylvestris quibusdam, aliis *Attractylis* *I. B. tom. 3. l. 25. 81.* *Cnicus sylvestris spinosior* *C. B. P. 378. ANN.*

Eadem flore aureo, perennis. *Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, perennis* *Cat. Hort. Reg. Paris. 54.*

Carlina minor sylvestris Clusii, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 25. 84.* *Acarna flore luteo patulo* *C. B. P. 379.*

Carlina acaulos, minore purpureo flore *C. B. P. v. Carduus.*

Carota ejusquè species *I. B. v. Pastinaca.*

CARPINUS *Matt. in lib. 1. Diosc. c. 95.* *Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis* *C. B. P. 427.* *Fagus sepium, vulgò Ostriis Theophrasti* *I. B. tom. 1. l. 8. 146.* & *C. B. P. in Matth. l. 1. c. 95.*

Carthamus ejusquè species *I. B. v. Cnicus.*

CARUM, sive *Carvi Moris. Umbell. 24.* *Cuminum pratense, Carvi Officinarum* *C. B. P. 158.* *Caros* *I. B. tom. 3. l. 27. 69. ANN.*

CARYOPHYLLATA vulgaris *C. B. P. 321.* *Moris. Hist. 2. 430.* *Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo* *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Virginiana, albo flore minore radice inodorâ.

Huic sunt folia longiuscula, attactu aspera, crenata, inferiora palmam ampla, laciniata, superiora angusta, rarius laciniata, leviter mucronata; Caules ad duo cubita elevati, non nihil villosi & asperi, in multiplices furculos divisi; Flores Caryophyllatae vulgaris effigie, petalis pallidis angustissimis exiguis, staminibus herbaceis cum apiculis pallidè flavescentibus. Semina ritu superioris nuda, in capitulum congesta, brevioribus & minus rigidis filamentis caudata. Radix subest alba, multis capillamentis fibrata, sapore & odore fatua. Misit ad nos Dn. Jacobus Bobartus Horti Oxoniensis Custos, Vir in studio simplicium exercitissimus.

Caryophyllata Alpina lutea major *Morif. Hist.*

2. 430. Caryophyllata Alpina lutea *C. B.*

P. 322. Caryophyllata montana, flore magno luteo *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Alpina longifolia, sinuatis & profundè incisis foliis *Morif. Hist.* 2. 431.

Caryophyllata Alpina minor *C. B. P.* 322.

Caryophyllata montana lutea, nutante flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 39.

Caryophyllata aquatica, nutante flore purpureo, calathi effigie *Morif. Hist.* 2. 431.

Caryophyllata aquatica, nutante flore *C. B.*

P. 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro striato *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Ca-

*Caryophylleus flos aphyllocaulos vel juncus
ejusquæ species* I. B. v. Scabiosa.

CARYOPHYLLUS maximus ruber C. B. P. 207.
Morif. Hist. 2. 561.

Caryophyllus maximus variegatus C. B. P. 207.
Morif. Hist. 2. 561. *Betonica coronaria*,
flore pleno, maxima, punctis rubris varie-
gata I. B. tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colo-
re mixto carneo, quibusdam corniculis la-
cteis du Bry C. B. P. *Var.* 207. *Morif. Hist.* 2.
561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
vario in diversis petalis scarlatino, dilutiùs
rubente, albo, du Bry C. B. P. *Var.* 707. *Mo-
rif. Hist.* 2. 561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
rubro saturationi, staminulis tribus niveis in
medio, du Bry C. B. P. *Var.* 207. *Morif. Hist.*
2. 561.

Ejusdem variæ differentiæ, mirâ florum ele-
gantiâ inter se certantes.

Caryophyllus altilis, major C. B. P. 207. *Morif.
Hist.* 2. 561. *Betonica coronaria*, sive Ca-
ryophylleus flos I. B. tom. 3. l. 29. 327.

Idem multiplex, flore albo Eyft. C. B. P. *Var.*
207.

Idem flore carneo Eyft. C. B. P. *Var.* 207.

Idem flore rubro Eyft. C. B. P. *Var.* 207.

Idem

Idem coloris albi, mixtâ & sparsâ rubedine, Bry,
C. B. P. *Var.* 207.

Idem flore albo, flammulis ruberrimis C. B. P.
207.

Idem flore albo, lineis rubris subtilissimè di-
stincto C. B. P. *Var.* 207.

Ejusdem plures species, pro vario pingentis
naturæ lusu, varios præ se ferentes colores.

• Caryophyllus altilis medius C. B. P. 208. *Morif.*
Hist. 2. 561. Flore albo lineis cermesini co-
loris C. B. P. *Var.* 208. & *Morif.* *Hist.* 2. 561.

Idem flore miniato, medio albescente C. B. P.
208. *Morif. ibid.*

Ejusdem plures differentiæ, colorum variorum
elegantia sese commendantes.

Caryophyllus pleno flore, Mali aurantii colo-
re C. B. P. 208 *Morif. Hist.* 2. 561. Betonica
coronaria rara, flore phœniceo pleno I. B.
tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus pleno flore minor C. B. P. 208.
Morif. Hist. 2. 561.

Caryophyllus supinus, pleno flore rubro, ar-
genteis micis asperfo C. B. P. 208. *Morif.*
Hist. 2. 561.

[Caryophyllus multiplex laciniatus C. B. P. 208.
Morif. Hist. 2. 561. Betonica coronaria su-
perba, sive Caryophylleus flos, folio te-
nuissimè dissecto, flore pleno purpurascen-
te I. B. *tom.* 3. l. 29. 331.

Idem

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 208. *Morif. Hist.* 2. 561.

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore C. B. P. 208. *Morif. Hist.* 2. 561. Betonica coronaria, sive Caryophyllus flore simplici, fativus *I. B. tom.* 3. l. 29. 325.

Ejusdem varietates multæ, variis in florum petalis coloribus notatæ.

Caryophyllus simplex, flore minore pallidè rubente C. B. P. 208.

Caryophyllus simplex minor, flore punctato C. B. P. 208. Betonica coronaria minima, micis aureis aspersa *I. B. tom.* 3. l. 29. 329.

Caryophyllus simplex supinus, latifolius C. B. P. 208. Betonica coronaria, sive Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens, flore argenteis punctis notato *I. B. tom.* 3. l. 29. 329.

Caryophyllus sylvestris vulgaris, latifolius C. B. P. 209. Betonica coronaria, sive Caryophyllus sylvestris, vulgatissimus *I. B. tom.* 3. l. 29. 334. Flore simplici suaverubente, seu purpureo odorato C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore simplici purpureo inodoro C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore purpureo odoro pleno C. B. P. *Var.* 209.

Caryophyllus vulgaris, sylvestris angustifolius C. B. P. 208.

Idem unguibus purpureis insignis. Betonica
co.

coronaria, five Caryophyllea, corollâ purpureâ insignis *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Idem crispante flore incarnato, unguibus striatis purpurascentibus insignis. Betonica coronaria five Caryophyllea, ex rubello albicante & crispante flore cum corollâ *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Caryophyllus sylvestris pusillus omnium minimus, unico flore *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico *C. B. P. 209.* Betonica coronaria, five Caryophyllea repens rubra *I. B. tom. 3. l. 29. 328.*

Idem flore albo. Betonica coronaria, five Caryophyllea repens alba *I. B. tom. 3. l. 29. 328.*

Caryophyllus sylvestris juncifolius cœruleus Monspeliensium *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus cœruleus Monspeliensium *C. B. P. 209.* Aphyllantes Monspeliensibus *I. B. tom. 3. l. 29. 335.*

Caryophyllus plumarius, flore inodoro tenuissimè secto *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus flore tenuissimè secto *C. B. P. 209.* Betonica coronaria tenuissimè dissecta, five Caryophyllea superba elatior, vulgaris *I. B. tom. 3. l. 29. 330.*

Idem flore dilutius rubente *C. B. P. Var. 210. Morif. Hist. 2. 562.*

Caryophyllus plumarius, floribus odoratis,
sta-

staminulis corniculatis *Morif. Hist. 2. 562.*

Caryophyllus sylvestris tertius, flore laciniato, staminulis corniculatis odoratis *C. B.*

P. 210. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus plumarius, floribus odoratis sine corniculis *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, flore laciniato sine corniculis, odore *C. B. P. 210.* Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato planè albo sine corniculis *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus floribus odoratis lanuginosis hirsutis *Morif. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis *C. B. P. 210.* Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo cum corollâ purpurascente hirsutâ *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Idem floribus purpurascentibus sine hirsutie.

Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato purpurascente cum corollâ fuscâ & penè rubente sine hirsutie *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus barbatus hortensis, flore multiplici *C. B. P. 208. Morif. Hist. 2. 563.* Betonica coronaria latifolia petræa, pleno flore rubro vel ad purpureum accedente *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem

Idem flore albo *C. B. P. Var. 208.* *Betonica coronaria latifolia petræa*, pleno flore albo *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Caryophyllus barbatus, flore roseo *C. B. P. 208.*

Caryophyllus barbatus hortensis simplex latifolius Morif. Hist. 2. 563. *Betonica coronaria latifolia petræa*, flore punctulis albis notato *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem flore albo, maculis lactei coloris notato *C. B. P. Var. 208.*

Idem flore carneo.

Idem flore versicolore rubro & carneo guttato in eodem ramulo, seu diversicolore ex albo rubro & medio *C. B. P. Var. 208.* *Betonica coronaria latifolia*, flore picturato *Vesuntina I. B. tom. 3. l. 29. 334.*

Caryophyllus barbatus hortensis simplex angustifolius C. B. P. 209. Morif. Hist. 2. 563. *Betonica coronaria minus latifolia*, flore profundo dissecto *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem flore omnino niveo *C. B. P. Var. 209.*

Idem flore purpurascente, oris albis *C. B. P. Var. 209.*

Idem flore versicolore in eodem ramulo *C. B. P. Var. 209.*

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus angustifolius, perpaucis capitulis donatis *Morif. Hist. 2. 563.* *Caryophyllus barbatus sylvestris C. B. P. 209.* *Viola barbata angustifolia*

stifolia I. B. tom. 2. l. 29. 335. ANN.

Caryophyllus barbatus sylvestris annuus latifolius, multis capsulis simul junctis donatus *Morif. Hist.* 2. 563. *Caryophyllus sylvestris prolifer* C. B. P. 209. *Betonica coronaria squamosa sylvestris* I. B. tom. 3. l. 29. 335. ANN.

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus arvensis umbelliferus I. B. v. Lychnis.

Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius C. B. P. & I. B. v. Lychnis.

Caryophyllus minimus muralis C. B. P. v. Lychnis.

Caryophyllus montanus, flore globoso, ejusque species C. B. P. v. Scabiosa.

Caryophyllus pratensis, flore laciniato, ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

CASSIA fistula Alexandrina C. B. P. 403.
Cassia purgatrix I. B. tom. 1. l. 12. 416.
Conna Hort. Mal. tom. 1. 37.

CASSIA Cinamomea. *Cinamomum* sive *Canella Zeylanica* C. B. P. 408. *Canella* sive *Cinamomum vulgare* I. B. tom. 1. l. 4.

440. Canella, quæ Curdo Pison. Mant.
 Arom. 165. Kurundu Zeylanensibus.
 Cortices duos transmittit Oriens in
 Medicorum Offeinas, facie quidem & ge-
 nere consimiles, sed nomine discretos, vi-
 delicet Cassiam Cinamomeam, vulgò Cina-
 momum seu Canella dictam, & Cassiam
 ligneam. Prior luxuriat in Insulâ Zeylan,
 posterior in Malabarâ, Sumatrâ, Javâ, &
 Francisco Hernande *Hist. Mexic. l. 2. 35.*
 teste, in Insulis Philippinis. Cassia verò
 Malabarica cum in *Hort. Malab. tom. 1.*
107. nomine Caruæ accuratissimè describi-
 tur, & à Cinamomeâ seu Zeylanicâ tantum
 acrimoniâ, suavitatē, & virtutis præstantiâ,
 neutriquam facie modovè crescendi discrimi-
 natur; Insuper etiam in Musæo nostro
 Zeylanico pertexendam suscepi historiam
 integram Cassiæ ejusquē specierum subal-
 ternarum, quas in orientalibus plagis mihi
 conspiciere licuit, duxi supervacaneum hu-
 jus descriptionem hîc apponere. Cæterum
 Cassia Cinamomea, aliquoties à me ex Zey-
 lan in Belgiam transmissâ, viguit in horto
 Bentingiano, Beverningiano & Nostro ad
 secundum tertiumvè annum, quo, inciden-
 te brumâ rigidiori, interiit.

Cassida Column. v. Scutellaria.

Cassutha I. B. v. Cuscuta.

CASTANEA fativa C. B. P. 419. Castanea
I. B. tom. 1. l. 7. 121.

* Castanea sylvestris, quæ peculiariter Castanea
C. B. P. 419.

Castanea folio multifido C. B. P. 419. Casta-
nea equina, folio multifido I. B. tom. 1. l. 7.
128.

Catanance Dalechampii I. B. v. Cichorium.

Catanance leguminosa quorundam I. B. v. La-
thyrus.

Cataputia minor I. B. v. Lathyrus.

Cattugasturi Hort. Mal. v. Althæa.

CAUCALIS arvensis echinata latifolia C. B. P.
152. Moris. Umbell. 33. Lappula canaria
latifolia sive I. B. tom. 3. l. 27. 80. ANN.

Eadem flore albo Moris. Umbell. 33. ANN.

Caucalis Monspeliensis, echinato magno fru-
ctu C. B. P. 153. Moris. Umbell. c. 6. 33.

Lappula canaria, flore pulchro magno albo
I. B. tom. 3. l. 27. 79. ANN.

Caucalis Daucoides Tingitana Moris. Umbell.
33.

Caucalis arvensis echinata, parvo flore & fru-
ctu C. B. P. 152. Caucalis minor arvensis, par-
vo flore & fructu Moris. Umbell. 33. Lappula
canaria, flore minore sive tenuifolia I. B.
tom. 3. l. 27. 80. ANN.

Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus
C. B. P. 152. Anthriscus quorundam, semi-

ne aspero hispido I. B. tom. 3. l. 27. 83.
ANN.

- * *Caucalis lato Apii folio* C. B. P. 152. *Caucalides Matthioli* I. B. tom. 3. l. 27. 82. ANN.
Caucalis maxima, Sphondilii aculeato semine C. B. P. v. *Tordilium*.
Cauda muris I. B. v. *Holosteio affinis*.
Ceanothos Column. v. *Carduus*.
Cauda pavonis Zeylanensibus. v. *Crista Pavonis*.

CEDRUS conifera, foliis Laricis C. B. P. 490.
Cedrus magna, sive Libani conifera I. B. tom. 1. l. 9. 277.

Cedrus folio Cupressi major, fructu flavescente C. B. P. v. *Juniperus*.

Cedrus Phœnicea Bellonio I. B. v. *Juniperus*.

Cedrus Lycia retusa Bellonio dicta I. B. v. *Juniperus*.

Cedrus Bormudiana vulgò. v. *Juniperus*.

Cedrus Virginiana vulgò. v. *Juniperus*.

Cedrus novæ Angliæ vulgò. v. *Juniperus*.

Celastrus Theophrasti Clus. v. *Alaternus*.

CENTAURIUM majus, folio in lacinias plures diviso C. B. P. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio* I. B. tom. 3. l. 25. 38.

Centaurium foliis Cinaræ Cornut. 72.

Centaurium Alpinum luteum C. B. P. 117.

Centauroides glabro flore flavescente I. B. tom.

tom. 3. l. 25. 40. Centaurium majus luteum
Cornuti.

Centaurium majus, Rha capitatum, folio E-
nulæ subtus hirsuto & incano *I. B. tom. 3. l.*
25. 41.

Centaurium capitatum ciliare annuum, foliis
laciniatis ferratis *Morif. Hort. Bles. 362.*
Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpura-
scente flore *C. B. P. 130.* Cyanus pulchro se-
mine Centaurii majoris *I. B. tom. 3. l. 25. 24.*
Crupina Belgarum vulgò. ANN.

CENTAUURIUM luteum perfoliatum *C. B. P.*
278. Morif. Hist. 2. 565. Perfoliatum Cen-
taurium luteum *I. B. tom. 3. l. 29. 355.*
ANN.

* Centaurium minus rubrum *Morif. Hist. 2. 566.*
Centaurium minus *C. B. P. 278.* Flore è pu-
niceo colore in purpurâ rubente *C. B. P. Var.*
278. Centaurium minus, flore purpureo *I. B.*
tom 3. l. 29. 353. ANN.

* Idem album *Morif. Hist. 2. 566.* Centaurium
minus, flore albo *C. B. P. Var. 278. I. B. tom.*
3. l. 29. 353. ANN.

Centaurium minus adulterinum quibusdam A
B. v. Lychnis.

Centimorbia I. B. v. Nummularia.

Centinodia, I. B. v. Polygonum.

- C**EP A vulgaris C. B. P. 71. *Morif. Hist.* 2. 383. Floribus & tunicis purpurascen-
 bus C. B. P. *Var.* 71. Cœpe five Cēpa rubra
 rotunda I. B. *tom.* 2. l. 19. 547.
 Eadem floribus & tunicis candidis C. B. P. *Var.*
 71. Cœpe five Cēpa alba rotunda I. B. *tom.*
 2. l. 19. 547.
 Cēpa oblonga C. B. P. 71. *Morif. Hist.* 2. 383.
 Cœpe five Cēpa longa I. B. *tom.* 2. l. 19.
 547.
 Cēpa radice candidâ dulci C. B. P. 71.
 Cēpa Ascalonica Matthioli *Morif. Hist.* 2. 383.
 Cēpa sterilis, Tragi C. B. P. 72. Cēpa Asca-
 lonica, five fissilis I. B. *tom.* 2. l. 19. 551.
 Cēpa sectilis juncifolia perennis *Morif.* 2.
 383. Porrum sectivum juncifolium C. B. P.
 72. Porrum sectivum & Schoenoprasson
 quibusdam I. B. *tom.* 2. l. 19. 553.
 Cēpæa C. B. P. v. Sedum.

- C**ERASA fativa rotunda, rubra & acida,
 quæ nostris Cerasa fativa C. B. P. 449. Ce-
 rasus I. B. *tom.* 1. l. 2. 216.
 Cerasa fativa majora C. B. P. 450. Cerasa Du-
 racena oblonga I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.
 Cerasa acidissima sanguineo succo C. B. P. 450.
 Cerasa acida rubella I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.
 Cerasa crassa carne durâ C. B. P. 450.
 Cerasa carne tenerâ & aquosâ C. B. P. 450.
 Cerasa alba dulcia C. B. P. 450.

Cerasa

Cerasa acida nigricantia solidiora, tardius maturefcentia *I. B. tom. 1. l. 2. 121.*

CERASUS major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente *C. B. P. 450.* Cerasus sylvestris, fructu nigro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Eadem rubro colore *C. B. P. Var. 450.* Cerasus sylvestris, fructu rubro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Cerasus hortensis, flore roseo *C. B. P. 450.*

Cerasus hortensis, flore pleno *C. B. P. 450.*

Cerasus flore pleno *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus hortensis, fructu sine ossiculis.

Cerasus folio Laurino *C. B. P. 450.* Laurocerasus *I. B. tom. 1. l. 4. 420.*

Cerasus pumila *C. B. P. 450. I. B. tom. 1. l. 2. 222.*

Cerasus racemosa hortensis *C. B. P. 450.* Cerasus uno pediculo plura ferens, & Cerasus racemosa *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli *C. B. P. 451.* Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus *I. B. tom. 1. l. 2. 228.*

Ceraso affinis *C. B. P. 451.* Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata *I. B. tom. 1. l. 2.*

CERATONIA. Siliqua edulis *C. B. P. 402.* Siliquæ arbor, sive Ceratia *I. B. tom. 1. l. 12. 413.*

Cerifolium sativum Moris. v. Chærophillum.

*Cereus Peruanus spinosus, fructu rubro nucis
 & magnitudine C. B. P. v. Ficus.*

CERINTHE sive Cynoglossum montanum
 majus C. B. P. 258. Cerinthe quorundam
 major, versicolore flore *I. B. tom. 3. l. 33.*
 602. ANN.

Eadem flore ex rubro purpurascente C. B. P.
 258. Cerinthe quorundam major, flore ex
 rubro purpurascente *I. B. tom. 3. l. 33. 603.*
 ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. *Var.* 258. ANN.

Eadem flore flavo asperior C. B. P. 258. Ce-
 rinthe quorundam major, spinoso folio,
 flavo flore *I. B. tom. 3. l. 33, 602.* ANN.

Cerinthe minor C. B. P. 258. Cerinthe quo-
 rundam minor, flore flavo *I. B. tom. 3. l. 33.*
 603. ANN.

Cerrus I. B. v. Quercus.

Cervaria nigra I. B. v. Libanotis.

Cervaria alba I. B. v. Laserpitium.

CETERACH Officinarum C. B. P. 354. A-
 splenum sive Ceterach *I. B. tom. l. 37. 740.*

CHÆROPHYLLUM fativum C. B. P.
 152. Cerefolium fativum *Morif. Umbell.*
 46. Chærephyllon *I. B. tom. 3. l. 27. 75.*
 ANN.

* Chærophyllum seu Cerefolium sylvestre pe-
 renne,

renne, seminibus lævibus nigris *Morif.*
Umbel. 46. Myrrhis sylvestris, seminibus
 lævibus C. B. P. 160. Cicutaria vulgaris *I. B.*
tom. 2. l. 27. 181.

Chærophyllo sylvestre C. B. P. v. Myrrhis.

Chærophyllo nonnihil similis C. B. P. v. Alchymilla.

Chamæbalanus leguminosa *I. B.* v. Lathyrus.

Chamæbuxus flore Coluteæ C. B. P. v. Astragalus.

Chamæcerasus ejusquæ species C. B. P. v. Periclymenum rectum.

Chamæcistus ejusquæ species C. B. P. v. Cistus humilis.

Chamæcrista pavonis Brasiliæna siliquâ singulari Breyn. v. Senna.

Eadem Americana siliquâ multiplici Breyn. v. Senna.

CHAMÆDRYS major repens C. B. P. 249.
Chamædrys vulgò vera existimata *I. B.*
tom. 3. l. 28. 288.

* *Chamædrys minor repens* C. B. P. 249.

Chamædrys foliis laciniatis, Botryos facie.

Botrys Chamædrioides C. B. P. 138. *Botrys verticillata* *I. B.* *tom.* 3. l. 28. 298. ANN.

Chamædrys spuria major altera frutescens C. B. P. v. Veronica.

Chamædrys spuria major angustifolia C. B. P. v. Veronica.

Chamædrys spuria minor rotundifolia C. B. P. v. Veronica.

Chamægenista ejusque species C. B. P. v. Genista humilis.

Chamæiris ejusque species C. B. P. v. Iris humilis.

CHAMÆLÆA tricoccos C. B. P. 462. I. B. tom. 1. l. 5. 584.

Chamæleagnus Dod. I. B. v. Rhus.

Chamæleon Salmaticensis Clusii I. B. v. Carduus.

Chamæleon exiguus Tragi I. B. v. Carduus.

* **C**HAMÆMELUM vulgare, sive Leucanthemum Diosc. C. B. P. 135. Chamæmelum vulgare amarum I. B. tom. 3. l. 26. 116.

Chamæmelum nobile, sive Leucanthemum odoratius C. B. P. 135. Chamæmelum odoratissimum repens, flore simplici I. B. tom. 2. l. 26. 118.

Chamæmelum Leucanthemum Hispanicum, magno flore, quod i. est in prodromo C. B. P. 135.

Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. P. 135. Chamæmelum repens odoratissimum perenne, flore multiplici I. B. tom. 3. l. 26. 119

Chamæmelum luteum, capitulo aphylo C. B. P. 135. Chamæmelum aureum peregrinum,

num, capitulo sine foliis *I. B. tom. 3. l. 26. 119.*

* *Chamæmelum inodorum C. B. P. 135.* Chamæmelum inodorum, sive *Cotula non foetida I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

Idem flore pleno *Sutherland Hort. Edenburg. 79. ANN.*

* *Chamæmelum foetidum C. B. P. 135.* Chamæmelum foetidum, sive *Cotula foetida I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

Chamæmelum Æthiopicum lanuginosum Breyn. Cent. I. 148. ANN.

Chamæmespilus Cordi C. B. P. v. Mespilus.

Chamæmespilus I. B. v. Mespilus.

Chamænerion ejusque species C. B. P. v. Lyfimachia.

CHAMÆPITYS moschata, foliis ferratis *C. B. P. 249.* Chamæpitys, sive *Iva moschata Monspeliensium I. B. tom. 3. l. 28. 296.*

Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido C. B. P. 249. Chamæpitys vulgaris odorata, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 28. 295. ANN.*

Chamæpitys cærulea Austriaca C. B. P. 250. v. Hyslopus.

Chamæpixos I. B. v. Astragalus.

Chamæriphe I. B. v. Palma humilis.

Chamærhododendron Breyn. v. Cistus.

Cha-

Chamaesyce Matth. C. B. P. I. B. v. Tithymalus.

* **C**HELIDONIA rotundifolia minor C. B. P. 309. Scrophularia minor, five Chelidonium minus vulgò dictum *I. B. tom. 3. l. 30. 468.* Ranunculus præcox rotundifolius granulatâ radice *Morif. Hist. 2. 446.*

* Eadem rotundifolia minor, folio maculato C. B. P. *Var. 309.*

Eadem rotundifolia minor, flore pleno Camerarii C. B. P. *Var. 309.*

CHELIDONIUM maximum Canadense ἀκων-
λον Cornuti 212. *Morif. Hist. 2. 257.*

* Chelidonium majus vulgare C. B. P. 144. *Morif. Hist. 2. 257.* Chelidonia *I. B. tom. 3. l. 30. 482.*

Chelidonium majus, laciniato flore, & foliis quernis *Morif. Hist. 2. 257.* Chelidonium majus, foliis quernis C. B. P. 144.

Idem floribus & foliis tenuissimè dissectis Fumarix Myconii instar *Morif. Hist. 2. 258.*

Chelidonium majus flore & foliis minutissimè laciniatis *Cat. Hort. Reg. Paris. 49.*

Chicallotl Hernand. v. Papaver spinosum.

Chimalatl Hernand. v. Chrysanthemum.

CHONDRILLA juncea viscosa arvensis, quæ prima Diosc. C. B. P. 130. Chondrilla viminea *I. B. tom. 2 l. 24. 1021.*

Chon-

Chondrilla viscosa humilis C. B. P. 130.

ANN.

Chondrilla cœrulea latifolia laciniata C. B. P. 130.

Eadem flore incarnato.

Chondrilla cœrulea altera, Cichorii sylvestris foliis C. B. P. 130. *Chondrilla vel Chondrilla cœrulea* I. B. tom. 2. l. 24. 1019.

Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus C. B. P. v. *Calendula*.

Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpurascente flore C. B. P. v. *Centaureum capitatum*.

Chondrilla cœrulea, Cyani capitulo C. B. P. v. *Cichoreum*.

CHRISTOPHORIANA Americana racemosa, baccis niveis *Morif. Hist.* 2. 8. *Aconitum baccis niveis* *Corn.* 76.

Eadem baccis rubris *Morif. Hist.* 2. 8. *Aconitum baccis rubris* *Corn.* 76.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa *Morif. Hist.* 2. *Aconitum racemosum*: An *Actæa* *Plinio* C. B. P. 183? *Aconitum racemosum Actæa* quibusdam I. B. tom. 3. l. 35 660.

Christophoriana Canadensis racemosa & ramosa *Morif. Hist.* 2. 8. *Panaces* *Κάρπμιν*, sive *Christophoriana Canadensis* *Park. Theatr.*

950. Angelica baccifera Canadensis *Park. Theatr.* 950.

CHRYSANTHEMUM Indicum, flore & semine maximis, annuum. Chrysanthemum Peruvianum *Morif. Hort. Bles.* 399. Helenium Indicum maximum *C. B. P.* 276. Herba maxima *I. B. tom.* 3. l. 26. 106. Chimalatl Peruina, Flos solis *Hernand.* 228. ANN.

Idem ramosum, Helenium Indicum ramosum *C. B. P.* 277. ANN.

Idem semine cinereo. Helenium Indicum ramosum, semine albo, cinereo striato *Hort. Reg. Paris.* 84. ANN.

Idem flore minore melino. Helenium Indicum minus *C. B. P.* 277. Herbae maximae species minor, florum multitudine parvitatem compensans *I. B. tom.* 3. l. 26. 107. ANN.

Helenium Indicum, flore & semine maximis, perenne.

Chrysanthemum Americanum, laciniato folio, majus *Morif. Hort. Bles.* 251. Doronicum Americanum laciniato folio *C. B. P. app.* 516.

Chrysanthemum Americanum, laciniato folio obscurius virente, minus *Morif. Hort. Bles.* 251.

Chrysanthemum Indicum radice tuberosa. He-

Helianthemum Indicum tuberosum C. B. P.

277. *Helenium Indicum tuberosum Cat.*

Hort. Paris. 85. Flos solis Farnesianus, sive Aster Peruanus tuberosus Colum.

Ecphras. part. 2. 11. *Aldin. Hort. Farnes.*

191.

Chrysanthemum Canadense latifolium altissimum Moris. Hort. Bles. 251. *Chrisanthemum Canadense latifolium elatius Bocce. lc.*

& descr. 52. An *Helenium Canadense altissimum*, Vosacan dictum *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 85?

Idem humilium Moris. Hort. Bles. 251. *Chrysanthemum Canadense humilium Bocce. lc.*

& descr. 52.

Chrysanthemum Canadense bidens, alato caule *Moris. Hort. Bles.* 253. An *Helenium Canadense elatius*, alato caule *Cat.*

Hort. Paris. 85.

Chrysanthemum Canadense, Rapunculi radice, strumosum vulgò.

Multis firmatur radicibus albis, carnosis, fusiformibus, Rapunculo vel Asphodelo haud disparibus, quæ caules attollunt complures, novem decemvè pedum altitudine, rotundos, asperos nonnihil hirsutos, & striatos, in numerosos ramos subdivisos. Hos sine ordine cingunt folia palmam longa, pollicem & amplius lata, in acumen definentia, aspera, atroviridia, per ambicum

tum leviter crenata. Ramorum cacumina occupant flores lutei corymbosi, Chrysanthemo Canadensi humiliori simillimi, nisi quod petala dilutiùs flavescant, in mucronem bifidum terminentur, & foliola, flori substrata, longius producantur. His fatiscientibus succedunt semina angulosa, ritu affinium, Radices subamarum aromaticum non ingratum habentes saporem, à Canadensibus parantur in fercula, velut ab Europæis Rapunculi, Rapæ & similes.

Chrysanthemum Canadense minus, caule alato *Moris. Hort. Bles. 252.* Aster luteus alatus *Corn. 62.*

Chrysanthemum Asteris facie supinum, majus. Aster luteus supinus *C. B. P. 266.* Aster Atticus luteus supinus, spinosus *I. B. tom. 2. l. 24. 1045.*

Idem minus. Chrysanthemum Conyzoides Lusitanicum *Breyn. Cent. 1. 157.* Aster supinus Conyzoides Africanus *Park. Theatr. 131.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis circa florem mollibus. Aster Atticus, foliis circa florem mollibus *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis. Aster luteus, foliis ad florem rigidis *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis Succisæ. Aster luteus major, Succisæ foliis *C. B. P. 266*

Chry-

- Chrysanthemum foliis Matricariæ C. B. P. 134.
 Chrysanthemum majus, folio valdè lacinia-
 to, flore croceo I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Idem flore partim candido, partim luteo C.
 B. P. 134. Chrysanthemum Creticum I. B.
 tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Idem majus, folio profundius laciniato, flore
 magno C. B. P. 134. Chrysanthemum Cre-
 ticum I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.
 Chrysanthemum Alpinum incanum, foliis la-
 ciniatis C. B. P. 134.
 Chrysanthemum Tanacetii minoris foliis. Bu-
 pthalmum Tanacetii minoris foliis C. B. P.
 134. Chamæmelum Chrysanthemum quo-
 rundam I. B. tom. 3. l. 26. 122.
 Chrysanthemum Cotulæ folio. Bupthalmum
 Cotulæ folio C. B. P. 134. Bupthalmum te-
 nuifolium, folio Millefolii ferè I. B. tom. 3.
 l. 26. 124.
 Chrysanthemum Creticum, Cotulæ facie.
 Bupthalmum Creticum, Cotulæ facie
 Breyn. Cent. 1. 154. ANN.
 * Chrysanthemum segetum, facie Bellidis syl-
 vestræ, foliis glaucis, Papaveris hortensis in-
 star, profundè incisis majus. Bellis lutea, fo-
 liis profundè incisis major C. B. P. 262. ANN.
 * Idem minus. Bellis lutea, foliis profundè in-
 cisis minor C. B. P. 262. ANN.
 * Idem foliis glaucis minùs sectis. Bellis lutea
 foliis subrotundis C. B. P. 262. Chrysanthemum

K

mum

mum folio minùs secto glauco *I. B. tom. 3. l. 26. 113.*

* *Chrysanthemum aquaticum Cannabinum*, folio tripartito diviso. *Cannabina aquatica*, folio tripartito diviso *C. B. P. 321.* *Verbesina* sive *Canabina aquatica*, flore minùs pulchro, elatior ac magis frequens *I. B. tom. 2. app. 1073. ANN.*

* *Idem* folio non diviso. *Cannabina aquatica*, folio non diviso *C. B. P. 321.* *Verbesina* pulchriore flore luteo *I. B. tom. 2. app. 1074. ANN.*

Idem Cannabinum Americanum Moris. Hort. Bles. 254. *Eupatorium aquaticum Park. Theatr. descr. 596. ANN.*

Chrysanthemum aquaticum, foliis multifidis, *Cicutæ* nonnihil similibus, *Virginianum*.

Venustissimam hanc *Chrysanthemi* speciem concessit nobis Dn. *Watsius*, Vir in *Plantarum* cognitione peritissimus, & *Horti Botanici*, celeberrimi Collegii *Pharmaceutici Londinensis* impensis exstructi, *Præfectus* dignissimus. *Fibris* radicatur numerosis pallidis; *Caules* tollit tripedales aliquando altiores, ramosos, glabros, quadrangulos, geniculatos, subinde ex viridi rubentes; *Folia* ad singulos nodos promit bina ex adverso, multifida, *Cicutæ* non nihil similia, ast minora & robustiora; *Flores* insident ramorum fastigiis, discoidei vix radia-

diati, Chrysanthemo superiore duplo minores, parte extimâ multis viridantibus foliolis squamarum instar obvallati, medio verò orbe ex minutis aureis fistulosis tubulis, apiculos fuscis exerentibus, compacti. Semina succedunt oblonga, depressa, aspera, in duos apices desinentia, more antecedentium. An radix sit perennis, an annua, pro certo nobis non constat. Eo ipso enim, quo hæc scripsimus, apud nos florere incepit.

Chrysanthemum Aizoides Africanum ejusque species Breyn. v. Ficoides.

Chrysanthemum Capitis Bonæ Spei repens, flore aphylo Dn. Syens Breyn. Seu Chrysanthemum Africanum procumbens, flore cernuo, nudo, luteo Suther. v. Bellis.

CICER sativum C. B. P. 343. *Morif. Hist. 2. 75.* Cicer arietinum *J. B. tom. 2. l. 17. 292.* Floribus & seminibus candidis C. B. P. *Var. 347. ANN.*

Idem floribus & seminibus ex purpurâ rubescentibus C. B. P. *Var. 347. ANN.*

Idem floribus rubris & seminibus nigris, minoribus & angulosioribus *Morif. Hist. 2. 76. descr. ANN.*

Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. v. Astragalus.

Cicer arboreum Indicum perenne Zan. v. Anonis.

Cicer sylvestre latifolium triphyllon C. B. P. &
I. B. v. Anonis.

CICHORIUM fativum C. B. P. 125. I. B. tom.
2. l. 24. 1011. Cœruleum Lob. ANN.

Idem album. Tab. ANN.

* *Cichorium sylvestre* five *Officinatum* C. B. P.
124. *Cichorium sylvestre* I. B. tom. 1. l. 24.
1007. ANN.

* Idem floribus candidis C. B. P. *Var.* 125. ANN.

* Idem flore roseo C. B. P. *Var.* 126. ANN.

* Idem folio prorsus integro C. B. P. *Var.* 126. ANN.

Cichorium Cyani capitulo *Morif. Hort. Blesf.*
361. *Chondrilla cœrulea Cyani capitulo*
C. B. P. 131. *Catanance Dalechampii*, folio
Coronopi I. B. tom. 3. l. 25. 26. *Sesamoides*
parvum Matth. vulgò. ANN.

Cichorio affinis, *Lampfana domestica* *Morif.*
Hort. Blesf. 359. *Soncho affinis*, *Lampfana*
domestica C. B. P. 124. *Lampfana Dodo-*
næi I. B. tom. 2. l. 24. 1028. ANN.

Cichorium verrucarium C. B. P. seu *verrucosum*
I. B. v. *Calendula*.

Cichorium semine adunco C. B. P. seu *florem in-*
clinans I. B. v. *Calendula*.

Cichorium falcatum *Morif.* *Calendula*.

Cichoreum pratense luteum lævius C. B. P. v.
Hieracium.

Cichoreum pratense luteum hirsutum asperum
C. B. P. v. *Hieracium*.

Ciciliana I. B. v. *Hypericum*.

CICUTA latifolia foetidissima *Morif. Umbell.* 18. *Cicutaria latifolia foetida* C. B. P. 161. *Seseli Peloponense Matthioli*, sive *Cicutaria quorundam* I. B. tom. 3. l. 27. 184.

* *Cicuta major* C. B. P. 160. *Morif. Umbell.* 18. *Cicuta* I. B. tom. 2. l. 26. 175. ANN.

* *Cicuta minor* *Petroselino similis* C. B. P. 160. *Morif. Umbell.* 18. *Cicutaria Apii folio* I. B. tom. 3. l. 27. 179. ANN.

* *Cicutaria palustris tenuifolia* C. B. P. 161. *Morif. Umb.* 18. *Phellandrium*, sive *Cicutaria aquatica quorundam* I. B. tom. 3. l. 27. 183. ANN.

Cicutaria odorata C. B. P. v. *Myrrhis*.

Cicutaria odorata bulbosa C. B. P. v. *Myrrhis*.

CINARA hortensis, foliis non aculeatis, Anglica maxima. *Cinara maxima Anglica* Lob. C. B. P. 383. *Carduus sive Scolymus maximus non spinosus* I. B. tom. 3. l. 25. 51.

Cinara hortensis, foliis non aculeatis C. B. P. 383. *Carduus sive Scolymus sativus non spinosus* I. B. tom. 3. l. 25. 48.

Eadem capite subrotundo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 51.

Cinara hortensis aculeata C. B. P. 383. *Carduus sive Scolymus sativus spinosus* I. B. tom. 3. l. 25. 44.

Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur *C. B. P.* 383.

CIRCAEA major. Solani folia Circaea dicta major *C. B. P.* 168. Ocimastrum verrucarium *I. B. tom. 2. l. 23. 977.*

Eadem Alpina minor. Solanifolia Circaea Alpina *C. B. P.* 168.

CIRSIVM maximum, Asphodeli radice *C. B. P.* 377. Cirsium maximum, foliis carnosiss, bulbosâ radice, fortè Lutetianum *I. B. tom. 3. l. 25. 44.*

*Cirsium majus, singulari capitulo magno, vel incanum variè dissectum *C. B. P.* 377. Cirsium Anglicum, radice Hellebori nigri modo fibrosâ, folio longo *I. B. tom. 3. l. 25. 45.* Idem folio viridi.

Superioris folia alterâ parte virent, alterâ incanâ lanugine pubescunt; Hujus verò omnino virent. Accepimus ex Angliâ, ubi sponte nascitur.

Cirsium singularibus capitulis parvis *C. B. P.* 377. Cirsium foliis non laciniatis, virore Brassicæ, & macrocaulon *I. B. tom. 3. l. 25. 45.*

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis *C. B. P.* 377. Carduus Cirsium Monspeliacum, folio longo glabro Matthioli *I. B. tom. 3. l. 25. 44.*

Cirsium angustifolium, in Prodr. *C. B. P.* 377.

CI-

CISTUS Ladanifera Hispanica C. B. P. 467. Cistus Ledon, flore maculâ nigricante notato *I. B. tom. 2. l. 13. 8.*

Eadem flore emaculati candoris.

Cistus Ledon, foliis Laurinis C. B. P. 467.

Cistus Ledon, foliis Populi nigræ major C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Populi nigræ major *I. B. tom. 3. l. 13. 9.*

Cistus Ledon hirsutum C. B. P. 367. Cistus Ledon IV. Clusii, flore candido *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ladanifera, Monspeliensium C. B. P. 467. Cistus Ladanifera, sive Ledon Monspeliacum, angusto folio nigricans *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini subtus incanis C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Rorismarini coronariæ Clusii, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 11.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini ferrugineis C. B. P. 467. Rosmarinus sylvestris quorundam *I. B. tom. 2. l. 13. 23.*

Cistus Ledon, foliis Salicis angustifoliæ C. B. P. 468. Rosmarinus sylvestris αορμος Clusio *I. B. tom. 2. l. 13. 24.*

Cistus Ledum Alpinum hirsutum C. B. P. 468. Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum, *I. B. tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum hirsutum vulgò.

Cistus Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine

nigricantibus *C. B. P.* 468. Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum glabrum *L. B. tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum glabrum vulgò.

Cistus Indicus, Ledi Alpini foliis & floribus amplis. Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus Liliaceis *Breyn. Prodr. 23.*

Inter utriusquè Indiæ miracula, quæ in florido Theatro Illustrissimi Beverningii videntur, eminet speciosissimus hic Cistus ex Jaccatrâ advectus, cujus florum eximia pulchritudo quemlibet intuentem in summam rapit admirationem. Fruticat duorum cubitorum altitudine, trunco pollicem crasso; Cortice scabro, inæquali, ex fusco cinereo; Ligno duro, solido, pallescente; Ramis brevibus, contortis, inordinatis, circa fastigia foliis, Balsamo Alpino non disparibus, sed rigidioribus & villosis, densissimâ serie perpetuoquè virore referatis. Intra hæc prodeunt flores quodammodo Liliacei, monopetali, quinque partiti, structurâ Balsami Alpini, amplitudine Narcissi Gareti, colore fulgentis dilutioris cocci; Iunio verò & Augusto tantâ ubertate luxuriant, ut superiorem fruticis partem quasi elegantissimâ coccineâ veste videantur cooperire. His nisi odor deesset, diceres naturam nihil amabilius, nihilquè ad-

CISTUS INDICUS, LEDI ALPINI FOLIIS ET
FLORIBUS AMPLIS.



admirabilius unquam produxisse; Attamen odoris desiderium rependere videntur florum congeries numerosa, amœnissima Liliacea structura, & vivacitas exquisitissimi coloris. Cæterum ex singulis floribus sese exerunt quaterna apiculata stamina incurvata pallidè coccinea, unico intermedio longiori, insidente futuri fructus rudimento; His unà cum flore defluxis, perficiuntur in parvis oblongis villosis quinquifidis utriculis, conceptacula villosa, veluti in Cisto Ledo vulgò Balsamo seu Nerio Alpino, quinque intus carinulas habentia, in quibus semina exigua flavescentia. Quò contumaciùs est Balsamum Alpinum locis mitioribus, in quibus vivere refragatur; tantò sequacior est hic Cistus, qui hortensem culturam in laudatissimo Beverningiano Theatro jam ad duodecimum annum innoxie sustinuit. Facultate ad congeneres Cistos accedere, putamus ex adstringente gustu, quem cum illis habet communem.

Cistus Mas, folio rotundo hirsutissimo C. B.

P. 464. Cistus mas major folio rotundiore
1. B. tom. 2. l. 13. 2.

Cistus Mas, folio oblongo incano C. B. P. 464.

Cistus Mas iv. Monspeliacus folio oblongo
albido 1. B. tom. 2. l. 13. 3.

Cistus Mas, angustifolius C. B. P. 464. Cistus
Mas

Mas II. folio longiore *I. B. tom. 2. l. 13. 2.*

Cistus Mas, folio brevior *C. B. P. 464.* Ci-

stus Mas III. foliis dilutius virentibus *I. B.*

tom. 2. l. 13. 3.

Cistus Mas, foliis Chamædrys *C. B. P. 464.*

Cistus Mas v. Foliis crispis, & quodam-
modo sinuosis *I. B. tom. 2. l. 13. 3.*

Cistus Fœmina, folio Salviæ *C. B. P. 464.* Ci-

stus Fœmina Monspeliana, flore albo *I. B.*

tom. 2. l. 13. 4.

Eadem flore luteo, ochræ colore *C. B. P. Var.*

465. Cistus Fœmina Hispanica, flore luteo

I. B. tom. 2. l. 13. 4.

Cistus humilis, seu Chamæcistus vulgaris,
flore luteo *C. B. P. 465.* Helianthemum vul-
gare, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 15.*

Cistus humilis, seu Chamæcistus vulgaris, flo-
re albo majore *C. B. P. 466.* Helianthemum
foliis majoribus, flore albo. *I. B. tom. 2. l.*
13. 16.

Cistus humilis, seu Chamæcistus foliis mi-
noribus & incanis *C. B. P. 466.* Cistus hu-
milis Clusio, sive Helianthemum omnino
candicans, flore nunc albo, nunc pallido
I. B. tom. 2. l. 13. 16.

Cistus humilis seu Chamæcistus Friscus, fo-
liis Nardi Celticæ *C. B. P. 466.*

Cistus humilis seu Chamæcistus, foliis Thy-
mi incanis *C. B. P. 466.* Helianthemum
flore

flore albo, folio angusto hirsuto *I. B. tom. 2. l. 13. 17.*

Cistus humilis seu **Chamæcistus** **Ericæ** folio luteus *C. B. P. 466.* **Helianthemum** tenuifolium glabrum, luteo flore, *I. B. tom. 3. l. 13. 18.* Caule elatiori, & longioribus foliis *C. B. P. Var. 466.*

Idem caule humiliore *C. B. P. 466.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio **Plantaginis** *C. B. P. 464.* **Tuberaria** major **Myconi** *I. B. tom. 2. l. 13. 12.*

Cistus humilis seu **Cistus** **Fœmina**, **Portulacæ** folio latiore obtuso *C. B. P. 465.* **Cistus** folio, **Halimi** flore luteo. *I. B. tom. 2. l. 13. 5.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio **Sampsuchi** incano *C. B. P. 465.* **Cistus** folio **Sampsuchi** **Clusii**, cui macula in flore *I. B. tom. 2. l. 13. 6.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio **Majoranæ** *C. B. P. 465.*

Cistus humilis seu **Cistus** folio **Salicis** *C. B. P. 465.* **Cistus** annuus **I. Clusio**, folio rotundiore *I. B. tom. 2. l. 13. 13. ANN.*

Cistus humilis seu **Cistus** **Ledi** folio *C. B. P. 465.* **Cistus** annuus, folio **Ledi**, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 14. ANN.*

Cistus humilis **Aizoides**, **maritimus** **Africanus**, flore rubello.

Botanosophi recentiores, insistentes principiis, à fructificatione, seu fine Plantarum

**CISTUS HUMILIS AIZOIDES, MARITIMUS AFRI-
CANUS FLORE RUBELLO.**



tarum ultimo petitis, discescunt Cistum in tria genera: Primum includit semina conceptaculo octagono, octo intus carinulis diviso, & ex maturitate in totidem partes dissiliente: Alterum perficit semina in vasculo pentagono, quinque loculamentis distincto: Tertium producit capsulam parvam trigonam, quæ mediante tripartitâ tenui membranulâ, instar parietis intergerini, in ternas cellulas dividitur, & justam maturitatem adepta, in totidem corticofas veluti cotylas dehiscit. Cisti primi & secundi generis, vocantur majores; Tertii generis, minores, humiliores seu Chamæcisti. Huic ultimo inferendum censemus Cistum hunc Africanum, quem ob caules & folia succulenta, Sedis haud absimilia, Aizoidem vocavimus. Nititur radice parvâ ex ruffo albescente; Caule concolori, dodrontali, rotundo, nunc bifido, nunc quadrifido; Foliis teretibus, glabris, Sedo minori luteo acutifolio, Trinquemadame dicto, æmulis, sed crassioribus, & quadruplo longioribus; Inter hæc erigitur pediculus gracilis, tenuis, nudus, subrubens, semipalmaris, circa fastigium in aliquot tenuissimos ramulos divaricatus, sustinentes florem pentapetalum parvulum, rubellum, fugacem, qui ad solem meridianum expanditur; hoc verò recedente, clauditur,

tur, vel omnino marcescit, relinquens conceptaculum rotundum, trigonum, in ter-
na foliola carinata diffiliens, fundensquè
semina exigua, compressa, nigra. Frequens
occurrit maritimis locis ad Promontorium
Bonæ Spei inter species Ficus aizoidis, &
proinde eandem exposcit culturam; Solum
amant arenosum siccum, aëris rigidioris in-
jurias agrè ferens, progerminans non mi-
nùs seminibus, quàm ramulis resectis, & in
terram depactis, virens toto anno. Sapor
percipitur aqueus, odor nullus.

*Citreum malum ejusquè species I. B. v. Malus
citrea.*

Citrullus C. B. & I. B. v. Anguria.

Citrus vulgò ejusquè species. v. Malus Citrea.

CLEMATIS Hederacea Indica Iasmini foliis.
Gelseminum Ederaceum Indicum *Corn.*
103. Gelseminum Indicum flore phœni-
ceo. *Fer. Flor. Cult.* 199.

Clematis Americana filiquosa tetraphyllos
Dodart. Memor. 71. *Breyn. Prodr.* 30.

Clematis Daphnoides major *C. B. P.* 302. Cle-
matis Daphnoides major, flore cœruleo
I. B. tom. 2. l. 15. 132.

Eadem flore albo *I. B. tom. 2. l. 15. 132.*

Eadem folio & flore variegatis.

Clematis Daphnoides minor *C. B. P.* 301. Cle-
matis Daphnoides minor flore cœruleo *I. B.*
tom. 2. l. 15. 130. Ea-

Eadem flore candido *C. B. P. Var. 301. I. B. tom. 2. l. 15. 130.*

Eadem flore rubente vel subpurpurascente
C. B. P. Var. 301. I. B. tom. 2. l. 15. 130.

Eadem flore duplici, seu flore alium florem
medium continente *C. B. P. Var. 1301.*

Eadem folio & flore variegatis. Clematis Daphnoides minor foliis maculosis, *Sutherl. Cat. Edinburg. 88.*

Clematis flore pleno *C. B. P. 302. Clematis Daphnoides flore pleno I. B. tom. 2. l. 17. 130.*

Clematis pentaphylla, flore roseo clavato Moris. v. Cucumis.

Eadem latifolia. v. Cucumis.

Clematis passionalis triphyllus flore luteo Moris. v. Cucumis.

Clematis trifolia, flore roseo clavato C. B. P. v. Cucumis.

Eadem flore clavato ex nigro punicante Hort. Reg. Paris. v. Cucumis.

CLEMATITIS sylvestris latifolia *C. B. P. 300. Clematis latifolia, sive Atragene quibusdam I. B. tom. 2. l. 15. 125.*

Eadem dentata I. B. tom. 2. l. 15. 125.

Clematitis sive Flammula repens C. B. P. 300.

Clematis sive Flammula scandens tenuifolia alba I. B. tom. 2. l. 15. 127.

Clematitis seu Flammula recta C. B. P. 300. Cle-

Clematis five Flammula surrecta alba *I. B. tom. 2. l. 15. 127.*

Clematitis cœrulea repens *C. B. P. 390.* Clematis five Flammula, flore cœruleo scandens *I. B. tom. 2. l. 15. 128.*

Eadem purpurea *C. B. P. 300. I. B. tom. 2. l. 15. 128.*

Clematitis cœrulea, flore pleno *C. B. P. 301.* Clematis purpurea, flore pleno scandens *I. B. tom. 2. l. 15. 129.*

Clematitis cœrulea erecta *C. B. P. 300.* Clematis Pannonica, flore cœruleo surrecta *I. B. tom. 2. l. 15. 129.*

CLINOPodium Canadense fistulosum. *Morif. Hert. Blef. 382.* Origanum fistulosum Canadense *Cornut. 14.*

Clinopodium Virginianum angustifolium, flore luteo.

Caulibus exit humilioribus & gratilioribus. Foliis angustioribus, pallidioribus, contactu mollioribus, & odoratioribus. Floribus in caulis fastigio paucioribus, tenuioribus, flavescentibus. Cæteris partibus Canadensi simillimis. Possidemus ex munere Reverendi Dni de Marees sacrorum dogmatum Præconis fidelissimi & florum rariorum cultoris præstantissimi.

Clinopodium Origano simile *C. B. P. 224.* Clinopodium Origani facie *I. B. tom. 3. l. 28. 250.*

Clinopodium Mari Syriaci foliis, odore Mastiches. Clinopodium quorundam, Mastichina Gallorum *I. B. l. 28. tom. 243.* Marum Mastichen redolens, sive Sampfuchus *C. B. P. 224.*

CLINOPODIUM arvense, Ocymi facie *C. B. P. 225.* Acinos multis *I. B. tom. 3. l. 28. 259.* Foliis hirsutissimis *C. B. P. Var. 225.* Idem foliis angustioribus pene levibus *C. B. P. Var. 225.*

Clinopodium Creticum *Prosp. Alpin. Exot. 265. ANN.*

CLITORIUS Flos cœruleus *Breyn. Cent. 1. 76.*

Idem albus.

Cneoron Matth. v. Thymelea.

Cneorum album, folio Oleæ argenteo molli C. B. P. v. Convolvulus.

CNICUS fativus, sive Carthamum Officinarum *C. B. P. 378.* Carthamus sive Cnicus *I. B. tom. 3. l. 25. 79. ANN.*

Cnicus cœruleus asperior *C. B. P. 378.* Carthamus, sive Cnicus, flore cœruleo *I. B. tom. 3. l. 25. 80.*

Cnicus perennis cœruleus Tingitanus.

Planta hæc, naturâ totoquè habitu Cnicum referens, agit radicem albam, longam,
te-

CNICUS PERENNIS COERULEUS, TINGITANUS.



tenuem, absquè fibris, modò obliquè modò rectâ in terram depactam, emittentem folia rigida crassiuscula, spithamo longiora, pollice angustiora, circa margines crenata, & simul exiguis aliquot spinulis, obtutum ferè fugientibus, armata; Intra hæc prodit caulis ut plurimum simplex, aliquando statim à radice in binos ternosvè ramos subdivisus, sustinens ex capitulo oblongo squamato, & aliquot rigidis brevibus foliolis circumvallato, flores cœruleos, fistulosos, oris laciniatis, quos excipiunt semina fusca, barbata, more congenerum. Hanc, circa Tingidem collectam, ad nos misit Dn. Robertus Morison, dum viveret, Botanices Professor in Academiâ Oxoniensi longè celeberrimus.

Cnicus, *Attractylis lutea* dicta. *Attractylis lutea* C. B. P. 379. *Attractylis vera* flore luteo I. B. tom. 3. l. 25. 83. ANN.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive *Carduus Benedictus* C. B. P. 378. *Carduus Benedictus* I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Cnicus cœruleus humilis montis Lupi. *Eryngium montanum minimum*, capitulo magno C. B. P. 386. *Carduncellus montis Lupi* I. B. tom. 3. l. 25. 92.

Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. v. *Carlina*.

Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, perennis *Cat. Hort. Reg. Paris.* v. *Carlina*.

* **C**OCHLEARIA major Batavica erecta, folio oblongo. ANN.

A vulgari majori Cochleariâ differt tantum cauliculis rectâ assurgentibus, dodontalibus, aliquando cubitalibus, & foliis oblongis. Reperi in udosis circa Catwick.

* Cochlearia major Batavica, subrotundo folio *Morif. Hist.* 2. 308. Cochlearia folio subrotundo C. B. P. 110. Cochlearia I. B. tom. 2. l. 22. 942. ANN.

Cochlearia Britannica, folio sinuato *Morif. Hist.* 2. 308. Cochlearia folio sinuato C. B. P. 110. ANN.

* Cochlearia Danica procumbens *Morif. Hist.* 2. 309. Cochlearia Danica repens quæ 2. in Prodromo C. B. P. 110. *Sim. Paul. Quadr. Bot.* 269. An Cochlearia minima I. B. tom. 2. l. 22. 942? ANN.

Coggvria I. B. v. *Cotinus*.

COLCHICUM commune C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 340. Colchicum I. B. tom. 2. l. 19. 648.

Idem albo flore C. B. P. *Var.* 67.

Idem florum foliis rubris & albis alternatim dispositis C. B. P. 68.

Idem folio lineis albis picto. *Morif. Hort. Elef.* 55. *Hort. Reg. Paris.* 54.

Colchicum vere & autumnno florens C. B. P. 68. *Morif. Hist.* 2. 340. Colchicum biflorum I. B. tom. 2. l. 19. 652.

Colchicum floribus Fritillariæ instar tessellatis, foliis planis *Morif. Hist. 2. 340.* Colchicum flore Fritillariæ instar tessellatis *C. B. P. 68.* Colchicum Neapolitanum, seu Colchico vulgari similis bulbus *I. B. tom. 2. l. 19. 655.*

Colchicum Chioense, floribus Frillariæ instar tessellatis, foliis undulatis *Morif. Hist. 2. 341.* Colchicum variegatum *Corn. 137.*

Colchicum latifolium variegatum *C. B. P. 68.*

Colchicum ex albo & purpurascente varium *C. B. P. 68.* Colchicum *πικιλάνθις* alterum *I. B. tom. 2. l. 19. 656.*

Colchicum candidum multiflorum *C. B. P. 68.* *Morif. Hist. 2. 341.* Colchicum polyanthes album *I. B. tom. 2. l. 19. 653.*

Colchicum polyanthes, lato albo Ellebori folio *C. B. P. 68.* *Morif. Hist. 2. 341.* Colchicum latifolium Bizantinum, polyanthes *I. B. tom. 2. 19. 655.*

Colchicum montanum angustifolium *C. B. P. 68.* *Morif. Hist. 2. 341.* Colchicum montanum, flore purpureo *I. B. tom. 2. l. 19. 656.*

Colchicum vernum Hispanicum *C. B. P. 69.* Colchicum vernum Clusii *I. B. tom. 2. l. 19. 652.*

Colchicum pleno flore *C. B. P. 69.* *I. B. tom. 2. l. 19. 654.* Flore purpurascente.

Col-

Colchicum pleno flore, variegatum, C. B. P. 68.

Morif. Hist. 2. 342. Colchicum polyanthes candidum, eleganti rubore varium *I. B. tom.*

2. l. 19. 653.

Colchicum polyanthos multiplex C. B. P. 68.

Morif. Hist. 2. 342. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore tessellato.

Colchico-Narcissus autumnalis luteus major

Morif. Hist. 2. 342. Colchicum luteum majus C. B. P. 69. Colchicum flore luteo quorundam *I. B. tom.* 2. l. 19. 661. Narcisso-

Colchicum vulgò.

Colocassia *I. B. & C. B. v. Arum.*

COLOCYNTHIS fructu rotundo, major C. B. P. 313. *Morif. Hort.* 2. 27.

Eadem fructu rotundo, minor C. B. P. 313.

Colocynthis *I. B. tom.* 2. l. 232.

Eadem oblonga C. B. P. 313. Cucurbita aspero folio, amara grandis rotunda viridis *I. B. tom.* 2. l. 16. 229.

Eadem pyriformis, seu Pepo amarus C. B. P. 313.

Eadem pyriformis, cortice maculato C. B. P. 313. Cucurbita sive Colocynthis amara, pyriformis variegata *I. B. tom.* 2. l. 16. 230.

COLUTEA vesicaria C. B. P. 396. *I. B. tom. 1. l. 11. 380.*

Eadem vesiculis rubentibus *I. B. tom. 1. l. 11. 380.*

Colutea Æthiopica, flore phœniceo, Barbæ jovis foliis *Breyn. Prodr. 30. Cent. 70.*

COLUTEA Scorpioides elatior & major, frutescens *Morif. Hist. 122.* Colutea siliquosa, seu Scorpioides major C. B. P. 397. Colutea Scorpioides *I. B. tom. 1. l. 11. 381.*

Colutea Scorpioides humilior & minor *Morif. Hist. 2. 122.* Colutea siliquosa minor C. B. P. 397. Colutea Scorpioides humilis *I. B. tom. 1. l. 11. 382.*

Colutea sive Polygala Valentina prima Clusii *Morif. Hist. 2. 12.* Polygala major Massiliotica C. B. P. Coluteæ parva species, Polygala Valentina Clusii *I. B. tom. 1. l. 11. 383.*

Colutea sive Polygala altera fruticosior, foliis latioribus. Polygala altera C. B. P. 349. Colutea Scorpioides quædam, sive Polygalo Cortusi similis planta, sed major *I. B. tom. 1. l. 11. 382.*

Colutea siliquosa minor coronata C. B. P. 397. *Morif. Hist. 2. 122.*

Colutea Scorpioides Cretica odorata *Prosop. Alpin. Exot. 17. Morif. Hist. 123.*

Colutea Indica herbacea, ex quâ Indigo. Nil Anil sive Indigo Indica *Morif. Hist. 2. 202.*
An Isatis Indica, foliis Rorismarini, Glatto affi-

affinis C. B. P. 113? Anil sive Nil, Indorum color I. B. tom. 2. l. 22. 945. Caachira Pi-son. l. 4. 198.

Colutea herbacea dumetorum major, siliquis articulatis, flore vario. Coronilla, seu Polygala dumetorum major, siliquis articulatis, flore vario *Morif. Hist.* 2. 119. Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis C. B. P. 349.

Colutea herbacea enneaphyllos *Morif. Hist.* 2. 120. Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summitate C. B. P. 349. Polygalon Cortusi I. B. tom. 2. l. 17. 751.

Colutea Zeylanica argentea tota. Mundu-Murungu Zeylanensibus.

Colutea est bifaria: Vesicaria & Siliquosa. Vesicariæ innotuerunt tres species: Vulgaris, Africana, & Syriaca. Siliquosa dividitur in duas classes; Prima continet species numero plurimas tam frutescentes quam herbaceas, ferentes semina cylindracea oblonga in siliquis bivalvibus articulatis; Alterius quatuor in Oriente offendi differentias frutescentes, quare semina sunt globosa, & siliquæ bivalves ventriosæ, quasi isthmo interceptæ. Ex his Horti alumna facta est, maritima argentea, ab incano & tomentoso habitu ita nominata. Fruticat altitudine humanâ; Radice pallescente, brachiatâ, lignosâ; Cau-

Caule simplici, aliquando multiplici; Ramis non incomptis, incano molli tomento obsitis; Foliis perpetuis, subrotundis, crassis, albescentibus, lanuginosis, ut plurimum septendecim costam mediam binatim cingentibus, unico in summo impari; Floribus papilionaceis, luteis, Genistæ Hispanicæ amplitudine, in spicâ palmari, assatim coacervatis; pendentibus singulis ex caliculis parvis, incanis, marginibus crenatis. Siliquis coriaceis, bivalvibus, teretibus, digitum longis, ventriosis, aliquot quasi isthmis inscriptis, deorsum spectantibus, intus & extus incani albescentis coloris, & in molleculum mucronem productis, claudentibus parte, quæ protuberat, semen globosum, durum, fuscum, magnitudine Ciceris. Abundat in vepretis maritimis Insulæ Zeylan, dicta ab indigenis Mundu Murunga, id est Murungu maritima. Videtur enim habere quandam affinitatem cum Moringa Christ. à Costa, *l. Arom. c. 35.* quam Zeylanenses Wattu Murungu, hoc est Murungu hortense vocant. Cæterum gustanti deprehenditur acris, amara, ingrata & nauseosa, virtute purgandi prædita; sed ob ignaviam & malignitatem è foro medico pro scripta. Propagatur facilè per novos stolones è radice assurgentes, per submersionem aut

cir-

COLUTEA ZEYLANICA ARGENTEA TOTA.

circumpositionem , ut & per semina vere
terræ commissa. Frigori subducta totâ hye-
me viget & viret.

Conna Hort. Mal. v. Cassia fistula.

Consiligo tenuifolia I. B. v. Adonis.

Consolida major C. B. P. v. Symphytum.

* **C**ONSOLIDA media pratensis cœrulea C. B.
P. 260. Consolida media quibusdam Bu-
gula I. B. tom. 3. l. 30. 340.

* Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 260.

* Eadem purpurea C. B. P. 260.

Consolida media Genevensis I. B. tom. 3. l. 30.
432. Consolida media pratensis hirsuta
Hort. Reg. Par. 55.

CONSOLIDA regalis hortensis, flore majore
& simplici C. B. P. 142. Delphinium sive
Consolida regalis erectior, purpureo sive
violaceo flore majore I. B. tom. 3. l. 26. 211.
Calcatrippa vulgò. ANN.

Eadem flore simplici rubro C. B. P. *Var.* 142
ANN.

Eadem seu Delphinium elatius, purpuro-vio-
laceum C. B. P. *Var.* 142.

Eadem seu Delphinium elatius flore incarna-
to C. B. T. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore cineratio C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem seu Delphinium elatius, flore albo C. B.
P. *Var.* 142. ANN.

Con-

Consolida regalis hortensis, flore minore C. B.
P. 142. Flore cœruleo. ANN.

Eadem flore cinereo C. B. *P. Var.* 142. ANN.

Eadem flore albo C. B. *P. Var.* 142. ANN.

Eadem flore incarnato C. B. *P. Var.* ANN.

Consolida regalis flore majore & multiplici
 C. B. *P.* 142. Consolida regalis erectior, flo-
 re purpureo sive violaceo pleno *I. B. tom.* 3.
l. 26. 211. ANN.

Eadem flore pleno incarnato C. B. *P. Var.* 142.
 ANN.

Eadem multiplici flore argenteo C. B. *P. Var.*
 142. ANN.

Eadem flore multiplici cinereo C. B. *P. Var.*
 142. ANN.

Eadem flore pleno rubro C. B. *P.* 142. ANN.

Eadem flore pleno variegato, præcox. *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore pleno variegato, serotina.
Cat. Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore punctato. ANN.

Eadem flore fusco obsoleto. ANN.

* Consolida regalis arvensis C. B. *P.* 142. Con-
 solida regalis, flore minore *I. B. tom.* 3. *l.* 26.
 210. ANN.

CONVOLVULUS major rectus Creticus ar-
 genteus *Morif. Hist.* 2. 11. Cneorum al-
 bum folio Oleæ argenteo molli C. B. *P.* 463.
 Dorycnium Imperati *I. B. tom.* 1. *l.* 5. 598.
 Con-

Convolvulus maritimus Zeylanicus, folio crasso cordiformi. *Bintamburu Zeylanensis* *Pes capræ Lusitanis*.

Vegetabilia, quæ simili inter se gaudent fructificatione, & proinde generis societate conjunguntur, ut plurimum inter se convenire principiis activis atque virtute, differente duntaxat secundum magis & minus, prout sapor vel odor est intensior, vel remissior, pervulgatum est Botanicorum axioma, quod experientiæ non omnino repugnat. Inter alia innumera testes sunt *Scammoneum*, *Jalappa*, *Mechoacanna*, *Soldanella*, cæteraquæ hujus familiæ, quæ singula florem gerunt monopetalum, campaniformem & post horum exantheseos semina quaterna in capsulis subrotundis modo planis, modo in parvum abeuntibus, mucronem. Quotquot verò hac notâ innotuerunt, fundunt lac pungitivum & nauseosum, nunc dilutius nunc spissius, modò parcius modò copiosius, acredine vel intensiore vel remissione, ac proinde donantur sale purgante aut potentiore aut debiliore. Consimili purgativo sale constare *Convolvulum maritimum Zeylanicum*, colligo non tantum ex lacte acri linguam & fauces pungente; sed & experimentis multijugâ experientiâ comprobatis. Resina enim radicis drachmæ pondere cum vitello

CONVOLVULUS MARITIMUS ZEYLANICUS
FOLIO CRASSO CORDIFORMI.



lo ovi, lacte Coccineo, aliavè conveniente emulsione data, hydropicorum alvum blandè subduxit. Idem officium præstitit radicis extractum cum spiritu Vini paratum. Quanquàm verò Convolvuli hujus radix à Lusitanis & nunc quoquè à multis Indis censeatur diaphoretica ejusquè decoctum hoc nomine in lue Gallicâ aliisque morbis chronicis in frequenti sit usu; attamen persuasus ratione & experientiâ existimo, hanc virtutem esse meram imaginariam, adscriptam radici, fortè ex non dispari facie, quam habet cum Salsaparillâ. Luxuriat locis maritimis Malabaræ, Zeylan, aliarumquè regionum & Insularum Orientalium, cujus radix, Salsaparillæ non absimilis, in obliquum longè latequè prorepat, fusco crassoquè cortice tecta, & lacte tenui, in resinam concrecente, referta, Ex quâ sparguntur sarmenta herbacea, glabra, infirma, humi strata, trium quatuorvè ulnarum longitudine; His alternatim adhærent folia subrotunda, carnosâ, lucida, glabra, expansa, aut complicata, quasiquè bifida, imitantia figuram cordis, seu ut Zeylanensibus placet, figuram pedis caprini, unde accessit plantæ nomen Bintamburu seu Pedis Capræ. Flores prodeunt ex parvis quinquèfoliaceis caliculis, monopetali, ampli, pentanguli, campaniformes,

roseo vivaci colore, umbone medio atropurpurascente. Semina sequuntur quaterna, angulosa, hirsuta, locata in vasculis subrotundis, in parvum desinentibus mucronem. Licet in censum purgantium reponatur radix, tamen ejus folia cedunt in pabulum cuniculis, cervis, damis, capris tam domesticis, quam sylvestribus. Hujus semina cum multis aliis curiosissimis transmisit ad nos Dns Thomas à Rhee mercium Insulæ Zeylan p. t. Administrator primarius, quæ, anno superiori telluri commissa, germinarunt & in plantam adoleverunt.

Convolvulus maritimus rotundifolius Morisf. Hist. 2. 11. Soldanella maritima minor C. B. P. 2. 295. Brassica marina sive Soldanella I. B. tom. 2. l. 15. 166.

Convolvulus Indicus Orientalis Inhame seu Battatas, Sisarum Peruvianorum, seu Battata Hispanorum Morisf. Hist. 2. 11. Battatas C. B. P. 91. I. B. tom. 2. l. 19. 792.

Convolvulus Indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus angulosis. Turbith Officinis. Turpethum repens, foliis Althææ, vel Indicum C. B. P. 149. Tirastawalu Zeylanensibus.

Quàm negligenter & perfunctoriè descripserit Turbith Garzias ab Horto l. 1. *Arom. c. 36.* cujus tamen plantam viren-

M

tem

178 HORTUS ACADEMICUS
CONVOLVULUS IND. ALAT9 MAXIMUS FOL. IBISCO
NONNIHIL SIMIL. TURBITH OFF.



LUGDUNO-BATAVUS.

179

CONVOLVULUS IND. ALAT9 MAX. FOL. IBISCO
NONNIHIL SIMIL. TURBITH OFF.



tem & floribus exornatam se vidisse fate-
tur, manifestum fiet ex brevi meâ descri-
ptione & delineatione, quam, propriâ ob-
servatione collectam, hic subungere ope-
ræ pretium duxi. Vario longoquē reptatu
ad tria quatuorvè cubita descendit radix,
pollicem & amplius crassa, lignosa, in ali-
quot ramos divisa, crasso fuscoquē cortice
tecta, qui ruptus, stillat succum lacteum
glutinosum in pallidè flavescensem resi-
nam illico concrecentem, gustus primò
subdulcis, postmodum pungitivi, vomitum
minantis. Ex hâc prodeunt sarmenta ra-
mosa, quatuor alis donata, varios in gyros
 sese contorquentia, prope radicem lignosa,
 digiti crassitie, rufescentia, in progressu
 verò viridia, sex septemvè ulnarum lon-
 gitudinem aliquando superantia, quorum
 nonnulla humi procumbunt, alia vicinas
 arbores fruticesquē scandunt, iisque multi-
 plici plexu se involvunt. His adstant ex
 carinatis alatisquē pedunculis folia Altheæ
 non nihil paria, mollia, incanâ rarâquē la-
 nugine obsita, angulosa, in ambitu crena-
 ta, leviter mucronata, ad quorum sinus
 circa ramorum summitates exeunt petioli
 superioribus longiores, robustiores, alis &
 carinâ omnino destituti, sustinentes terna
 aut quaterna capitula oblonga, mucronata,
 quinquē viridantibus in rubro foliolis con-
 flata,

flata, quæ singula excludunt florem monopetalum Convolvuli vulgaris magnitudine & formâ, candidum, intus quinque pallescentibus apiculatis staminulis, cum sexto intermedio subjectæ feminali capsulæ impacto, refertum. Flore excusso capitula expanduntur, in quorum centro conspiciuntur quaterna rotundo-angulosa nigricantia semina, Piperis magnitudine, inclusa vasculo tenui, membranaceo, subrotundo, depresso, plano intus quadripartito. Consimilia semina, florum seminumquæ involucri memini quoque me observasse in Mechoacannâ, cujus expansum involucrium una cum capsulâ feminali falso pro flore proposuit Monardes, & ex eo Dalechampius, Johannes Bauhinus, aliique. Turbith frequens offendi locis opacis, humidis, ad fossarum margines, retro hortorum sepes, aliisque sylvestribus à mare longe distitis in Zeylan & Malabarâ. Colliguntur in usum medicum, non caules ut perhibet Garzias, sed radices crassiores, turgentes lacte & resina copiosiore. Quæ ad nos transmittuntur radices, fodiuntur in Guzaratrâ, ubi proventus luxuriosus. Virtutes chatharticas Vide sis apud autores. Viguit Planta, à me ex Zeylan in Hortum advecta, ad tertium usquè annum, quò, antequam flores & semina perfecerat, interiit.

Convolvulus Syriacus & Scammonea Syriaca
Morif. Hist. 2. 12. Scammonia Syriaca *C. B.*
P. 295. Scammonia Syriaca, flore majori
 Convolvuli *I. B. tom.* 2. l. 15. 163.

* Convolvulus vulgaris major albus, seu flore
 majore albo *C. B. P.* 294. *Morif. Hist.* 2. 12.
 Convolvulus major *I. B. tom.* 2. l. 15. 154.

* Idem purpureus *Comel. Cat.* 26.

Convolvulus purpureus, folio subrotundo
Prod. C. B. P. 295. *Morif. Hist.* 2. 13. Cam-
 panula Indica *I. B. tom.* 2. l. 15. 165. ANN.
 Idem flore albo. ANN.

* Convolvulus vulgaris, flore minore purpu-
 reo *Morif. Hist.* 2. 13. Convolvulus minor
 arvensis *C. B. P.* 294. Helxine Cissampelos
 multis, sive Convolvulus minor *I. B. tom.*
 2. l. 15. 157.

* Idem flore albo *C. B. P. Var.* 294.

* Idem flore roseo *C. B. P. Var.* 294.

Convolvulus cœruleus Hederaceus, seu trifo-
 lius Park. *Morif. Hist.* 2. 13. Convolvulus
 cœruleus, Hederaceo anguloso folio *C. B. P.*
 295. Nil Arabum seu Convolvulus cœru-
 leus *I. B. tom.* 2. l. 15. 164. Folio angustio-
 ri. ANN.

Idem latiori folio. ANN.

Convolvulus Indicus villosus, Hederæ folio
 tripartito, flore cœruleo ANN.

Gaudet radice exili, pallidâ modicè fi-
 brosâ; Viticulis longis, tenuibus, pilosis,

in-

infirmis, quæ vel vicinis stipitibus implicantur, vel terræ incumbunt & ex viticulorum nodis novas radículas defigunt; Foliis pariter pilosis supernè viridibus, subtus pallidioribus, in tres lobos Nil Arabum instar divisis, ast angustioribus; Floribus monopetalis, campaniformibus, pentangulis, pallidè cœruleis fugacibus, ad solem expansis, cæteroquin clausis, tribus quatuorvè in hirsutum capitulum congestis, singulis insidentibus caliculis, villosis quinque foliatis. His includuntur vascula rotunda, plana, crustacea, in quibus quaterna semina triangula, fusca, hirsuta. Madet tenui lacte subacri ingrato, suspecto virtutis purgantis. Hujus semina ex Indiâ advexi, ubi locis aridis incultis uberrimus proven-
tus.

Convolvulus Americanus villosus pentaphyllus & heptaphyllus major. ANN.

A radice non adeò magnâ albente fibrosâ emittit sarmenta hirsuta, herbacea, infirma, in ramulos quam plures divaricata, sex aut plurium ulnarum longitudine, vicinis quibusvis adminiculis multivario amplexu sese involventia. Folia palmam ampla, hirsuta digitata, quinque vel septem profundis lacinis inscripta, alterâ parte viridia, alterâ subincana, longis pilosis petiolis adhærent. Ad horum exortum prodeunt

capitula hirsuta, veluti in præcedente, in quibus sunt flores pallidè flavescentes & post horum exanthesi semina, præcedenti omnino simillima. Lacte quoque dilutiori turgēt subacri ingrato. Ex Americā transmissus est hic elegantissimus Convolvulus ad Illustrissimum Virum, D^{nm} Casparum Fagelium, in cujus Viridario, exoticarum & rarissimarum arborum & herbarum feracissimo, luxuriat. Vide Convolvulum Ægyptium Vesslingii, cum quo Americanus noster non multum differt.


Idem Zeylanicus minor, Pes Tigrinus dictus. Convolvulus heptaphyllus Indicus villosus *Breyn. Prodr.* 33. Diwipahuru Zeylanensibus. ANN.


Hic alumnus est Horti Beverningiani à me olim ex Zeylan ad Illustrissimum Virum transmissus. Præcedenti simillimus est, at minor & hirsutior; Foliorum incisuræ sunt latiores & obtusiores, pedem Tigridis exprimentes. Hinc à Zeylanensibus accipit nomen Diwipahuru, sive pedis Tigridis. Flores candidi quini aut septeni prodeunt alternatim ex capitulis hirsutis, in propositâ figurâ à pictore minus appositè expressis. Seminum medulla, in aquam tepidam projecta, peramœno spectaculo, resolvitur in tenuissima candida folia, plantæ foliis exactè respondentia.

Con-


LUGDUNO-BATAVUS. 185
CONVOLVULUS AMERICANUS VILLOSUS PEN-
TAPHYLLUS ET HEPTAPHYLLUS MAIOR.




 **Convolvulus peregrinus cœruleus**, folio oblongo, flore peramæno triplici colore insignito *Morif. Hist.* 2. 17. **Convolvulus peregrinus cœruleus**, folio oblongo *Prodr. C. B. P.* 134. *I. B. tom.* 2. l. 15. 166. ANN.

 **Convolvulus Sicularis annuus cœruleus minimus**, capsulâ floris binis foliolis cinctâ *Morif. Hist.* 2. 36. **Convolvulus Sicularis minor**, flore parvo auriculato. *Bocon Pl. Sicul* 89. ANN.

Convolvulus argenteus, *Althææ* folio *C. B. P.* 295. *Morif. Hist.* 2. 13. floribus ex purpurâ candicantibus, *C. B. P. Var.* 295. **Convolvulus peregrinus pulcher**, folio *Betonicæ* *I. B. tom.* 2. l. 15. 159.

 **Idem** floribus omnino purpurascentibus, *C. B. P. Var.* 295. Foliis magis incisus & incanis.

 **Convolvulus minimus**, *Spicæfolius* *Lob. Morif. Hist.* 2. 17. **Convolvulus Linariæ** folio *C. B. P.* 295. **Convolvulus terrestris**. *I. B. tom.* 2. l. 15. 160.

Convolvulus exoticus annuus, foliis *Myriophylli* seu *Millefolii* aquatici, flore sanguineo. *Morif. Hist.* 2. 20. *Jasminum Millefolii* folio *C. B. P.* 398. *Quamoclit*, *I. B. tom.* 2. l. 15. 177. ANN.

Convolvulus major, semine triangulo vulgò v. *Frumentum Saracenicum*.

Idem minor, semine triangulo *B. P.* v. *Frumentum Saracenicum*.

LUGDUNO-BATAVUS. 187
CONVOLVULUS ZEYLANICUS VILLOSUS PENTAPHYL-
LUS ET HEPTAPHILLUS MINOR.



CONYZA Mas Theophrasti, major Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza major Monspeliensis odorata *I. B. tom. 2. l. 24. 1053.*

Conyza Fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza minor vera *I. B. tom. 2. l. 24. 1054.*

* Conyza Pannonica lanuginosa *C. B. P. 265.* Asteri montano hirsuto magno flore sive Oculo Christi similis, sive Conyza tertia Clusi *I. B. tom. 2. l. 24. 1047.*

Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis *C. B. P. 265.* Conyza media Matth. flore magnoluteo, humidis locis proveniens *I. B. tom. 2. l. 24. 1050.*

Conyza palustris ferratifolia *C. B. P. 266.* Virga aurea angustifolia serrata, sive Solidago Saracenica *I. B. tom. 2. l. 24. 1063.*

* Conyza aquatica laciniata *C. B. P. 266.* Conyza Helenitis mellita incana Lobelii *I. B. tom. 2. l. 24. 1052.*

Conyza major vulgaris *C. B. P. 265.* Conyza major Matthioli, Baccharis quibusdam *I. B. tom. 2. l. 24. 1051.*

* Conyza cœrulea acris *C. B. P. 265.* Senecio sive Erigeron cœruleus, aliis Conyza cœrulea *I. B. tom. 2. l. 24. 1043.*

Conyza Canadensis annua acris alba. *Boccon. pl. Sicul. 86.* Aster Canadensis annuus flore papposo *Hort. Reg. Paris. 27. ANN.*

Conyza media Monspeliensis *I. B. v. Aster.*

Conyza Africana incana arborescens, odore Salviae & Rosmarini vulgò. v. Elichrysum.

CORAL, arbor filiquosa *I. B. tom. 1. l. 12. 426.* Siliqua sylvestris spinosa arbor Indica *C. B. P. 402.* Arbuscula Corallii *Ferr. Flor. Cult. 381.* Arbor Fabifera. Boa-Tsink-King dicta *Bont. l. 5. 134.* Erabudu Zeylanensibus. Spinis ex albo virentibus & seminibus rubentibus.

Eadem minor spinis & seminibus nigricantibus. Jacerabudu Zeylanensibus.

Coral, arbor Americana maxima.

Seminibus, anno superiori ex America illatis, prodiit in Horto Dni Philippi de Flines hæc arbor, foliis amplissimis, quasi cineraceo pulvere aspersis, cujus flores favente cœlo hæc æstate videre licebit.

Coralloides ejusquæ species C. B. P. v. Dentaria.

CORCHORUS *Plinii Moris. Hist. 2. 283. C. B. P. 317.* Corchorus sive Melochia *I. B. tom. 3. 983. ANN.*

CORIANDRUM majus *C. B. P. 158.* Coriandrum sativum majus *Moris. Umbell. 48.*

Coriandrum *I. B. tom. 3. l. 27. 89. ANN.*

Coriandrum minus testiculatum *C. B. P. 158.*

Coriandrum minus odorum *I. B. tom. 3. l.*

27. 91. ANN.

COR

COR Indum, sive Halicacabum peregrinum multis *I. B. tom. 2. l. 15. 173. Morisf. Hist. 2. 19.* Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato *C. B. P. 343. Minus. ANN.*

Idem majus. ANN.

Coris Matth. C. B. P. v. Hypericum.

CORNUS hortensis Mas *C. B. P. 447. Cornus fativa, seu domestica I. B. tom. 1. l. 2. 202.*

Eadem fructu albo C. B. P. Var. 447.

Cornus Fœmina *C. B. P. 447. Cornus Fœmina putata, Virga sanguinea I. B. tom. 1. l. 2. 214.*

Eadem foliis variegatis.

Cornu Cervinum vulgò spicâ Plantaginis I. B. v. Coronopus.

Corona Imperialis I. B. v. Lilium.

Coronilla ejusquè species Morisf. v. Colutea.

* **C**ORONOPUS hortensis *C. B. P. 190. Coronopus, sive Cornu cervinum vulgò, spicâ Plantaginis I. B. tom. 3. l. 31. 509. ANN.*

* **Coronopus** maritima major *C. B. P. 190. Coronopus maritima nostras I. B. tom. 1. l. 31. 511.*

Coronopus Ruellii I. B. v. Nasturtium.

Corruda I. B. v. Asparagus.

Cortusa I. B. v. Primula Veris.

Co-

CORYLUS fativa, fructu albo minore, five vulgaris C. B. P. 417. Corylus fativa *I. B. tom. 1. l. 3. 266.* Nux avellana vulgò.

Corylus fativa, fructu rotundo maximo C. B. P. 418.

Corylus fativa, fructu oblongo rubente C. B. P. 418.

Eadem fructu pelliculâ albâ tecto *Cat. Hort. Reg. Paris. 58.*

*Corylus sylvestris C. B. P. 418.

Corylus Byzantina. Avellana peregrina humilis C. B. P. 418. Avellana Byzantina *I. B. tom. 1. l. 3. 270.*

Costus hortensis I. B. v. Tanacetum.

COTINUS Matth. C. B. P. 415. Coccigria, five Cotinus putata *I. B. tom. 1. l. 4. 494.*

Cotonea malus ejusquè species C. B. P. v. Malus Cydonia.

Cotoneaster. I. B. v. Mespilus.

Cotula non fætida & fætida I. B. v. Chamæmælum.

COTYLEDON flore luteo maxima. Cotyledon flore luteo, radice repente. *Dart. Mem. 73.*

Eadem media.

Superiori humilior est, & quoad omnes partes minor.

Ea-

Eadem minor. Cotylédon major C. B. P. 285.

Cotyledon vera, radice tuberosâ I. B. tom. 3. l. 35. 683. Umbilicus Veneris vulgò.

Cotyledon media, foliis subrotundis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon media, foliis oblongis serratis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon media subhirsuta, floribus punctatis C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon stellata B. P. v. Sedum.

Coum Herbariorum Cat. Hort. Reg. Paris. v. Cyclamen.

Crista galli. v. Pedicularis.

CRISTA Pavonis sive Frutex Pavoninus *Breyn. Cent. 1. 61. Monarakudimbija sive Cauda Pavonis Zeylanensibus. Flos Pavoninus Lusitanis.*

CRITHMUM sive Fœniculum maritimum majus, odore Apii C. B. P. 288. *Morif. Umbell. 20. Crithmum sive Fœniculum marinum grandius, cui succus luteus* I. B. tom. 3. l. 27. 199.

* *Crithmum seu Fœniculum maritimum minus* C. B. P. 281. *Morif. Umbell. 20. Crithmum multis, sive Fœniculum marinum* I. B. tom. 3. l. 27. 174.

COTY-

CRITHMUM maritimum spinosum C. B. P. 288. *Morif. Umbell. 20.* Pastinaca marina quibuidam, Secacul, & Crithmum spinosum I. B. tom. 3. l. 27. 176.

Crithmum maritimum, flore Asteris Attici C. B. P. v. Aster.

Crithmum quartum Matthioli umbelliferum I. B. v. Ammi.

Crithmum Chrysanthemum vulgò. v. Aster.

Croco-colchicum vulgò. v. Crocus.

CROCUS autumnalis fativus, floridus & sine flore *Morif. Hist. 2. 335.* Crocus fativus C. B. P. 65. Crocus I. B. tom. 2. l. 19. 637.

Crocus autumnalis Alpinus C. B. P. 65. *Morif. Hist. 2. 336.* Crocus montanus autumnalis I. B. tom. 2. l. 19. 636.

Crocus vernus latifolius, flore purpureo magno *Morif. Hist. 2. 336.* C. B. P. 65. Crocus vernus latifolius purpureus, flore majore I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus C. B. P. 65. *Morif. Hist. 2. 336.* Crocus vernus latifolius purpureus, versicolore flore I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Idem variegatus pallidus.

Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus C. B. T. 66. Crocus vernus latifolius

N

pur-

purpureus , flore minore *I. B. tom. 2.*
l. 12. 640.

Idem cœruleus, lineis violaceis variegatus *C.*
B. P. Var. 66. Crocus vernus latifolius, flo-
re purpurascens venis vario I. B. tom. 2.
l. 19. 640.

Crocus vernus Janthinus, latiore folio, linea
mediâ albâ, & margine flavescente Cat.
Hort. Reg. Paris. 59.

Crocus vernus latifolius albus variegatus
C. B. P. 65. Moris. Hist. 2. 336. Crocus
vernus latifolius, albo flore I. B. tom. 2.
l. 19. 640.

Idem foliorum mucronibus purpurascens
C. B. P. Var. 65.

Idem fundo violaceo. Hort. Eystett.

Idem supernè purpureus, infernè flavesens
C. B. P. Var. 66.

Idem floribus albo & violaceo colore mixtis,
basi cœruleâ Cat. Hort. Reg. Paris. 59.

Crocus vernus minor albicans C. B. P. 66.
Crocus vernus latifolius, albo versico-
lore flore simplici I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Crocus vernus latifolius C. B. P. 66. Moris. Hist.
2. 336.

Crocus vernus latifolius flavus C. B. P. 66. Mo-
ris. Hist. 2. 337.

Idem flavo flore, virenti basi Cat. Hort. Reg.
Paris. 60.

Crocus vernus latifolius aureus C. B. P. 66.

Idem pallidus C. B. P. 66.

Crocus vernus latifolius flavo-varius C. B. P. 66. *Morif. Hist.* 2. 336.

Idem sulphureo-varius.

Idem aureo-rutilo-varius *Crocus vernus latifolius flavo-varius*, alter C. B. P. 66. *Crocus vernus latifolius flavus*, vario flore I. B. tom. 2. l. 19. 644.

Crocus vernus angustifolius, magno flore C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 337. *Crocus vernus angustifolius*, floribus cœruleis sive violaceis, *Hispanicus* I. B. tom. 2. l. 19. 645.

Idem flore toto candido C. B. P. Var. 67. *Crocus vernus angustifolius*, floribus candidis I. B. tom. 2. l. 19. 645.

Crocus vernus angustifolius, parvo flore C. B. P. 67. *Morif. Hist.* 2. 337. *Crocus vernus angustifolius tertius Clusii*, flore multo minore cœruleo I. B. tom. 2. l. 19. 645.


Crocus vernus angustifolius serotinus, parvo argenteo-verficolo flore.

Crocus vernus juncifolius serotinus caulescens, floribus violaceis, ad solem aureis micis fulgentibus. *Croco-colchicum* vulgò.

Hic adeò similis est *Croco* verno angustifolio Clusii *Rar. l.* 2. 207. ut penè idem videatur. Sed dubium movet cauliculus semipalmaris, è cuius apice prodeunt tres quatuorvè flores violacei, ad solem expan-

fi, aureisque micis nitentes.

Crocus Indicus, Arabibus Curcum Bont. v.
Curcuma.



CROTALARIA Asiatica frutescens trifolia, floribus luteis amplis. Laburnum Zeylanicum, floribus ex luteo & rubro variegatis, siliquis bullatis. *Breyn. Prodr. 40.*

Crotalariae species inter crepundia & puerilia ludicra reponuntur apud Indos, dictæ vulgò Kiligilippe, quod crepitaculum seu *κρόταλον* audit. Harum enim tremulæ siliquæ, è ramis summis in tenuissimis petiolis pendentes, collisu tum ad se invicem, tum seminum ad illarum valvas, stridorem emittunt, ludentibus pueris, non injucundum. Quatuor verò innotuerunt species, Horto nostro familiares, quos Crotalariae nomine producere libet. Quanquàm fortè non ineptè fecissem, si sub nomine Anonidium, ad quarum classem alteram siliquis pendentibus pertinere videntur, proposuissem. Prima Asiatica trifolia dicta frutescit in caulem bipedalem, glaucum, crassitie digiti, varios ad latera spargentem ramos. Folia concoloria glabra terna ab uno digitali petiolo in obtusum mucronem gracilescunt Anagyridi proxima. Caulium spice ornantur floribus luteis papilionaceis, Anagyridi pariter similibus, singulis ex calyce quinque

LUGDUNO-BATAVUS. 197
CROTALARIA ASIATICA FRUTESCENS TRIFOLIA
FLORIBUS LUTEIS AMPLIS.



quefariam secto longis gracilibus petiolis dependentibus. rios filiquæ excipiunt bivalves, teretes, membranaceæ, rigidæ, glabræ, ex basi angustiori in ampliorem quasi ampullam cum longiori protenso filamento caudæ instar terminantes, filiquis Anonidis similes, sed longiores & ampliores, quæ includunt semina parva, compressa, flava, renalia, brevissimis tremulis petiolis affixa, facie & sapore Genistæ æmula. Radix subest lignosa, albicans, in aliquot ramos & paucas fibras diducta, vivax ad tertium quartumvè annum. Spontanea reperitur in sylvis Malabaræ, Zeylan, aliarumquè Orientalis Indiæ regionum. Hactenus non nisi feminibus propagari potuit, quicquid etiam industriæ & laboris fuit impensum. Semina quamvis apud Indos in usu non sunt, suspensionem præbent salis purgantis, quòd statim, ut ex Infuso aquæ calidæ assumpta sunt, minentur vomitum.

Crotalaria Asiatica folio singulari verrucoso, floribus cœruleis. ANN.

Altera extollit è radice albente parùm lignosâ raris fibris conspersâ, annuatim pereunte, caulem herbaceum, cubitalem, aliquando altiolem, nodosum, angulosum, in progressu quadrangulum, & propemodum alatum, frequentibus ramis in orbem dispo-

LUGDUNO-BATAVUS. 199
CROTALARIA ASIATICA FOLIO SINGULARI VER-
RUCOSO FLORIBUS COERULEIS.



dispositis ornatum, quibus per uncialia interstitia ex brevissimis petiolis adhærent folia semidigitum longa, duos ungues lata, in summo obtusa, parte supernâ dilutè viridia, infernâ ex viridi candicantia, nervosa, modo pro soli & climatis ingenio glabra, modo verrucosa, & ad margines undulata. Ramorum apices fastigiantur in spicam, quam ambiunt flores papilionacei, superiori multò minores, coloris cœrulei vel in cœruleo palleiscentis, numero quinque septem non rarò etiam triginta, uni spicæ adhærentes, qui ex parvis quinquifidis caliculis in tenuissimis tremulis petiolis nolæ instar dependent. His defluxis succedunt filiquæ præcedenti consimiles, ast nigricantes, minus glabræ, sed rarioribus pilis obsitæ cum filamento ad extremum breviori, claudentes semina velut in priori, cum quo & iisdem natalibus perficiuntur. Foliolorum sapor est oleraceus, seminum verò subacris & ingratus, quidpiam cathartici portendens.

Crotalaria Asiatica, floribus luteis, folio singulari cordiformi. ANN.

Tertia cum superioribus pares agnoscit natales, faciem, crescendi modum & vires. Ast foliis omnino glabris, ex basi angustâ sensim in latiorē obtusam & cordiformem aciem desinentibus, & sex septem-

LUGDUNO-BATAVUS. 201
**CROTALARIA ASIATICA, FOLIO SINGULARI COR-
DIFORMI, FLORIBUS LUTEIS.**



vè per transversum nervis inscriptis, floribus flavis & seminibus in siliquis glabris, ritu congenerum.

Crotalaria hirsuta minor Americana herbacea, caule ad summum sagittato. ANN.

Quarta ex America hùc allata emittit ab radice pallidâ fibrosâ cauliculum gracilem, nunc simplicem nunc multiplicem, ramosum, spithameum, hirsutum, ad radicem rotundum, in progressu verò prope singulorum foliorum exortus alatum, quasiquè fimbriatum, alis faciem sagittæ, ut in Chamægenistâ peregrinâ Clusii, exprimentibus. Folia cæteris speciebus minora unguem lata leviter mucronata hirsuta crassiuscula pallidè virentia cauli sine pediculo pressius adhærent. Flores ex spicâ propendent papilionacei dilutè flavescentes subhirsuti, Cythisi floribus haud majores, quos sequuntur semina reniformia in siliquis bullatis parvis hirsutis.

Cruciata quibusdam flore luteo I. B. v. Rubia.

Crupina Belgarum vulgò. v. Centaurium capitatum.

CUCUMIS fativus vulgaris C. B. P. 310. *Mocris. Hist. 2. 31.* Cucumis vulgaris viridis I. B. tom. 2. l. 16. 245.

Idem albus C. B. P. *Var. 310. I. B. tom. 2. l. 16. 245.*

Idem.

LUGDUNO-BATAVUS. 203
CROTALARIA HIRSUTA MINOR AMERICANA
SAGITTATA.



Idem maturus totus albus C. B. P. *Var.* 310.
Fructu maturo albo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
60.

Cucumis flexuosus C. B. P. 310. Cucumer longissimus I. B. *tom.* 2. l. 16. 247.

Cucumis Egyptius reticulatus Vesling. Moris. Hist. v. Pepo.

*CUCUMIS sylvestris asininus dictus C. B. P. 314. *Moris. Hist.* 2. 33. I. B. *tom.* 2. l. 16. 248.

CUCUMIS puniceus Cordi *Moris. Hist.* 2. 33.
Balsamina rotundifolia repens seu Mas
C. B. P. 306. Balsamina Cucumeraria I. B.
tom. 2. l. 16. 251. vulgò Momordica.
ANN.

Idem Zeylanicus. Maragosa Lusitanis.

Fert sarmenta longiora & crassiora, folia ampliora, profundius laciniata, fructus pyriformes, ex flavo-rubentes, superficie verrucosâ. Cætera cum priori conveniunt. Seritur in Zeylan & Malabarâ ad hortorum sepes, quos circinnis suis implicat. Folia amarissimi gustus sunt instar Lupuli, cujus loco a Belgis, in Oriente degentibus, ad coquendam Cerevisiam adhibentur. Indigenæ commendant decoctum & expressum succum in morbis chronicis à sale acido adusto, quod subvertit sal alcalicum.

CUCUMIS Flos Passionis dictus pentaphyllus, flore clavato. Clematis pentaphylla, flore roseo clavato. *Morif. Hist.* 2. 6. Murucuja 11. *Pison. Hist.* 247. Clematis passiflora pentaphylla flore coeruleo punctato. *Munting. Prax.* 421.

Idem foliis latioribus.

Idem Hederaceo folio, flore ex luteo viridanti. Clematis passionalis triphyllus, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 6. Clematis passiflora, flore luteo *Munting. Prax.* 422.

Idem triphyllus, flore roseo, clavato. Clematis passionalis triphyllus flore roseo *Morif. Hist.* 2. 7. Clematis trifolia flore roseo clavato C. B. P. 301. Clematis passiflora, flore roseo triphylla *Munting. Prax.* 423. Murucuja 111. *Pison. Hist.* 247. Maracot Indicum *Aldin. Hort. Farnes.* 50.

Idem flore ex purpura nigricante. Clematis trifolia altera, flore clavato ex nigro punicante. *Hort. Reg. Paris.* 53.

Idem Quajavas folio majori. Murucuja 1v. *Pison.* 247.

Idem folio minori. Murucuja v. *Pison.* 248.

CUCURBITA lagenaria, flore albo *Morif. Hist.* 2. 23. Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli C. B. P. 313. Cucurbita lagenaria I. B. tom. 2. l. 16. 216.

Cucurbita major sessilis, flore albo, folio molli

li *Morif. Hist.* 2. 23. Cucurbita major, flore albo, folio molli C. B. P. 312. Cucurbita latior, folio molli, flore albo I. B. tom. 2. l. 16. 215.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli C. B. P. 313. *Morif. Hist.* 2. 14. I. B. tom. 2. l. 16. 214.

Cucurbita sylvestris fungiformis. *Ger. Morif. Hist.* 3. 39. Cucurbita capitata C. B. P. 313. 313.

Cucurbita Indica parva *Morif. Hist.* 2. 39. I. B. tom. 2. l. 16. 227. Cucurbitæ parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperso, & semine rubro C. B. P. 313.

Cucurbitæ variæ species, fructus formâ & magnitudine, pro vario naturæ lusu, inter se differentes.

Cucurbita aspera, folio non fisso, fructu albo maximo sessili I. B. v. Pepo.

Cucurbita foliis asperis, sive *Zucha* flore luteo I. B. v. Pepo.

Cucurbita major rotunda flore luteo folio aspera C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita verrucosa C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita clypeiformis, sive *Siciliana* I. B. v. Pepo.

Cucurbita capitata Tabernæmontani I. B. v. Pepo.

Cucurbita aspera pyriformis, parva alba I. B.
v. Pepo.

Cucurbita aspera, cortice molli alba, magnitudine *Arantie* I. B. v. Pepo.

Culcas Vesling. v. Arum.

CUMINUM *Moris.* Umbell. 6. Cuminum semine longiore C. B. P. 146. Cyminum sativum I. B. tom. 3. l. 27. 21.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis C. B. P. & *Cuminum sylvestre primum valde odoratum globulosum* I. B. v. Pastinaca.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce *Melitenfis* C. B. P. v. Anisum.

Cuminum pratense, Carvi *Officinarum* B. P. v. Carum.

Cunila bubula Plinii C. B. P. v. Origanum.

Cunila gallinacea Plinii C. B. P. v. Origanum.

CUPRESSUS ramis expansis Mas. Cupressus C. B. P. 488. I. B. tom. 1. l. 9. 282.

Cupressus ramis in metæ fastigium convolutis
Fœmina. Cupressus Fœmina Dodon.

Cupressus Virginiana foliis *Acaciæ* deciduis.

Nomine Cupressi Virginianæ attuli ante aliquot annos ex Angliâ hanc arborem, quam in Virginia suâ sponte luxuriare accepi. Ad altitudinem humanam vix apud nos assurgit, caudice scabro, pollicis crassitiem superante, absque spinis, ligno solido

do durissimo, ramis rubentibus in elegantem coronam expansis, foliis Acaci & Ægyptiæ similibus, circa autumnum defluentibus De floribus & fructibus nihil mihi hætenus est compertum. Nasci amat locis irriguis, & depangi patitur per circumpositionem vel ramorum submersionem.

CURCUMA radice longâ. Cyperi genus ex Indiâ Matth. C. B. P. 37. Curcuma sive Terra merita Offic. radice croceâ *l. B. tom. 2. l. 19. 746.* Crocus Indicus, Arabibus Curcum, Officinis nostris radix Curcumæ dicta. *Iacob. Bont. Hist. Nat. l. 6. c. 30.*

Inter varias, quas ex Oriente in Hortum transvexi plantas, hospitatur in hunc usquè diem Curcuma, Arabibus & Indis decantatissima. Constat radice tuberosâ, tereti, in transversum actâ, Zingiberis facie, crassitie digiti, ex multis propaginibus cum circularibus in superficie zonis geniculatim constatâ, aliquot crassiusculas fibras ex geniculis demittente, ponderosâ, foris pallidâ & modicè scabrâ, intus croceâ ac temporis decursu in puniceum inclinante, solidâ quasi ex condensato croceo succo pressius compactâ, gustus acris amaricantis aromatici pinguis, odoris fragrantis. Hujus singula genicula protrudunt folia lætè viridia,

CURCUMA.



dia, plana, spithamum longa, unam duas-
 vè palmas lata, in modicum acumen desi-
 nentia, foliis Cannæ Indicæ junioris adeò
 similia, ut à rudioribus non facilè ab invi-
 cem discerni queant. Hoc errore ductum
 video Bontium, qui *Hist. Nat. & Med. l.*
7. c. 30. loco Curcumæ delineavit Cannam
 Indicam in India frequentem & hortis
 nostris satis familiarem. Cæterùm è novel-
 lis & robustioribus radicis tuberibus erigi-
 tur scapus dodrantalis, teres, succulentus,
 scriptorii calami crassitudine, ex viridi pal-
 lescent, inferiori parte nudus à medio verò
 ad cacumen usquè in crassam rotundam
 spicam fastigiatus, quam formant foliola ab
 exortu pallidè viridia, postmodum ex fla-
 vo rubentia vel ex pallido flava, duos un-
 gues lata, sensim in recurvum mucronem
 abeuntia, squamatim disposita, intra quo-
 rum commissuras delitescit tenax & vi-
 scosus humor, collectus ex nocturno de-
 ciduis rore. Insuper ex singulis squamis
 successivè prodeunt flores oblongi, Cannæ
 Indicæ facie, ast triplo minores, quatuor
 ut plurimum pallidè flavescentibus aut
 purpurascentibus petalis constructi, uno
 superiori obliquè sursum vergente, binis in-
 ferioribus rectà protensis, intermedio verò
 quadantenus intorto & fimbriato. Quibus
 excussis succedunt vascula parva, membra
 nacea,

nacea, tricapfulariâ, quæ continent semina rotunda, fusca, feminibus Cannæ Indicæ minora. Simili omnino fructificatione gaudent Bangala Indorum, Cardamomum majus & minus, Costus Arabicus, utraqûe Galanga, Zedoaria, Zerumbeth Garziæ, Zingiber, & proinde unâ cum Curcumâ sub uno & eodem genere summo merentur reponi. Indis adeò familiaris est Curcuma, ut vix hortus in Oriente reperire liceat, in quo non colatur. Maturescit foditurquè radix, postquam flores exaruerunt. Propagatur tam feminibus quàm nodulis seu geniculis à radice resectis. Donatur sale oleoso volatili, partibus blandis viscosis immerso, cujus virtutes recensent Bontius aliquè.

* **CUSCUTA** major *C. B. P.* 219. Cussuta, sive Cuscuta *I. B. tom. 3. l.* 28. 266. ANN.

* **Cuscuta** minor, sive **Epithymum** *C. B. P.* 219. ANN.

Cuurdo Pison. v. Cassia.

Cyamos leguminosa *I. B. v.* Faba.

CYANUS floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis major *Parkinsf. Theatr.* 482.

Ambrette vulgò. Flore purpureo. ANN.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 62.

ANN.

Idem flore incarnato. ANN.

Idem flore lutco. ANN.

Cyanus Orientalis alter : seu Constantinopolitanus, flore fistuloso candicante *Cat. Hort. Reg. Paris. 63. ANN.*

Idem fistuloso purpureo flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 63. ANN.*

Idem flore luteo fistuloso *Dodart Mem. 75. ANN.*

Cyanus montanus latifolius : vel Verbasculum Cyanoides *C. B. P. 273. Cyanus Alpinus, radice perpetuâ I. B. tom. 3. l. 25. 23.*

Idem angustifolius. Cyanus montanus, angustiore folio & longiore Belgicus *Cat. Hort. Reg. Paris. 61.*

Folia exhibet longiora, angustiora, tomento rariori obsita, cætera proximè allatæ paria.

* Cyanus segetum *C. B. P. 273. & Cyanus hortensis, flore simplici C. B. P. 273. Cyanus I. B. tom. 3. l. 25. 21. Flore cœruleo C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore albo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore purpureo *C. B. P. Var. 373. ANN.*

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore violaceo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

Idem flore carneo, fundo immaculati candoris *Cat. Hort. Reg. Paris. 62. ANN.*

Idem flore ex albo violaceo *C. B. P. Var. 274. ANN.*

Idem flore albo, umbilico cœruleo, violaceo, purpureo. *Eystet. ANN.*

Idem

Idem flore albo, fundo purpureo *C. B. P. Var.*

274. ANN.

Idem flore albo, fundo carneo *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 62. ANN.

Idem flore atro purpurascente *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 62. ANN.

Cyanus hortensis, flore pleno *C. B. P. 274. Cya-*

nus pleno flore *I. B. tom. 3. l. 25. 22. flore*

purpureo *C. B. P. Var. 274. ANN.*

Idem flore albo multiplici, medio pupureus

C. B. P. Var. 274. ANN.

Idem flore cœruleo multiplici *C. B. P. Var. 274.*

ANN.

Cyanus pulchro semine Centaurii majoris I. B.

v. Centaurium Capitatum.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè pur-
purascente *C. B. P. 308. Cyclaminus folio*

rotundiore vulgatiore *I. B. tom. 3. l. 32. 551.*

Flore dilutiùs purpurascente *C. B. P. Var.*

308.

Idem flore saturatiùs purpurascente *C. B. P.*

Var. 308.

Idem flore pleno.

Cyclamen orbiculato, folio infernè ex viridi
pallente *C. B. P. 308.*

Cyclamen autumnale, orbiculato circumroso
folio, subtus rubente, odoratissimo flore
carneo: *Corcyrarum Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 62.

Cyclamen autumnale, folio subrotundo lucido molliori & crenato, suavè rubente flore: Syriacum *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis infernè rubentibus, purpurascente flore: Coum Herbariorum *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore albo, basi purpureâ: Persicum dictum *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Idem carneo flore, basi purpureâ *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen vernum, anguloso folio, triplici viriditatis serie vario, maximis floribus albis, imo osculo purpurascente: Antiochenum Nuperorum, *Cat. Hort. Reg. Par. 63.*

Idem floribus maximis omnino niveis.

Cyclamen latifolium auriculatum, flore suavè rubente. *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen Aprili florens, cordato folio, amcenâ viriditate & albedine picto, minimo flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.* Cyclaminum orientale, Katmer Bouhour Turcarum *Cornut. 48.*

Cyclamen folio longiore anguloso, & linguam serpentis mentiente: Regium *Cat. Hort. Reg. Paris. 36. Sim. Paul. Quadr. Bot. 527.*

Cyclamen folio anguloso *C. B. P. 308.* flore intensius quàm in vulgare rubente *C. B. P. Var. 308.* Cyclaminus flore rubro graciliori vernus *I. B. tom. 3. l. 32. 554.*

Idem

Idem floribus omnino albescentibus *C. B. P.*
Var. 308.

Cyclamen *Hederæ folio C. B. P.* 308. *Cyclaminus folio anguloso l. B. tom. 3. l. 32. 553.*

Cyclamen vernum album *C. B. P.* 308. *Cyclaminus flore graciliori albo vernus l. B. tom. 3. l. 32. 554.*

Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens, folio maculato *C. B. P.* 308.

Idem folio paulò longiore, vix dum maculato, flore dilute purpurascente: Romanum recentiorum *Cat. Hort. Reg. Paris. 63.*

Cyclamen radice exigua *C. B. P.* 308. *Cyclaminus parvâ radice l. B. tom. 3. l. 32. 552.*

Cydonia malus ejusquè species Hort. Reg. Par. v. Malus Cydonia.

Cymbalaria C. B. P. v. Linaria.

*Cynecrambe Mas & Fœmina l. B. v. Mercu-
 rialis.*

Cynosorchis ejusquè species C. B. P. & l. B. v. Orchis.

*Cynoglossa fortè topiaria Plinio l. B. v. Buglof-
 sum.*

* *Cynoglossum majus vulgare C. B. P. 257.*
Cynoglossum vulgare l. B. tom. 3. l. 33. 598.
Flore rubente. ANN.

* *Idem flore albo C. B. P. Var. 257. ANN.*

* *Idem flore ex albo & rubro variegato. Cyno-
 glossum subrubente versicolore flore Park,
 Theatr. 512. ANN.*

* *Cynoglossum sylvaticum*, rubente caule *C. B. P.*
257. ANN.

Cynoglossum Creticum, argenteo angusto fo-
lio *C. B. P.* 257. *Cynoglossum Creticum pri-*
imum Clusii I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum Creticum latifolium, foetidum
C. B. P. 257. *Cynoglossum Creticum secun-*
dum Clusi I. B. tom. 3. l. 33. 601. ANN.

Cynoglossum semper virens in Phyt. & Prodr.
C. B. P. 257. *Cynoglossa folio virenti I. B.*
tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum minus C. B. P. 257. & *Cyno-*
glossum medium C. B. P. 257. *Cynoglos-*
sium minus I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossæ affinis Linifolia, semine umbilica-
to. *Linum umbilicatum Park. Theat. App.*
1687. ANN.

Cynoglossum flore cæruleo Parkin. v. Buglossum.

Cynoglossum folio molli, incano, flore cæruleo,
striis rubris variegato Moris. v. Buglossum.

Cynoglossum montanum majus C. B. P. v. Ce-
rinthe.

* *CYPERUS rotundus inodorus Germanicus*
C. B. P. 14. *Cyperus aquaticus septentrio-*
nalis Lobelio I. B. l. 18. tom. 2. 503.

* *Cyperus rotundus inodorus Anglicus C. B. P.*
14. *Cyperus rotundus littoreus inodorus*
I. B. tom. 3. l. 18. 503.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius C.
B. P.

B. P. 14. Trafi *l. B. tom. 3. l. 18. 504.*

Cyperus odoratus, radice longâ : sive Cyperus
Officinarum C. B. P. 14.

*Cyperus longus inodorus Germanicus C. B. P.

14. Cyperus longus inodorus sylvaticus
Lobelio *l. B. tom. 3. l. 18. 503.*

Cyperus genus ex India Matth. C. B. P. v. Cur-
cuma,

CYTISUS incanus, folio oblongo Austria-
cus C. B. P. 391. Cystifus Clusii Pannoni-
cus alter, foliis omnino incanis *l. B. tom. 1.
l. 11. 369.*

Cytifus incanus, folio medio longiore C. B. P.
389. Cytifus tertius Hispanicus cum brevi
pediculo *l. B. tom. 1. l. 11. 372.*

Cytifus foliis subruffâ lanugine hirsutis C. B. P.
390. Cytifus hirsutus *l. B. tom. 1. l. 11. 371.*

Cytifus glabris foliis subrotundis, pediculis
brevissimis C. B. P. 390. Cytifus glaber, si-
liquâ latâ *l. B. tom. 1. l. 11. 373.*

Cytifus glaber nigricans C. B. P. 390. Cytifus
glaber, sive siliquâ angustâ *l. B. tom. 1. l. 11.
373.*

Cytifus flore primùm incarnato, postmodum
rubello.

Pedali nonnunquam cubitali assurgit al-
titudine, virgis gracilibus lignosis, foliis gla-
bris, ternis in brevi pediculo, floribus in spi-
câ coacervatis, papilionaceis, ab exortu

candidis, post incarnatis gratè rubellis, sili-
quis & seminibus velut in anteallato.

Cytisus spinosus. *Acacia trifolia* C. B. P. 392.

Asphalatus secunda trifolia, quæ *Acacia*
secunda Matthiolo trifolia I. B. tom. 1. l. 11.

575.

Cytisus incanus, siliquis falcatis C. B. P. v. *Me-*
dica.

D.



actylus vulgò. v. *Palma*.

Damasonii species quibusdam I. B.
v. *Helleborine*.

Datura vulgo I. B. v. *Stramonia*.

Daucus vulgò ejusque species. v. *Pastinaca*.

Daucus Alpinus multifido longoque folio, sive
montanus, umbellâ candidâ C. B. P. v. *Myr-*
rhis.

Daucus montanus, Apii folio major C. B. P.
v. *Libanotis*.

Daucus Creticus, semine hirsuto I. B. v.
Myrrhis.

Daucus pratensis, Millefolii palustris folio C. B.
P. v. *Oenanthe*.

Delphinium I. B. v. *Consolida Regalis*.

DENS canis, latiore rotundiorequè folio
C. B. P. 87. Flore purpurascente *Morif.*
Hist. 2. 344. *Satyrion*, quorundam *Eri-*
thro-

thronium bifolium, flore unico radiato
purpureo *I. B. tom. 2. l. 19. 680.*

Idem maculis lacteis variegatus, albo flore
C. B. P. Var. 87. Satyrion, quorundam Eri-
thronium bifolium, flore unico radiato al-
bo I. B. tom. 2. l. 19. 680.

Dens canis angustiore longiore folio *C. B. P. 87.*
Flore albo *Morif. Hist. 2. 344. I. B. tom. 2.*
l. 19. 680.

Idem flore suavè rubente *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 65.

* **D**ENS leonis, latiore folio *C. B. P. 126.*
Hedypnois, sive Dens leonis Fuchsii *I. B.*
tom. 2. l. 24. 1035.

* Idem angustiori folio *C. B. P. 126.*

DENTARIA triphyllos *C. B. P. 322. Morif.*
Hist. 2. 254. Coralloides enneaphyllos
Clusii I. B. tom. 2. l. 21. 902.

Dentaria pentaphyllos *C. B. P. 322. Morif. Hist.*
2. 255. Coralloides prima quinquèfolia I. B.
tom. 2. l. 21. 900.

Dentaria heptaphyllos *C. B. P. 322. Morif. Hist.*
255. Coralloides altera, sive septifolia I. B.
tom. 2. l. 21. 901.

Dentariae affinis, Ecchii flore, capsulâ Anagal-
lidis Dodart. & Morif. v. Echio affinis.

DENTILLARIA Rondeletii *I. B. tom. 2. l. 22.*
941. Lepidium Dentillaria dictum C. B.
P. 97.

P. 97. Flore albo minore.
Eadem flore albo majore.

DIAPENSIA, sive Sanicula Mas Fuchsii *I. B. tom. 3. l. 34. 639.* Sanicula Officinarum *C. B. P. 319. Moris. Hist. 2. 616.*

DICTAMNUS Creticus *C. B. P. 222.* Dictamnus Cretica seu vera *I. B. tom. 3. l. 28. 253.*

DICTAMNUS spurius inodorus, acetabulis Moluccæ majoribus. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ *C. B. P. 223.*

Idem acetabulis Moluccæ minoribus. Pseudodictamnus verticillatus inodorus *C. B. P. 222.* Dictamnus adulterinum quibusdam, verticillatum vel potius Gnaphalium Veterum *I. B. tom. 3. l. 28. 255.*

Dictamnus Officinis I. B. v. Fraxinella.

DIGITALIS purpurea, folio aspero *C. B. P. 243. Moris. Hist. 2. 478.* Digitalis purpurea *I. B. tom. 2. l. 20. 812.*

Digitalis alba, folio aspero *C. P. B. 242. Moris. Hist. 2. 478. Descr. I. B. tom. 2. l. 20. 812. Descr.*

Digitalis latifolia, flore ferrugineo *Moris. Hist. 2. 478.* Majore.

Eadem flore ferrugineo minore *Cat. Hort. Reg. Paris. 68.*

Digi-

Digitalis angustifolia, flore ferrugineo C. B. P.

244. *Morif. Hist.* 2. 478. *Digitalis furruginea*, folio angustiori I. B. tom. 2. l. 20. 813.

Digitalis lutea, magno flore C. B. P. 244. *Morif. Hist.* 2. 479. *Digitalis lutea*, flore majore, folio latiore I. B. tom. 2. l. 20. 813.

Digitalis lutea, minore flore. *Morif. Hist.* 2. 479.

Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore C. B. P. 244. *Digitalis* flore minore, subluteo angustiori folio I. B. tom. 2. l. 20. 814.

Digitalis minima, *Gratiola dicta*. *Morif. v. Gratiola*.

Digitalis Americana purpurea, folio serrato *Dodart. v. Gratiolæ affinis*.

Dipcadi vulgò. v. Hyacinthus.

DISACUS fativus C. B. P. 385. I. B. tom. 3. l. 25. 73. ANN.

* *Dipsacus sylvestris*, aut *Virga pastoris major* C. B. P. 385. *Dipsacus sylvestris*, sive *Labrum Veneris* I. B. tom. 3. l. 25. 74.

Idem folio laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 75. *Dipsacus folio laciniato* C. B. P. 385. ANN.

* *Dipsacus sylvestris*, capitulo minore, vel *Virga Pastoris minor* C. B. P. 385. *Virga Pastoris vulgaris* I. B. tom. 3. l. 25. 75. ANN.

Diptamus. v. Dictamnus.

Dora. I. B. v. Milium.

Doria. I. B. v. Virga aurea.

Do-

DORONICUM maximum Americanum, latissimo anguloso folio, radice transparente.

Hoc nomine accepimus à Dno Jacobo Bobarto, Horti Academici Oxoniensis custode, Viro in plantarum scientiâ peritissimo. Flores & semina videre nondum contigit.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus *C. B. P.* 185. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruani modo caulem amplectentibus. *I. B. tom. 3. l. 25.* 18.

Doronicum latifolium, flore magno *C. B. P.* 185. Doronicum folio lato, flore magno *I. B. tom. 3. l. 25.* 17.

Doronicum Plantaginis folio *C. B. P.* 184. Doronicum folio ferè Plantaginis oblongo. *I. B. tom. 3. l. 25.* 18.

Doronicum radice dulci *C. B. P.* 184. Doronicum folio subrotundo serrato. *I. B. tom. 3. l. 25.* 17.

Doronicum radice Scorpii *C. B. P.* 184.

Doronicum Americanum, laciniato folio C. B. P. v. Chrysanthemum.

Dorycnium Monspeliensium vulgò. v. Lotus.

Dorycnium Imperati I. B. v. Convolvulus.

DRABA lutea, siliquis strictissimis *C. B. P.* 110. *Morif. Hist. 2. 234.* Drabæ seu Arabis alia

Alia Icon Chabr. 296. ex I. B. tom. 2. l. 22.

939.

Draba Erysimi flore & filiquis C. B. P. 109. Dra-

ba lutea, Erysimi flore & filiquis Morisf. Hist.

2. 234. Hesperidi Alpinae murariae vè simi-

lis surrecta & magna I. B. tom. 2. l. 21. 881.

* *Draba alba filiquosa procumbens. Draba alba*

filiquosa repens C. B. P. 109. Morisf. Hist. 234.

Hesperis Alpina, sive muralis minor repens

I. B. tom. 2. l. 21. 880.

* *Drabæ filiquosæ similis, planta præcox annua*

Morisf. Hist. 2. 235. Bursæ pastoris similis sili-

quosa major, seu majoribus foliis C. P. B. 108.

Bursa pastoria, sive Pilosella filiquosa I. B.

tom. 2. 21. 870. Major ANN.

* *Eadem minor. Bursæ pastoris similis siliquo-*

sa minor, seu minoribus foliis C. B. C. 109.

ANN.

Draba coerulea annua, folio virente crassiuscu-

lo Morisf. Hist. 235. Leucojum marinum

parvum, folio virente crassiusculo I. B. tom.

2. l. 21. 877. ANN.

D*RABA filiculosa repens major, foliis ma-*

gis incanis, spanospermos vulgaris Morisf.

Hist. 2. 313. Draba umbellata, vel Draba

major, capitulis donata C. B. P. 109. Draba

multis, flore albo I. B. tom. 2. l. 22. 939.

Dracacæphalon Breyn. v. Gratiolæ affinis.

DRA-

DRACUNCULUS hortensis C. B. P. 98. Dracunculus hortensis, sive Tarchon I. B. tom. 3. l. 26. 148.

Dracunculus pratensis, serrato folio C. B. P. v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis, flore pleno C. B. P. v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis alter Alpinus, folio Agerati Cat. Hort. Reg. Paris. v. Ptarmica.

Dracunculus palustris, sive radice Arundinacea C. B. P. v. Arum.

Dracunculus aquaticus I. B. v. Arum.

Dracunculus polyphyllus C. B. P. Major caule maculato. v. Arum.

Idem minor caule non maculato. v. Arum.

Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliiana C. B. P. v. Arum.

Dudaim. Gen. 30. & Cant. 7. Ludov. v. Ficoides

Dulcamara C. B. P. v. Solanum.

E.



bulus I. B. v. Sambucus.

Ecapatli altera Hernand. v. Senna.

Echinopus major I. B. v. Scabiosa.

Echinopus minor I. B. v. Scabiosa.

* **E**CHIUM majus & asperius, flore albo C. B. P. 254. Echium albo flore majus I. B. tom. 3. l. 33. 588. ANN.

Echium

Echium vulgare C. B. P. 254. I. B. tom. 3. l. 33.
556. ANN.

Echium Creticum latifolium rubrum C. B. P.
254. ANN.

Idem angustifolium rubrum C. B. P. 254. ANN.

Echium Auchusæ facie flore luteo minus.

Anchusa lutea minor C. B. P. 255. I. B. tom.
3. l. 33. 583.

Echium latissimo folio, Lycopsis dictum, flore dilutè purpurascens. *Lycopsis* C. B. P.
255. *Lycopsis Dioscoridis quibusdam* I. B.
tom. 3. l. 33. 584. ANN.

Idem flore albo. ANN.

Echium Lycopsis facie, Africanum perenne.

Producit cauliculos bipedales, asperos, nonnihil pilosos, ramosos, ex ruffo viridantes; Folia pingua crassiuscula lycopsis vulgaris angustiora, breviora, aspera, hirta, qualiquè verrucosa, & obtusa; Flores in cœruleo purpurascens; Semina triangularia, nigricantia; Coëtera superiori simillima. Hoc primum educavit ex seminibus Africanis Dns Wilhelmus Lesier; rariorum Plantarum æstimator & cultor curiosissimus, cujus liberalitate nobis est concessum.

Echium lappulatum quibusdam I. B. v. Bu-
glossum.

P

Echium

- Echium sylvestre lanuginosum* C. B. P. v. Anchusa.
Echium Scorpioides arvense C. B. P. v. Anchusa.
Echium Scorpioides palustre C. B. P. v. Anchusa.
Echio adfinis Dentariæ foliis vulgò. v. Hydrophyllum.
Elatine folio subrotundo C. B. P. v. Linaria.
Elatine folio acuminato C. B. P. v. Linaria.
Elaphoboscum I. B. v. Pastinaca.
Eleagnus Cordi I. B. v. Rhus.

- E**LICHRYSON foliis Abrotani C. P. B. 264.
 Heliochryson quorundam, folio Abrotani I. B. tom. 3. l. 26. 150.
Elichrysum seu *Stoechas citrina angustifolia* C. B. P. 264. *Stoechas citrina tenuifolia* Narbonensis I. B. tom. 3. l. 26. 154.
Elichrysum Orientale C. B. P. 264. *Stoechas citrina*, floris, & magnitudine, & colore speciosa I. B. tom. 3. l. 26. 154.
Elichrysum sive *Stoechas citrina latifolia* C. B. P. 264. *Stoechas citrina Germanica*, latiore folio I. B. tom. 3. l. 26. 153.
 * *Elichrysum sylvestre latifolium*, capitulis conglobatis C. B. P. 264. *Gnaphalium ad Stoechadem citrinam accedens* I. B. tom. 2. l. 26. 160.

Idem

**ELICHRYSUM INODORUM GLABRUM, CORONOP
FOLIO ANNUUM MAGNOLI.**

Idem angustifolium C. B. P. 264. Stœchadi citrinæ affinis, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappos evanescentibus *I. B. tom. 2. l. 26.*

156.

Elichrysum sylvestre, flore oblongo C. B. P. 265. Stœchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus *I. B. tom. 2. l. 26. 156.*

Elichryso sylvestri flore oblongo similis C. B. P. 265.

Elichrysum inodorum glabrum, Coronopi folio annum Magnoli. ANN.

Huic sunt cauliculi palmares, virides, succosi, infirmi, angulosi, striati; Folia digitalia, glabra, crassa, aliquot incisuris, Coronopo non absimilibus, dissecta; Flores in ramorum cimis rotundi, squamati, aurei corymbos Agerati æmulantes, in densiorem quasi umbellam conglomerati; Semina fusca, oblonga, parva cum tenuissimo pappo, Radix subest tenuis, albicans, fibrosa. Sapor & odor nullus manifestus. Prodiit nobis ex seminibus, nomine Elichrysi Magnoli à Nobilissimo Dno Johanne Battista Ciasli transmissis.

Elichryso affinis Africana arborescens, floribus purpuro-violaceis, foliis Salviæ, odore Rosmarini. Conyza Africana incana arborescens, odore Salviæ & Rosmarini vulgo.

Quam.

LUGDUNO-BATAVUS.

229

ELICHRYSO AFFIN. AFRIC. ARBOR. FLOR. PURP.
VIOL. FOL. SALV. ODORE ROSMARINI.



Quamquam hæc arbuscula nomen Chrysocomæ non mereri videatur, quòd ejus flores aureâ luce non refulgeant; Attamen ob florum squamatam corymbaceamquè structuram, & seminum papposam dispositionem, ceu primariam plantarum partem, Chrysocomæ haud dissimilem, huic adjungendam esse existimavi. Sponte nascentem reperi locis saxosis & salebrosis ad radices montis Tabulati Capitis Bonæ Spei, unde in Hortum translata lætâ fertilitate germinavit. Figit radicem longam, obliquam, pallidam, in brachia divaricatam, ex quâ virgulta assurgunt complura (nonnunquam unum) sex septemvè pedum proceritate, lignosa, ramosa, candida, incano tomentoso cortice vestita. His adstant folia, Salviæ quadantenus similia, rigida, crassa, perpetua, supra viridia, infra candida, inscripta numerosis obliquis nervis, è costâ mediâ in margines exporrectis, saporis acris amari aromatici, odoris fragrantissimi ex Rosmarino & Salviâ mixti. Ad ramorum cacumina pullulant multi ramuli, in quibus apparent parvi squamati tomentosi flosculi, Elichrysi vulgaris effigie, barbulis tamen angustissimis purpureo-violaceis cingentibus orbiculum pallidum, fatiscentem in tenuissima pappescentia semina. Mensibus Martio & Aprili floret in Hyemali; Iisdem men-

mensibus perficitur quoque ad Promontorium Bonæ Spei. Vegetat ramulis vel in terram deflexis, vel penitus resectis, & feraci solo infixis. Virtutibus respondet Rosmarino. Oleum ex destillatione prolectum utero obstrueto præstantissimum esse deoppiativum, experientia nos edocuit.

Elleborine ejusque species I. B. v. Helleborine.

Elleborus ejusque species I. B. v. Helleborus.

Endivii vulgaris C. B. P. v. Intybus.

Epazatl Rech. v. Atriplex.

EPHEMERUM Virginianum Joh. Tradescanti Parkius. Allium seu Moly Virgianinum C. B. P. 516. Phalangium Virginianum, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo cœruleo *Morif. Hist. 2. 334. Hallucin.*

Idem flore purpureo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Ephemerum Virginianum ramosum procumbens, foliis amplis *Zanon. Hist. Botan. 90.*

Idem Africanum annuum, flore bipetalo. ANN.

Hoc ab antedicto Ephemero, nomine Phalangii Virginiani à Zanonio curiosissime descripto & depicto, distinguitur tantum radice annuâ, & floribus minoribus duobus petalis constructis. Luxuriat in tesquis & ad margines rivulorum, circa Promontorium Bonæ Spei, in horto se ipsum

propagans seminibus deciduis. Similem speciem ast multò minorem observavi in Zeylan & Malabar, quæ in locis uliginosis aliisquè herbis abundabat. A Medicis reponnebatur inter aquea & refrigerantia medicamenta.

Ephemerum Matthioli vel potius Ephemerum spurium. v. Lyfimachia.

EPIMEDIUM Anguil. & Lunaria quorundam C. B. P. 323. I. B. tom. 2. l. 17. 391. Hist. Morif. 2. 196.

Epithymum C. B. P. v. Cuscuta.

* **E**QUISETUM palustre, longioribus setis C. B. P. 15. Equisetum majus aquaticum l. 2. I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum palustre, brevioribus setis C. B. P. 15.

* Equisetum palustre, brevioribus foliis polyspermon C. B. P. 15. Equiseti facie Polygonum Foemina I. B. tom. 3. l. 36. 732.

* Equisetum palustre, tenuissimis & longissimis setis C. B. P. 16. I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis C. B. P. 16. Equisetum sive Hippuris tenuissima, non aspera I. B. tom. 3. l. 36. 730.

* Equisetum pratense, longissimis setis C. B. P. 16. Equisetum minus terrestre I. B. tom. 3. l. 36. 730.

* Equi-

- *Equisetum arvense, longioribus setis C. B. P. 16.
- *Equisetum foliis nudum, non ramosum sive junceum C. B. P. 16. Equisetum majus aquaticum *lc.* 1. *I. B. tom.* 3. *l.* 36. 728.
- *Equisetum foliis nudum, ramosum C. B. P. 16.
- *Equisetum foetidum sub aquâ repens C. B. P. 16. *I. B. tom.* 3. *l.* 36. 731.
- Eranthemum* *I. B. v.* Adonis.

- *ERICA vulgaris glabra C. B. P. 485. Erica vulgaris, humilis semper virens, flore purpureo *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 354.
- *Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 485. *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 354.
- *Erica Myricæ folio hirsuta C. B. P. 485. Erica Myricæ folio, tomentosis & incanis foliis *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 355.
- *Erica maxima alba C. B. P. 485. Erica foliis Corios flore albo *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 355.
- *Erica maxima purpurascens longioribus foliis C. B. P. 485. Erica, foliis Corios quaternis, flore purpurascente *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 356.
- *Erica humilis, cortice cineraceo, Arbuti flore C. B. P. 486. Erica ramulis ternis, floribus saturatioribus purpureis *I. B. tom.* 1. *l.* 10. 357.
- Eadem flore albo *Hort. Reg. Parisi.*

- *ERICA baccifera procumbens nigra C. B. P. 486. Erica baccifera Matth. *I. B. tom.* 1. *l.* 5. 526.

Ericu Hort. Malab. v. Apocynum.

Erigerum I. B. v. Senecio.

Erigeron cœruleum I. B. v. Conyza.

Erinos Colum. I. B. v. Campanula.

Erinus Matth. v. Hieracium.

Eritrionium bifolium, flore unico radiato purpureo & albo I. B. v. Dens Canis.

Erva de St. Maria Pison. v. Arum.

ERUCA major sativa annua, flore albo striato *Morif. Hist. 2. 228. I. B. tom. 2. l. 19. 859.*

Eruca latifolia alba sativa C. B. P. 98.

Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo minore Morif. Hist. 2. 229. Myagrum filiquâ longâ C. B. P. 109. Myagro affinis planta, filiquis longis I. B. tom. 2. l. 21. 894.

Eadem filiquâ longissimâ.

Eruca latifolia lutea seu Barbarea major Morif.

Hist. 2. 230. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea C. B. P. 98. Barbarea I. B. tom. 2. l. 21. 868.

Eadem minor Morif. Hist. 2. 230.

Eruca maxima Canadensis Cornut. 15. Morif. Hist. 2. 230.

* *Eruca sylvestris major vulgatioꝝ foetens Morif. Hist. 2. 231. Eruca sylvestris major lutea, caule aspero C. B. P. 98. Eruca tenuifolia perennis, flore luteo I. B. tom. 2. l. 21. 862.*

* *Eruca sylvestris seu palustris minor procumbens & repens, luteo parvoquẽ flore Morif. Hist. 2. 231. Eruca sylvestris minor lutea par-*

parvoquè flore C. B. P. 98.

**Eruca palustris* & *Nasturtii* folia, filiquâ oblongâ C. B. P. 98. *Eruca* quibusdam sylvestris repens flosculo luteo I. B. tom. 2. l. 21. 866.

Eruca cœrulea in arenosis crescens C. B. T. 99.

Morif. Hist. 229. *Eruca* purpurea aliis cœrulea, live *Viola petræa* I. B. tom. 2. l. 21. 865.

Eruca maritima Anglica, filiquâ fungosâ porosâ rotundâ, foliis crassis latioribus *Morif.* v. *Raphanistrum*.

Eruca maritima Italica, filiquâ hastæ cuspidi simili C. B. P. v. *Raphanistrum*.

Eruca Monspeliaca, filiquâ quadrangulâ echinâtâ C. B. P. v. *Raphanistrum*.

Ervum semine anguloso Morif. v. *Orob.*

***E**RYNGIUM maritimum C. B. P. 386. *Eryngium marinum* I. B. tom. 3. l. 25. 86.

**Eryngium vulgare* C. B. P. 386. I. B. tom. 3. l. 25. 86.

Eryngium montanum amethystinum C. B. P. 386. *Eryngium cœruleum* I. B. tom. 3. l. 25. 86. quoad descriptionem.

Eryngium Alpinum cœruleum, capitulo Dipfaci C. B. T. 386. *Eryngium Alpinum*, latis foliis, magno capite oblongo cœruleo I. B. tom. 3. l. 25. 88.

Eryngium capitulis Psylli ex Sicilia Bacon. lc. & descr. 87.

Eryn-

Eryngium latifolium planum C. B. P. 386.

Eryngium planum, latifolium, capitulo rotundo parvo I. B. tom. 3. l. 25. 88. Flore cœruleo.

Idem flore albo C. B. P. Var. 386.

Eryngium Americanum foetidum. Itubu Surinamensibus. ANN.

Hoc *Eryngium* prodiit, in floreo Pandocheo Illustissimi Fagelii Seminibus, ex Surinamâ hûc illatis, pedis altitudinem nonnunquam superans, & *Eryngio* montano pumilo Casp. & Joh. Bauhini non multum dissimile. Surinamensibus audit Itubu, hoc est fuga serpentum, eo quod *Eryngii* hujus auram serpentes fugiant, nec eò loci, quò germinat unquam reperiantur. Nititur radiculis tenuibus, fibrosis, pallidè flavescen-
tibus, caulibus ternis quaternisvè viridan-
tibus, rectis, firmis, striatis, in frequentes ramos divaricatis quibus insident capitula oblonga echinata herbacea, Psyllii crassitie, subtus aliquot rigidis aculeatis foliolis circumvallata; Intra echinos capitulorum absconduntur flosculi exigui, pallidi, vix conspicui, fatiscentes in semina parva, suæ sortis paria. Folia circa radicem humi procumbunt, in orbem digesta, digiti longitudinem & latitudinem aliquando excedentia, molliora, obtusa, in ambitu crenata, singulis crenis in molleculas spinas desin-

nen-

ERYNGIUM AMERICANUM FOETIDUM.



mentibus; Ast quæ caulium geniculis per intervalla adnascuntur, sunt rigidiora, mucronata, & laciniata, marginibus profundius ferratis, & robustioribus aculeis armatis. Tota planta est nigrati fragrantis odoris, ad Coriandri recentioris folia accedentis; Gustus verò acris, & subdulcis. Ob salem volatilem, quem obtinet, reponitur ab Americanis inter alexipharmaca præstantissima. In uteri vitiis tantæ efficacix est, ut solus odor, naribus exceptus, hystericâ passione correptas restituere valeat.

ERYNGIUM luteum, facie Cardui. Scolymus Chrysanthemus C. B. P. 384. Spina lutea I. B. tom. 3. l. 25. 84.

Eryngium montanum minimum, capitulo magno C. B. P. v. Cnicus.

Eryngium arvense, foliis serræ similibus C. B. P. v. Ammi.

* **E**RYSIMUM vulgare C. B. P. 100. *Morif. Hist.* 218. Erysimum Tragi flosculis luteis, juxta muros proveniens I. B. tom. 2. l. 21. 863. ANN.

Erysimum polyceration vel corniculatum C. B. P. 101. Erysimum alterum Matthioli, siliquis parvis, quibusdam Dentaria I. B. tom. 2. l. 21. 864. ANN.

* Erysimum latifolium majus glabrum C. B. P. 101.

101. *Morif. Hist.* 2. 218. ANN.

Erysimum montanum, Irionis vulgaris folio
λεπτομακροκέφαλον Morif. Hist. 2. 219. *Erysi-*
num angustifolium majus C. B. P. 101. &
Rapistrum Italicum, filiquis longissimis
 C. B. P. 95. ANN.

Erysimum Cereale & Theophrasti C. B. P. v.
Frumentum Saracenicum.

Esula vulgò ejusquè species. v. *Tithymalus.*

* *EVONYMUS* vulgaris, granis rubentibus C. B.
P. 428. *Evonymus* multis : Aliis *Tetra-*
gonia I. B. tom. 1. l. 8. 202.

Evonymus latifolius C. B. P. 428. I. B. tom. 1.
 l. 8. 202.

Evonymo adfinis *Æthiopica* semper virens,
 fructu globoso scabro, foliis *Salicis* rigidis
 ferratis. *Lauro* ferratæ odoratæ *Stapelianæ*
 similis inodora *Capitis Bonæ Spei Breyn.*
Prodr. 42. *Laurus* non odorata, fructu glo-
 bofo *Africana* *Sterbeeck* *Citricult.* 248.

* *EUPATORIUM* *Cannabinum* C. B. P. 320. *Eu-*
patorium adulterinum I. B. tom. 2. l. 14.
 1065.

Eupatorium foliis *Enulæ Cornuti* 191.

Eupatorium Urticæ foliis *Canadense*, florè
Violaceo. *Valeriana Urticæ* folia florè *Vio-*
laceo *Corn.* 22. *Morif. Umbell.* 51.

Eupatorium veterum C. B. P. v. *Agrimonia.*

Eupa-

Eupatorium odoratum C. B. P. v. Agrimonia.

Eupatorium aquaticum Americanum Park.
v. Chrysanthemum

Euphorbium Dodonæi Lobelii C. B. P. v. Ti-
thymalus.

* **E**UPHRASIA *Officinarum* C. B. P. 233. Eu-
phrasia *l. B. tom. 3. l. 30. 432.* Flore ex
coeruleo purpurascens C. B. P. 134. ANN.

* Eadem flore ex luteo albicante C. B. P. *Var.*
134. ANN.

* Euphrasia pratensis rubra C. B. P. 234. Eu-
phrasia parva purpurea *l. B. tom. 3. l. 30.*
427. ANN.

* Euphrasia pratensis lutea C. B. P. 234. Coris
Monspessulana lutea *l. B. tom. 3. l. 30. 427.*
ANN.

F.



FABA C. B. P. 338. Faba, Cyamos,
leguminosa *l. B. tom. 2. l. 17. 279.*

Faba, major, sive Bona major *Dod.*
Morif. Hist. 2. 83. Semine rubro *Mo-*

rif. Hist. 2. 83. ex rubro purpurascens C. B.
P. Var. 388. ANN.

Eadem semine albo *Morif. Hist. 2. 83. C. B. P.*
Var.

Faba minor, seu equina C. B. P. 348. *Morif.*
Hist. 2. 84. Semine rubro *Morif. Hist. 2. 83.*

nigro C. B. P. *Var.* 338. ANN.

Eadem semine albo *Morisf. Hist.* 2. 83. C. B. P. *Var.* 338. ANN.

Faba sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. v. Vicia.

Fagopyrum vulgò. v. Frumentum Saracenicum.

* **F**AGUS C. B. P. 419. *Fagus* Latinorum: *Oxya* Græcorum I. B. tom. 1. l. 7. 217. *Fagus sepium* I. B. v. *Carpinus*.

FERRUM equinum, siliquâ singulari C. B. P. 349. *Morisf. Hist.* 2. 117. *Solca equina* I. B. tom. 2. l. 17. 347. ANN.

Ferrum equinum, siliquâ multiplici C. B. P. 349. *Morisf. Hist.* 2. 118. ANN.

Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate C. B. P. 346. *Ferrum equinum capitatum seu comosum Columnæ* *Morisf. Hist.* 2. 118. *Ornithopodio affinis, vel potius Soleæ vel Ferro equino, Herba* I. B. tom. 2. l. 12. 348.

Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summitate C. B. P. v. *Colutca*.

FERULA major seu *Fœmina* *Morisf. Umbell.* 35. *Ferula Fœmina* *Plinii* C. B. P. 148. *Ferula folio Fœniculi, semine latiore & rotundiore* I. B. tom. 3. l. 27. 43.

Q

Fe-

Ferula minor, tenuiore folio *Morif. Umbell.*

35. *Ferulago tenuiore folio* C. B. P. 148.

Narthecium Theophrasti, *Ferulago Gazæ*

I. B. tom. 3. l. 27. 44.

Ferula Tingitana, folio latissimo lucido *Sutherland. Hort. Edinb.* 119.

Eadem folio angusto lucido.

Ferula Libanotidis odorem & succum fundens, seu *Panax Asclepium* *Morif. Umb.* 35.

Libanotis Ferulæ folio & semine C. B. P.

158. *Libanotis* quibusdam, flore luteo semine *Ferulæ* I. B. tom. 3. l. 27. 41.

* *FESTUCA* graminea, glumis hirsutis C. B. P. 9.
Gramen Gros Montbelgardensium tom. I. B.

2. l. 18. 438. Spicis dispersis C. B. P. Var. 9.
Bromos vulgò. ANN.

* Eadem spicis in fasciculum comprehensis C. B.
P. Var. 9. ANN.

* *Festuca* graminea, glumis vacuis C. B. P. 9. I. B.
tom. 2. l. 18. 479. ANN.

* *Festuca Avenacea* sterilis elatior C. B. P. 9. *Ægilops* Matthiolo fortè I. B. tom. 2. l. 18. 439.
ANN.

* *Festuca utriculis* lanugine flavescentibus C. B.
P. 10. *Ægilops* quibusdam aristis recurvis,
five *Avena pilosa* I. B. tom. 2. l. 18. 433.
ANN.

Festuca altera, capitulis duris C. B. P. 10.

Festuca longissimis aristis, glumis variis spadicci

dicei coloris C. B. P. 10. Gramen Ægilops,
Bromoides Tabern. longissimis aristis I. B.
tom. 2. l. 15. 513.

FICUS communis C. B. P. 457. Ficus I. B. *tom.*
1. l. 1. 128. Fructu purpureo C. P. B. *Var.*
457.

Eadem fructu albo C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu viridi C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu cœruleo C. B. P. *Var.* 457.

Ficus nunquam maturescens *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 71.

Ficus foliis robustioribus & ramis erectiori-
bus.

Ficus humilis C. B. P. 457. Chamæficus I. B.
tom. 1. l. 1. 129.

FICUS Indica seu Opuntia major, folio spi-
nis longissimis & validissimis armato *Breyn.*
Prodr. 35.

Eadem folio minori, rotundiori & compres-
siori.

Ficus Indica seu Opuntia maxima, folio spino-
so, latissimo & longissimo.

Eadem folio spinoso longissimo & angusto.

Eadem folio oblongo media *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 70. An Nocheznopalli seu Zopal-
nocheztli, in quo Coccus Indicus nascitur
Hernand. Hist. Mex. p. 78?

Eadem minor. Ficus Indica humilis C. B. P.

458. Ficus Indica minima, folio subrotundo
Cat. Hort. Reg. Paris. 70.

FICOIDES, seu Ficus Aizoides Africana major
 procumbens, triangulari folio, fructu maxi-
 mo eduli. Ficus Hottentottorum vulgò.

Quas Plantas Clarissimus Paulus Am-
 mannus in plantarum charactere naturali
 Kalia Africana, & peritissimus Iacobus
 Breynius in Centuriâ Chrysanthema Ai-
 zoidea, ac in Prodro-mo Chrysanthemis si-
 miles, vulgus verò Asteres Aizoideos & Se-
 da triangularia appellant, placuit nunc pro-
 ducere sub titulo Ficoides, seu Ficus Aizo-
 ides Africanæ, ad cuius species veriùs viden-
 tur accedere, quàm ad Kali, Chrysanthem-
 um, Asterem aut Sedum. Etenim harum
 omnium floribus subicitur fructus, ad mo-
 dum Ficus Indicæ, vulgò Opuntia dictæ,
 qui, cujuscunque etiam sit magnitudinis &
 figuræ, includit pulpam succosam, dulcem,
 Ficui Indicæ similem, quamquàm siccita-
 te in fungosam aridam membranaceam sub-
 stantiam degenerantem & varios seminum
 loculos describentem. Dispersuntur autem
 in *quinque capsulares*, quarum duæ sunt
 fructu pyriformi majori, quinque fructu
 pyriformi minori, tres verò fructu orbi-
 culato: & *multicapsulares*, quarum altera
 est fructu majori, altera minori. Prima, fru-
 ctum maximum edulem Ficui simillimum
 pro-

FICUS AIZOID. AFRIC. MAI. PROCUMB. TRIANG.
FOL. FRUCT. MAXIM. EDULI.



proferens, spargit ab radice crassâ fibrosâ repente multisquè fibratâ capillamentis, cauliculos multos, humi stratos, digitum crassos, duos tresvè cubitum & amplius longos, succosos, ex viridi pallescentes, penes radicem aliquando rubentes, ad quorum genicula exeunt folia bina ex adverso, digiti longitudine & crassitie, triangularia, viridia, succulenta, cum totidem ex opposito ramulis & ex his aliis atque aliis, sustentibus in cacuminibus fructuum rudimenta pyriformia quinquangula, quinquè trigonis foliolis inferioribus multò minoribus circumvallata, intra quæ emicat flos stellæ vel solis effigie radiatus, Asteris flore amplior, ex molleculis tenuibus numerosis petalis quasi radiis ad Solem aureo fulgore micantibus constructus, cingentibus multa concoloria stamina farinacis flavescentibus apiculis donata, quorum medium occupant septem octovè cornicula ex luteo viridantia in orbem diffusa. His marcescentibus, maturatur fructus, adæquans nonnunquam Ficum vulgarem, viridis, pulposus, granis minutissimis, veluti in Icone incisî fructus videre est, refertus, saporis dulcis aquosi haud ingrati, summo umbilico quinquè stellatim decussatis radiis inscripto, pulpâ vel cito putrescente vel intensiori solis æstu in fungosam substantiam transcurrente, quæ dispecitur

scitur in quinque loculos, includentes semina exigua angulosa fusca. Luxuriat cum cæteris subsequenter hujus sortis locis maritimis aridis sabulosis ad Promontorium Bonæ Spei, ubi fructus tam à Belgis ibidem hospitantibus, quàm ab Indigenis Hottentottis esitantur. Hujus propagatio fit vel per avulsos ramulos terræ commissos, vel per radices, quas caulium genicula terræ proxima demittunt. Toto anno in Belgiâ viget & viret, ast præservanda est à brumæ injuriis. Conspicitur triplici florum colore, albo, purpureo, & flavo.

Eadem folio triangulari ensiformi.

Crevit ex seminibus Africanis in horto Dni Hemskerck, florum rariorum cultoris solertissimi. Priori omnibus notis respondet, exceptis foliis nonnihil brevioribus, enssem falcatum latiori dorso imitantibus.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. An Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio minus, flore flavo *Breyn. Cent. I. 165?* & Chrysanthemo similis Aizoides Africana media, triangulari folio, flore flavo *Ejusdem Prodr. 26?*

Partium exilitate neutiquam dispositione & formâ ab antè allatis differt: Frutescit cauliculis cubiti altitudine, rectis, tenui-

248 HORTUS ACADEMICUS
FICUS AIZOIDES AFRICANA MINOR ERECTA, FO-
LIO TRIANGULO GLAUCO, FLORE LUTEO.



FICUS AIZOIDES AFRICANA MINOR ERECTA,
FOLIO TRIANGULO VIRIDI.



nuibus, lignosis, albescentibus; Foliis duplo brevioribus, digiti minimi crassitiem vix adæquantibus, glaucis, triangulis; Floribus intra quinque foliola luteis, ad solem expansis, superiore minoribus; His subjiciuntur fructus Avellanæ nuclei magnitudine, pyriformes, quinquanguli, succulenti, dulces, vetustate fungosi, tenaces, quasique coriacei, in summo plani, quinque stellatim decussatis radiis notati, claudentes in totidem oblongis loculis semina, pallidè flavescentia, angulosa, dura, exigua. Indiget eadem, quâ superior, culturâ. Foliorum sapor observatur nunc salsus, nunc aquinosipidus, prout fert ingenium soli, in quo nascitur:

Eadem triangulari folio viridi, flore intus aureo, foris purpureo. An Chrysanthemum Africanum triangulari folio, flore carneo *Breynii Cent. 1. 164.*? & Chrysanthemo similis Aizoides Africana major, triangulari folio, flore carneo. Eiusdem *Prodr. 26.*?

Totâ æstate floret cum proximè descriptâ, cujus situm & figuram omnino imitatur; sed videtur paulò minor & gracilior. Folia edit viridia, flores aureos intus, extus purpurascens, eminus colorem quodammodo incarnatum mentientes.

Eadem folio tereti procumbens flore purpureo.

FICUS AIZOIDES AFRICANA, FOLIO TERETI
PROCUMBENS, FLORE PURPUREO.



reo. Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio, flore purpureo *Breyn. Cent. 1. 164.* Chrysanthemo similis Aizoides Africana minor, triangulari folio, flore purpureo *Breyn. Prodr. 26.*

Caliculis est infirmis, herbaceis, resupinis, dodrantalibus; Foliis viridibus, terebibus, angustis, gracilibus, digito longioribus; Floribus purpureis; Cœteris antecedenti paribus.

Eadem flore coccineo.

Hæc à modo dictâ differt foliis nonnihil longioribus, & floribus elegantissimo coccineo colore comantibus, educata in horto laudati Dni Heemskerck.

Eadem Neapolitana flore candido. Kali Crasulæ minoris foliis *C. B. P. 289. Moris. Hist. 2. 610.*

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana major, flore flavo, folio plano latiori. Chrysanthemum Aizoides Africanum primum seu latifolium *Breyn. Cent. 1. 160.* Chrysanthemo similis Aizoides Africana major latifolia. Ejusdem *Prodr. 24. ANN.*

Hujus flori subjicitur fructus orbicularis, succulentus, dulcis, ex vetustate fungosus, candidus imâ parte convexus, summa planus, medio umbilico barbato, ex quo quinque stellatim decussatæ lineæ ad extremum ambitum ducuntur, dividentes fructum in
qua-

LUGDUNO-BATAVUS. 253

FICUS AIZOID. AFRIC. FOL. PLAN. MINOR, MUL-
TICAUL. FLORE INTUS RUB. EXTUS INCARN.



quatuor cellulas, feminibus exiguis duris pallidis refertas. Cætera satis curiosè descripsit & depinxit laudatus Jacobus Breynius loco citato.

Eadem folio angustiori. ANN.

Omniſus partibus minor & gracilior conſpicitur.

Eadem minor multicaulis, flore intus rubente, extus incarnato. ANN.

Spargit cauliculos numerosos ſucculentos geniculatos, reſupinos ab radice pallidâ fibroſâ; Folia bina ex adverſo, ſuperioribus multò minora, Portulacæ inter & Halimi folia media, incana bullataquè aſpergine perſuſa; Flores denſis in ambitu barbulis radiatos, intus gratè rubentes, extus incarnatos, ſerò & manè congenerum ritu clauſos, medio verò die ſole illuſtrato expansos, aſpectu jucundiffimo; Semina pallida exigua in fructu ſuperiori minore.

Ficoides ſeu Ficus Aizoides Africana, triangulari folio longiffimo, fructu multicapſulari, flore luteo major. Chryſanthemum Aizoides Africanum ſecundum ſive teretifolium Breyn. Prodr. 161. Chryſanthemo ſimilis Aizoides Africana major ſecunda ſive teretifolia Ejusdem Prodr. 26. After Aizoides Capitis Bonæ Spei Zanon. Hiſt. Bot. 35.

Hanc

Hanc eandem esse existimo, quam laudatus Breynius in *Prodr.* 25. nomine Chrysanthemi similis Aizoides Africanæ majoris, triangularifoliæ, flore luteo majore, descripsit. Etenim pro ratione soli, & ætatis, modò amplior & robustior, modò minor & gracilior observatur. Fructus amplitudine nunc Cerasum nunc Nucem juglandem æquat, succulentus, sub dulcis, in fungosam membranaceam substantiam transiens, communiter septendecim pluribus vel paucioribus oblongis membranaceis loculis favis apum similibus partitus, ex cujus summo ambitu eriguntur totidem radii fungosi fusci acuminati, duas tresvè uncias longi, effigiem Coronulæ exprimentes. Radix perennat, coliturquè veluti species superiores.

Eadem minor. Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio, flore aureo *Breyn. Cent.* 1. 163. Chrysanthemo similis Africana major tertia, sive triangulari folio, flore aureo Ejusdem *Prodr.* 26.

Hæc antecedente minor profert fructus Cerasi magnitudinem vix excedentes, quindecim aut sedecim membranaceis loculis totidemquè radiis brevioribus (veluti semina Malvæ) in orbem junctis & in mucronatum capitulum terminantibus, constructos, quibus includuntur semina exigua du-

ra, angulosa, rufescentia. Reliqua videsis
apud Breynium loco citato.

FICOIDES seu Ficus Americana, cerei effigie,
spinosa & angulosa. Cereus Peruanus spi-
nosus, fructu rubro Nucis magnitudine C.B.
P. 485.

Eadem spinosior & angulosior.

FICOIDES seu Ficus Indica, longissimo latif-
simoquè folio, fructu longissimo, Musa Se-
rapioni dicta. Palma humilis, longis latisquè
foliis C.B. P. 507. Bananiera Pison. 154.
Bala Hort. Malab. tom. 1. 27. Musa I. B.
tom. 1. l. 1. 148. Mauz, Musa Alpin. de
Plant. Egypt. 80. Dudaim Ludolf l. 1.
c. 9.

Ficum specie fructus Peruanus C. B. P. v. Pe-
po arborescens.

Filicula fontana major C. B. P. v. Adiantum.

Filicula fontana minor C. B. P. v. Adiantum.

* **F**ILIPENDULA vulgaris, an Molon Plin.
C. B. P. 163. Filipendula I. B. tom. 3. l. 27.
189.

Filipendula montana, flore Pediculariæ C. B. P.
v. Pedicularis.

* **F**ILIX ramosa non dentata florida C.B.P. 375.
Filix floribus insignis I. B. tom. 3. l. 37. 736.
Osmunda vulgò

Filix Indica, Osmundæ facie. *Bod. à Stap. in Theophr. 320. Sim. Paul. Quadrip. Bot. 302.*

Filix Polypodii facie *Mentz. pugill.*

Filix montana florida perelegans, seu *Adiantum album floridum Raji Cat. 109.*

* **Filix ramosa major**, pinnulis obtusis non dentatis *C. B. P. 357. Filix major & prior Trag. sive ramosa repens l. B. tom. 3. l. 37. 735.*

* **Filix ramosa minor**, pinnulis dentatis *C. B. P. 358. Filix ramosa minor l. B. tom. 3. l. 37. 741.*

* **Filix non ramosa dentata** *C. B. P. 358. Filix vulgo mas dicta, sive non ramosa l. B. tom. 3. l. 37. 737.*

* **Eadem non ferrata** *C. B. P. Var. 358.*

* **Eadem in orbem**, nidum avis exprimentem, excrefcens.

* **Filix mas non ramosa**, pinnulis angustis raris profundè dentatis *Ger. emac. Filix mollis sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens l. B. tom. 3. l. 37. 738.*

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spinosis *Ger. emac.*

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis *C. B. P. 358.*

Filix saxatilis, foliis non ferratis *C. B. P. 358. Filix minor non ramosa l. B. tom. 3. l. 37. 740.*

Filix palustris, seu aquatica. *Raji Cat. 108.*

258. HORTUS ACADEMICUS

Filix saxatilis ramosa, nigris maculis punctata
C. B. P. 358.

Filix saxatilis, caule tenui fragili. *Raji Catal.*
108. An Filicula Alpina crispa C. B. P. 358?

*Filix querna C. B. P. 358.

*Filix Polypodium dicta. Polypodium vulgare
C. B. P. 359. I. B. tom. 3. l. 37. 746.

Filix aculeata major C. B. P. 358.

Flammula I. B. v. Ranunculus.

Flos Africanus ejusque species C. B. P. v. *Tagetes*.

Flos Mexicanus ejusque species I. B. v. *Mirabilis Peruviana*.

Flos Ambervalis vulgò. v. *Polygala*.

Flos Cardinalis Barberini Column. v. *Rapunculus*.

Flos cuculi ejusque species C. B. P. v. *Lychnis*.

Flos Constantinopolitanus I. B. v. *Lychnis*.

Flos Passionis ejusque species vulgò. v. *Cucumis*.

Flos clitorius Breyn. v. *Clitorius flos*.

FOENICULUM vulgare Germanicum C. B. P.
147. *Morif. Umbell.* 3. Foeniculum vulgare
minus, acriori & nigriori semine I. B. tom. 3.
l. 27. 2.

Idem foliis subnigricantibus C. B. P. *Var.* 147.

Foeniculum vulgare Italicum, semine oblongo
gustu acuto C. B. P. 147.

Foeniculum foliis atro-rubentibus *Sutherl.*
Hort.

Hort. Edinb. 122. An *Fœniculum* foliis subnigrantibus C. B. P. *Var.* 147?

Foliorum summitates atro-rubescunt, femina sunt angusta & longiora, cœtera congeneribus respondent. Germinavit ex seminibus Africanis.

Fœniculum dulce C. B. P. 147. *Morif. Umb.* 3.

Fœniculum vulgari simile, dulce I. B. *tom.* 3.

l. 27. 4. *Fœniculum dulce*, majori & albo semine *ibid.*

Fœnum Burgundiacum vulgò. v. *Medica.*

FŒNUM Græcum sativum C. B. P. 348. *Morif. Hist.* 2. 166. I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 363. ANN.

Fœnum Græcum sylvestre C. B. P. 348. *Fœ-*

num Græcum sylvestre Dalechampii I. B.

tom. 3. *l.* 17. 365. *Fœnum* Græcum sylve-

stre *μονοκέφαλον*, siliquâ brevior & latior

Morif. Hist. 2. 166. ANN.

Idem minus Arabicum. ANN.

Exilitate partium à superiori differt. Accepimus à Dno Iacobo Bobarto, ad quem inter alia ex Arabiâ erat missum.

Fœnum Græcum sylvestre I. B. v. *Astragalus.*

Fontalis seu Fontinalis I. B. v. *Potamogeton.*

* **F**RAGARIA vulgaris C. B. P. 326. *Morif. Hist.*

2. 186. *Fragaria* ferens fraga rubra I. B.

tom. 2. *l.* 17. 394.

* Eadem fructu albo C. B. P. 326. *Fragaria* ferens

fraga alba I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 394

Eadem fructu parvi Pruni magnitudine *C. B. P.*

227. *Moris. Hist. 2. 186.*

Fragaria fructu rotundo suavissimo, flore duplici *Cat. Hort. Reg. Paris. 72.*

Fragaria foliis hispidis *C. B. P. 327.*

Fragaria flore luteo *C. B. P. 327.*

Fragaria Virginiana, fructu coccineo *Moris. Hist. 2. 186.*

Fragaria sterilis *C. B. T. 327.* *Fragaria* non fragifera, vel non vesca *I. B. tom. 2. l. 17. 395.*

Fragaria sterilis seu minimè vesca hirsuta minimè incana *Moris. Hist. 2. 186.*

Fragaria Pentaphylli fructu *Moris. Hort. Bles. v. Pentaphylloides.*

Fragaria Pentaphylli fructu *Moris. v. Pentaphylloides.*

FRANGULA Matth. *Alnus nigra baccifera* *C. B. P. 428. I. B. tom. 1. l. 5. 560.*

FRAXINELLA, sive Dictamnus albus vulgò *C. B. P. 222.* Fraxinella, Officinis Dictamnus *I. B. tom. 3. l. 30. 494.* elatior, oblongiore spicâ saturatiore, foliis nigricantibus, *C. B. P. Var. 222.* Floribus purpureis.

Eadem floribus albis. Fraxinella niveo flore *Clus. Hist. Rar. Plant. l. 1. 100.*

Fraxinella, sive Dictamnus albus humilior, levioe spicâ, flore & foliis dilutioribus purpureis. *C. B. P. Var. 222.* An Fraxinella minor

nor purpurea Belgarum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72?

Eadem floribus albis.

FRAXINUS excelsior C. B. P. 416. Fraxinus vulgarior *I. B. tom. 1. l. 8.* 174.

Fraxinus Alepensis.

Superiori minor & humilior est, foliisque rotundioribus. Transmisit Dnus Watfius ex Angliâ,

FRITILLARIA præcox purpurea, variegata C. B. P. 64. *Morif. Hist. 2.* 402. Meleagris sive Fritillaria saturatior & dilutior *I. B. tom. 2. l. 19.* 681.

Fritillaria polyanthos flavo viridis C. B. P. 64. *Morif. Hist. 2.* 403.

Fritillaria ramosa C. B. P. 64.

Fritillaria flore magno pleno C. B. P. 64. *Morif. Hist. 2.* 403.

Fritillaria umbellifera C. B. P. 64.

Fritillaria alba præcox C. B. P. 64. Fritillaria alba altera *I. B. tom. 2. l. 19.* 684.

Fritillaria alba variegata C. B. P. 64.

Fritillaria serotina atro-purpurea C. B. P. 64.

Fritillaria serotina, floribus ex flavo virentibus C. B. P. 64. Meleagris sive Fritillaria aquitanica, reflexis oris *I. B. tom. 2. l. 19.* 683.

Eadem flore pleno *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72.

Fritillaria Isabella dicta, floribus ex pallide rubicundo-virentibus.

Fritillaria flore sulcato & anguloso obsoletè puniceo.

Fritillaria Indica maculato caule *Viperina* dicta *Cat. Hort. Reg. Paris.* 73.

Fritillaria flava, rubris maculis distincta C. B. P. 64.

Fritillaria angustifolia lutea variegata, magno flore C. B. P. 64. *Morif. Hist.* 2. 403.

Fritillaria flore minore C. B. P. 64. *Meleagris* sive *Fritillaria Pyrenæa*, flore minore *I. B. tom.* 2. l. 19. 683.

Fritillaria minima pluribus floribus C. B. P. 64. *Fritillaria polyanthos* non descripta *Swertii Morif. Hist.* 2. 403.

Fritillariarum variæ species, florum colore & magnitudine insignes, vario è satu produ-
ctæ.

Fritillaria crassa *Prom. Bonæ Spei Stapel.*
v. *Apocynum*.

FRUMENTUM Indicum Mays dictum C. B. P. 25. *Triticum Peruvianum* album longum *I. B. tom.* 2. l. 18. 454. *Tlaolli* seu *Maizio*. *Rech. Hist. Mexic.* 242. ANN.

Idem granis rufescentibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis crocantibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis nigricantibus C. B. P. *Var.* 26. ANN.

Idem granis cœruleis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 73. ANN.

Idem

Idem granis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
73. ANN.

Frumentum Indicum Mays dictum, alterum
C. B. P. 26. I. B. tom. 2. l. 18. 455. ANN.

FRUMENTUM Saracenicum Matth, Erysi-
mum Cereale *C. B. P. 26. Fagotriticum. I. B.*
tom. 2. l. 23. 393. Fagopyrum vulgò. ANN.

Frumentum Saracenicum alterum, Convol-
vuli modo scandens, semine triangulo mi-
nori nigro. *Morif. Hist. 2. 590. Convolvulus minor, semine triangulo C. B. P. 295.*

Helxine semine triangulo *I. B. tom. 2. l. 15.*
157. ANN.

Idem maximum Americanum. ANN.

Amplitudine antedictum vel sextuplo
superat, cœteroquin convenit.

Frutex Pavoninus Breyn. v. Crista Pavonis.

FUMARIA filiquosa semper virens *Cornuti*
Hist. Canad. 57. Morif. Hist. 2. 261. ANN.

Fumaria filiquosa bivalvis, radice fibrosa, la-
tifolia perennis humilior sine claviculis, flo-
re albo *Morif. Hist. 2. 260.*

* Fumaria claviculis donata *C. B. T. 143. Morif.*
Hist. 2. 260. Fumaria cum capreolis I. B.
tom. 3. l. 26. 204.

Fumaria lutea *C. B. P. 143. Fumaria lutea*
montana Park. Morif. Hist. 2. 260. Fuma-

ria, quæ Split dicitur *I. B. tom. 3. l. 26. 203.*
ANN.

Fumaria bulbosa, radice cavâ major *C. B. P.*

Fumaria tuberosa major, radice cavâ *Morif.*

Hist. 2. 261. Fumaria bulbosa, radice cavâ, flore purpurascens *I. B. tom. 3. l. 26.*

204.

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 261. I. B. tom. 3. l. 26. 204.*

Fumaria bulbosa, radice non cavâ major *C. B.*

P. 261. Fumaria tuberosa minor, radice

non cavâ *Morif. Hist. 2. 261.* Fumaria bulbosa, radice solidâ, calcari & folio cristato

I. B. tom. 3. l. 26. 205.

Eadem flore albo. *Eyst.*

*Fumaria bulbosa, radice non cavâ minor *C. B.*

P. 144.

*FUMARIA Officinarum & Diosc. *C. B. P. 143.*

Morif. Hist. 2. 261. Fumaria vulgaris latifolia, siliquis curtis non bivalvibus *Morif.*

Hist. 2. 261. Fumaria vulgaris *I. B. tom. 3. l. 26. 201.* ANN.

Eadem circa Monspelim nascens, foliis tenuissimis, floribus albis *C. B. P. Var. 261.* ANN.

Fumaria minor tenuifolia *C. B. P. 143.* Fumaria vulgaris minor tenuifolia *Morif. Hist. 2.*

261. Fumaria minor, sive tenuifolia surrecta *I. B. tom. 3. l. 26. 203.* ANN.

- F**UNGUS porosus C. B. P. 370. Fungus rugosus, vel cavernosus, sive Merulius niger & albus *I. B. tom. 3. l. 40. 836.*
- * Fungus orbiculatus exalbidus, pratenfis C. B. P. 370. Fungus D. Georgii, coloris exalbidum cum paucâ flavitie, esculentus pratenfis *I. B. tom. 3. l. 40. 824.*
- * Fungus semicircularis durus Merett *P. Rer. Nat. Brit. 42.*
- * Fungus pileo lato orbiculari candicante C. B. P. 370. Fungus piperatus albus, lacteo succo turgens *I. B. tom. 3. l. 40. 825.*
- * Fungus pileo lato longissimo, pediculo variegato C. B. P. 371. Fungus longissimo pediculo candicans, sed maculatus & esculentus *I. B. tom. 3. l. 40. 826.*
- * Fungus albus, pileo inverso *I. B. tom. 3. l. 40. 847.*
- * Fungus minor flavescens, infundibuli formâ C. B. P. 373. Fungi infundibulum referentes, flavescences, perniciosi *I. B. tom. 3. l. 40. 847.*
- * Fungus angulosus & velut in lacinias sectus C. B. P. 371. Fungus luteus sive pallidus, Chantarelle dictus, se contorquens, esculentus *I. B. tom. 3. l. 40. 832.*
- * Fungus membranaceus, auriculam referens sive Sambuccinus C. B. P. 372. Fungus Auriculæ Iudæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambucci caudice nascens *I. B. tom. 3. l. 40. 840.*

- *Fungus Lariceus, aurei coloris *C. B. P.* 371.
Fungus Laricum maximus, luteus, esculentus *I. B. tom.* 3. l. 40. 836.
- *Fungus Ceraforum imbricatim alter alteri innatus, variegatus *C. B. P.* 372. Fungus Ceraforum, coloris varii perniciosus *I. B. tom.* 3. l. 40. 848.
- *Fungus Coryleus orbicularis *C. B. P.* 372. Fungus sub Corylis, orbicularis figuræ *I. B. tom.* 3. l. 40. 842.
- *Fungus Salignus, Lichenis formâ variegatus *C. B. P.* 372. Fungus Salicum, coloris varii, perniciosus *I. B. tom.* 3. l. 40. 842.
- *Fungus putridis arborum ramis inhærens, plurimis simul cohærentibus *C. B. P.* 372. Fungus Spongia lignorum dictus *I. B. tom.* 3. l. 40. 842.
- *Fungus durus arborum, sive igniarius *Park. Th.* 1323.
- *Fungus Casearius Sterbekin. *Theatr. Fung.* 99.
- *Fungus oris laceris, & in lacinias divisus *C. B. P.* 373.
- *Fungus clypeiformis major *C. B. P.* 373. Fungi multi, ex uno pede clypeiformes, lutei & rubri *I. B. tom.* 3. l. 40. 835.
- *Fungi dumetorum, ex uno pede prodeuntes *C. B. P.* 374. Fungi multi, ex uno pede, perniciosi *I. B. tom.* 3. l. 40. 835.
- *Fungus foetidus, penis imaginem referens
C. B. P.

C. B. P. 374. Fungus Phalloides *I. B. tom. 3.*
l. 40. 843.

* Fungus rotundus orbicularis C. B. P. 374.

* Idem capitis pueri magnitudine C. B. P. *Var.*
 375. Fungus maximus rotundus pulveru-
 lentus, dictus Germanis Pofist *I. B. tom. 3.*
l. 40. 848.

* Fungus niger, culicis figuram referens C. B. P.
 375. Fungus pulverulentus, dictus Crepi-
 tus Lupi *I. B. tom. 3. l. 40. 848.*

G.



ale *I. B. v. Rhus.*

GALEGA vulgaris C. B. P. 352. *Morif. Hist.*
2. 91. tom. 2. l. 17. 342. Floribus cœruleis
C. B. P. Var. 352.

Eadem floribus penitus candicantibus C. B. P.
Var. 352.

Galega Ægyptiaca, siliquis propendentibus
 longissimis & angustissimis. Galega Ægy-
 ptiaca, siliquis articulatis C. B. P. 352. Sesban-
 Ægyptiacum, seu Securidaca Ægyptiaca ar-
 ticulata, *Park. Morif. Hist. 2. 79.* Taxaco
 quamoclit Indicum *I. B. tom. 1. l. 11. 384.*
 ANN.

Galega nemorensis verna & huic affines *I. B. v.*
 Orobus

Ga-

Galega adfinis Sophora dicta C. B. P. v. Senna.
Galeopsis ejusquè species I. B. v. Lamium,
Gallitrichum ejusquè species I. B. v. Hormi-
 num.

* **G**ALLIUM luteum C. B. P. 335. Gallium
 verum I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Gallium album latifolium, vel Mollugo mon-
 tana angustifolia C. B. P. 334.

Gallium montanum latifolium, ramosum.
 Mollugo montana latifolia, ramosa C. B. P.
 334 Rubia sylvatica lævis I. B. tom. 3. l. 36.
 716.

* Gallium palustre album C. B. P. 335. Gallium
 album I. B. tom. 3. l. 36. 721.

* Gallium palustre, luteo flore C. B. P. in Tabern.
 433. Gallium flore pallido. I. B. tom. 3. l.
 36. 721.

Gallium album minus C. B. P. 335.

Gallium latifolium, Cruciata quibusdam, flore
luteo I. B. v. Rubia.

Gelseminum Indicum flavum, odoratissimum
Ferr. v. Jasminum.

Gelseminum Ederaceum Indicum Corn. v. Cle-
matis.

Gelseminum Indicum maximum, flore phæniceo
Ferr. v. Clematis.

GENISTA - Spartium spinosum majus pri-
 mum, flore luteo C. B. P. 394. Aspal-
 tus

tus secunda Monspeliensis *I. B. tom. I. l. II.*
402.

Genista-Spartium spinosum foliis Polypodii
C. B. P. 394. Agul & Alhagi Arabibus,
Planta spinosa Mannam resiciens *I. B. tom.*
I. l. II. 405.

Genista spinosa major, brevibus aculeis *C. B. P.*
394.

Genista spinosa major, longioribus aculeis *C.*
B. P. 394. Genistellæ spinosæ affinis, Ne-
pa quibusdam *I. B. tom I. l. II. 400.*

* Genista spinosa minor Germanica *C. B. P. 395.*
Genista aculeata foliosa *I. B. tom. I. l. II.*
401.

* Genista minor Asphalathioides *C. B. P. 395.*
Genistella minor Aspalathioides *I. B. tom. I.*
l. II. 401.

Genista Hispanica, floribus luteis amplis, se-
minibus Lenti similibus. Spartium arbore-
scens, seminibus Lenti similibus *C. B. P. 396.*
Genista juncea *I. B. tom. I. l. II. 305.*

Genista Hispanica floribus luteis parvis mono-
spermos, semine reni simili *C. B. P. 396.*
Spartium Hispanicum, lobis rotundiuscu-
lis, flore luteo *I. B. tom. I. l. II. 397.*

Eadem floribus candidis. Spartium tertium,
flore albo *C. B. P. 396.* Spartium Hi-
spanicum, flore candido *I. B. tom. I. l. II.*
398.

Genista argentea *I. B. tom. 1. l. 11. 398.*

Genista tinctoria Germanica. *C. B. P. 395. Tinctorius flos I. B. tom. 1. l. 11. 391.*

Genista humilis, seu Chamægenista foliis Genistæ vulgaris *C. B. P. 395. Genistella pilosa I. B. tom. 1. l. 11. 193.*

Eadem foliis lucidis glabris.

Genista humilis, seu Chamægenista sagittalis *C. B. P. 396. Genistella herbacea, sive Chamæspartium I. B. tom. 1. l. 11. 393.*

*Genista angulosa & Scoparia *C. B. P. 395. Genista angulosa trifolia I. B. tom. 1. l. 11. 388.*

GENISTA arborescens Africana, Styracis folio. *Breyn. Prodr. Cœruleo flore. Arbor siliquosa Africana Genistæ semine Barth. Act. Hassn. Ann. 1673. observ. 131. Crotalaria arbor Africa Styracis folio molli incano, flore cœruleo Amm. Charact. Plant. 241.*

Malo Cotoneæ seu Styraci arbori similis videtur hæc Genista, Radice lignosâ albâ, caudice recto pollicem crassiori, lignoso, cortice in viridi pallecente, ramulis frequentibus vimineis obsequiosis ad cacumina incanis, quos denso alternatoquè ordine ambiunt folia Styracis facie rotunda crassiuscula, candidâ sericeâ lanugine pubescentia, intra quæ erumpunt flores plerumquè

GINISTA ARBORESCENS AFRICANA STYRACIS
FOLIO, FLORE COERULEO.



què singulares rarò] bini ternivè papilionacei cœrulei, exiguis fulti petiolis. Hos excipiunt siliquæ bivalves breves rotundiusculæ incanæ, claudentes semina reniformia fusca depresso. Gaudet irriguis ad Promontorium Bonæ Spei. Vires æmulator Genistæ vulgaris.

GENISTÆ Affinis Arbor Africana monospermos, flore cœruleo, foliis pinnatis. Genista - Spartium cœruleum Africanum, foliis pinnatis *Breyn. Prodr.* 36. Genista Ruteri vulgò.

In tesquis & marginibus rivulorum Promontorii Bonæ Spei luxuriat hic frutex unà cum Genista - Spartio coeruleo Æthiopico *Breyn. Cent.* 1. 66. à quo & facie & crescendo modo non multum abludit. Folia profert in principio terna uni petiolo adstantia, in progressu verò pinnata viridia angusta, asperiuscula, ramulos densissimo ordine vestientia, quibus & ab imo ad summum usquè circumstant flores coacervatim papilionacei pallidè cœrulei, prodeuntes ex utriculis oblongis membranaceis quinquifidis subhirsutis, cludentibus singulis semen unicum nigrum lucidum reniforme, tenui fuscâ membranâ, quasi peculiari siliculâ, tectum.

GEN-

GENISTÆ AFFINIS ARBOR AFRICANA MONO-
SPERMOS FLORE COERUL. FOL. PINNATIS.



GENTIANA major lutea C. B. P. 187. Gentiana vulgaris major, Ellebori albi folio I. B. tom. 3. l. 31. 520.

Gentiana Asclepiadis folio C. B. P. 187. Gentiana folio Asclepiadis vulgò creditæ I. B. tom. 3. l. 31. 523.

* Gentiana Cruciata C. B. P. 188. Gentiana minor, seu vulgi Cruciata I. B. tom. 3. l. 31. 522.

Gentianella Alpina angustifolia, magno flore C. B. P. 187. Gentiana Alpina magno flore I. B. tom. 3. l. 31. 523.

* Gentianella Alpina verna major C. B. P. 188. Gentianula quæ Hippion I. B. tom. 3. l. 31. 527.

* Gentiana angustifolia autumnalis major C. B. P. 188. Gentianæ species, Calathiana quibusdam, radice perpetuâ sive palustris I. B. tom. 3. l. 31. 524.

* Eadem minor floribus ad latera pilosis C. B. P. 188. Gentianula lanugine ad singulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito I. B. tom. 3. l. 31. 525.

Gentiana palustris latifolia flore punctato C. B. P. 188. Alisma folio glabro C. B. P. Phyt. 520. Gentiana punctato flore subcœruleo Pennæi I. B. tom. 3. l. 31. 528.

Gentiana folio convoluto I. B. v. Lychnis.

GERANIUM Africanum arborescens, Ibis folio rotundo, Carlinæ odore.

Ad

LUGDUNO-BATAVUS. 275

GERANIUM AFRICANUM ARBORESCENS, IBISCI
FOLIO ROTUNDO, CARLINÆ ODORE.



Ad radices montis Tabulati Promontorii Bonæ Spei frutescit hoc Geranium radice lignosâ albente crassâ fibrosâ, caule rotundo hirsuto tres & amplius pedes alto, aliquando statim à radice in complures ramos diviso, quibus ex longis pilosis crassisque petiolis circumstant folia in ambitu rotunda, leviter crenata, modò plana modò sinuata, crassiuscula mollia hirsuta Ibis in instar, dilutè virentia, odoris fragrantis Carlinam æmulantis; Circa fastigia prodeunt palmares ramuli, quibus ex oblongis quinquifidis subhirsutis caliculis insident flores ex incarnato rubentes, amplius quinque petalis constructi, duobus superioribus amplioribus galeæ instar erectis binisque sanguineis in basi striis insignitis, tribus inferioribus minoribus quali labiatis, prominentibus è medio aliquot staminibus cum stilo longiori in quinque sanguineas lingulas divaricato. His defluxis, succedunt more congenerum quinque capsulæ membranacæ, arctè sibi invicem annexæ, & in longum acutum mucronem terminantes, ex quibus, præ maturitate dehiscen-
tibus, prosiliunt totidem semina oblonga spadicea, rostrata, contorta, incanâ lanugine pubescentia, cum stilo intermedio nutritivo, è cujus apici semina hærent. Tota planta imprimis folia subacrem & aromaticum

ticum præbent saporem cum levi visciditate; Hinc reponi meretur inter carminantia & emollientia. Folia leviter exiccata non infelici effectu adjeci clysteribus contra ventris tormina, passionem Colicam, Iliacam, Nephriticam præsertim Calculum, cæterasquè Urinæ difficultates. In Belgia de facili propagatur seminibus, ramulis, & viviradicibus.

Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio laciniato odorato. Geranium Malvæ folio odoratum, flore purpurascente Capitis Bonæ Spei. *Breyn. Prodr. p. 36.*

Fundit radicem crassam candicantem fibrosam, cauliculos cubitales geniculatos nodosos resupinos, folia digitalibus petioliculis Malvæ paria subrotunda angulosâ crenata undulata nonnunquam laciniata odoris grati & aromatici, flores facie antecedentis, aut paulò minores sex septemvè plures vel pauciores quasi in capitulo seu umbellâ simul junctos, cui subjiciuntur quinque in orbem radiata hirsuta subrotunda foliola ambitu rubente & in exiguum molleculum mucronem abeunte. Sequuntur semina superiora tenuiora. Tota planta pilosâ hirsutaquè facie est, gaudens cum præcedenti iisdem natalibus culturâ & virtutis remissiori.

GERANIUM AFRICANUM FRUTESCENS, MALVÆ
FOLIO LACINIATO ODORATO.



Geranium Africanum Coriandri folio, floribus incarnatis, majus. **Geranium Æthiopicum**, Myrrhidis folio tertium, flore magno striato *Breyn. Cent.* 1. 129.

Idem flore incarnato minus.

Hujus & præcedentis folia prima seminalia sunt subrotunda, brevia, modicè laciniata, in progressu verò elongantur, & frequentioribus segmentis dissecantur, quæ in hac minori specie apparent tenuiora angustiora haud quaquam hirsuta. Flores prodeunt paulò minores, semina cœteraque omnia superiori simillima.

Geranium Africanum, **Betonicæ** folio laciniato & maculato, floribus incarnatis.

Prioribus accedit & hæc species, cujus folia inferiora radici proxima referunt effigiem foliorum **Betonicæ**, quæ verò in progressu cauli adstant, sunt majora, profundioribus laciniis incisa, & medio sinu ex fusco rubenti maculâ insignita, aliquando omnino viridia. Cauliculos spargit sphithamum longos geniculatos, ex viridi nonnihil rubentes, resupinos, sustinentes flores pentapetalos in carnatos **Geranio Africano Coriandri** folio majori perquàm similes, quos excipiunt semina quina rostellis contortis lanuginosis, ritu priorum & subsequantium.

280 HORTUS ACADEMICUS
GERANIUM AFRICANUM, CORIANDRI FOLIO, FLO-
RIBUS INCARNATIS MINUS.



LUGDUNO-BATAVUS. 281
GERANIUM AFRICANUM BETONICÆ FOLIO MA-
CULATO ET LACINIATO,



Geranium Africanum, Alchimillæ hirsutoq
folio, floribus albidis.

Cauliculos emittit bicubitales ex viridi
rubentes pilosos geniculatos procumbentes,
& ex singulis nodis novas radículas demit-
tentes, quibus ex longis pediculis adstant
folia rotunda, Alchimillæ foliis nonnihil
paria, pilosa, in viridi candicante, me-
diâ sui parte nonnunquam maculata, in
ambitu crenata & laciniata; Flores edit
multos simul junctos superioribus spe-
ciebus minores albidos & pro ingenio
foli & climatis in pallido vel flavesce-
ntes vel in carnatos, subsequenter se-
minibus quinque dispositione & facie con-
generum.

Geranium Americanum, noctu olens, radi-
ce tuberosâ, triste Cornuti. 109. *Morif. Hist.*
2. 517.

Geranium Africanum, noctu olens, radice
tuberosâ, foliis Pastinacæ incanis lanugi-
nosius latioribus, flore pallidè flavescente.
Geranium Æthiopicum, noctu olens, ra-
dice tuberosâ, foliis Myrrhidis latioribus.
Breyn. Cent. 1. 126.

Idem foliis angustioribus *Breyn. Cent. 1.*
127.

LUGDUNO-BATAVUS. 283
GERANIUM AFRICANUM, ALCHIMILLÆ HIRSUTO
FOLIO, FLORIBUS ALBIDIS.



Geranium Africanum, noctu olens tuberosum & nodosum, Aquilegiæ foliis. Geranium Æthiopicum noctu olens, radice tuberosâ, Aquilegiæ foliis. *Breyn. Cent. 1. 127.*

Constat radice longâ tuberosâ crassâ non-nihil lignosâ ex viridi pallescente, subinde aliquot fibris capillatâ; Caulibus surrectis bipedalibus cineraceis glabris lignosis, ad genicula crassescuntibus; Foliis utrinquè oppositis, Aquilegiæ facie, crassiusculis, segmentis tamen paucioribus & amplioribus dissectis; Floribus pentapetalis in umbellam congestis, nunc sursum nunc deorsum spectantibus, coloris buxei, nonnunquam obsoletè purpurascentis vespertinè ad auroram usquè jucundissimum spirantibus odorem; Seminibus antecedentium ritu quinis rostratis, candidâ sericeâ modicâ lanugine pubescentibus. propagatur seminibus, tuberibus seu geniculis.

Geranium Bartrachiodes, Gratia Dei Germanorum *C. B. P. 318.* Geranium Batrachoides *Morif. Hist. 2. 514. I. B. tom. 3. l. 30. 113.* Grandius floribus cœruleis *C. B. P. Var. 318.*

Idem floribus albis *C. B. P. Var. 318.*

Idem flore variegato *C. B. P. 318.* Ex albo cum cœruleo colore varium *I. B. tom. 3. l. 30. 476. Morif. Hist. 2. 514.*

Geranium Batrachiodes odoratum *C. B. P. 318.*

Morif.

LUGDUNO-BATAVUS. 285

GERANIUM AFRICANUM, NOCTU OLENS, TUBEROSUM ET NODOSUM, AQUILEGIÆ FOLIIS.



Morif. Hist. 2. 514. Geranium Batrachoides longius radicatum, odoratum *I. B. tom.* 3. l. 30. 477.

Geranium Batrachoides, folio Aconiti *C. B. P.* 318. *Morif. Hist.* 2. 514. Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente Clusii *I. B. tom.* 3. l. 30. 476.

Geranium sanguineum, maximo flore *C. B. P.* 318. *Morif. Hist.* 514. Geranium sanguineum sive Hæmathodes; crassâ radice *I. B. tom.* 3. l. 30. 478. Cauliculis procumbentibus.

Idem cauliculis erectis, flore minore.

Discrepat ab antecedente cauliculis rectâ assurgentibus, foliis obscure virentibus & floribus paulò minoribus.

Geranium Phœum sive fuscum, petalis reflexis *Morif. Hist.* 2. 515. Geranium montanum fuscum *C. B. P.* 318. Geranium phœum, flore reflexo *I. B. tom.* 3. l. 30. 477. Folio maculato.

Idem folio non maculato.

Geranium phœum seu fuscum, petalis rectis seu planis *Morif. Hist.* 2. 515. Geranium phœo sive pullo flore Clusii *I. B. tom.* 3. l. 30. 477. Folio non maculato.

Idem folio maculato.

Geranium radice Asphodeli *Morif. Hist.* 2. 515. Geranium nodosum *C. B. P.* 318. Ge-
ra-

ranium magnum, folio trifido *I. B. tom. 3. l. 30. 478.*

Geranium tuberosum majus *C. B. P. 318. Moris. Hist. 2. 516.* Geranium tuberosum *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium argenteum Alpinum longiùs radicatum *Ponæ Moris. Hist. 2. 516. C. B. P. 318.*

Geranium argenteum montis Baldi *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium Romanorum versicolor, sive striatum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium Muscoviticum purpureum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium foetidum *Park. Moris. Hist. 2. 517.*

Geranium Africanum, Uvæ crispæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis.

Germinavit nobis ex seminibus Africanis hæc pusilla Geranii species, radice tenui fibrosâ, cauliculis plurimis ramosis gracilibus geniculatis humi jacentibus, pronâ parte rubicundis, supinâ viridantibus, singulis geniculis adstant folia, interdum bina è regione, glabra lætè viridia, Uvæ crispæ foliis similia, sed quadruplo minora & frequentius incisa. Penes horum exortum exit tenuis pedunculus circiter longitudine digiti, sustinens flosculos unum tres quatuorvè exiguos pentapetalos rubellos, quibus singulis subjicitur

tur pediculus tenuis cum caliculo quinque partito, includente vasculum pentacoccon rostratum, in quo quina semina exigua more congenerum.

Geranium annuum minus Batrachiodes Bohæmicum purpuro-violaceum *Morif. Hist.* 2. 511. ANN.

* Geranium folio Malvæ rotundo majus *Morif. Hist.* 2. 511. Geranium folio Malvæ rotundo C. B. P. 318. Geranium folio rotundo multum serrato, sive columbinum *L. B. tom.* 3. l. 30. 473. ANN.

* Idem minus C. B. P. *Var.* 318. ANN.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis usquè ad pediculum divisis *Morif. Hist.* 2. 511. ANN.

* Idem flore minore cœrulescente *Raji Cat.* 130. ANN.

* Geranium columbinum tenuius laciniatum C. B. P. 318. *Morif. Hist.* 2. 512. ANN.

* Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 77. ANN.

Idem flore pediculo longissimo insistente *Morif. Hist.* 2. 512. Geranium columbinum, dissectis foliis, pediculis florum longissimis *Raji Cat.* 130. ANN.

Geranium annuum rotundifolium montanum saxatile lucidum *Morif. Hist.* 2. 512. Geranium lucidum saxatile C. B. P. 318. Geranium lucidum *L. B. tom.* 3. l. 30. 481. ANN.

Ge-

**GERANIUM AFRICANUM, UVÆ CRISPÆ FOLIO,
FLORIBUS EXIGUIS RUBELLIS.**



Geranium Althææ folio C. B. P. 310. *Morif. Hist. 2. 512.* Geranium Malvaceum I. B. tom. 3. l. 30. 472. Floribus dilutiùs rubentibus. ANN.

Idem floribus saturatiùs rubentibus. ANN.

Flores saturatori & lætiori rubore splendent, folia verò virore dilutiore, laciniisque profundioribus donata sunt.

Geranium minimum procumbens, foliis Betonicæ *Morif. Hist. 2. 512.* Geranium pusillum supinum maritimum, Betonicæ folio *Raji Catal. 131.* ANN.

Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ C. B. P. 319. ANN.

Geranium latifolium annuum, coeruleo flore, acu longissimâ *Morif. Hist. 2. 513.*

Geranium latifolium longissimâ acu C. B. P. 319. Geranium speciosum annuum, longissimis rostris, Creticum I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Geranium Cicutæ folio, moschatum C. B. P. 319. Geranium moschatum *Eyst. Morif. Hist. 2. 513.* Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente majus I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Idem minus. Geranium moschatum, folio ad Myrrhidem accedente, minus I. B. tom. 3. l. 30. 479. ANN.

* Idem inodorum C. B. P. 319. Geranium annuum

num, Cicutæ folio, inodorum *Morif. Hist. 2.*
512. ANN.

* Geranium Cicutæ folio, minus & supinum C.
B. P. 319. Flore bresilici coloris C. B. P. *Var.*
319. ANN.

* Idem flore albo C. B. P. *Var.* 319. ANN.

* Geranium Robertianum, flore dilutè rubello
Morif. Hist. 2. 513. Geranium Robertianum
murale I. B. tom. 3. l. 30. 480.

* Geranium Robertianum, flore rubello majori,
folio tenuiter dissecto. Geranium gruina-
le, folio tenuiter diviso I. B. tom. 3. l. 30.
474. ANN.

Geranium Coriandri folio odorum C. B. P. 319.
Geranium Apulum, Coriandri folio, alte-
rum odorum *Colum. Morif. Hist. 2.* 513.
ANN.

GINGIDIUM umbellâ longâ C. B. P. 151.
GIVisnaga seu Gingidium *Morif. Umbell. 6.*
Gingidium Matth. I. B. tom. 3. l. 27. 79.
ANN.

Gingidium foliis Pastinacæ latifoliae C. B. P. v.
Tordilium.

GLADIOLUS maximus Indicus C. B. P. 41.
Morif. Hist. 2. 343.

Gladiolus major Byzantinus C. B. P. 41. *Morif.*
Hist. 2. 344.

Gladiolus major, radice oblongâ, flore albo
T 2 *Morif.*

Morif. Hist. 2. 343.

Gladiolus floribus uno versu dispositis, major

C. B. P. 41. Morif. Hist. 2. 343. Gladiolus sive

Xyphion I. B. tom. 2. l. 19. 701.

Idem flore candicante *C. B. P. Var. 41.*

Idem Narbonensis, flore incarnato *C. B. P. Var.*

41.

Gladiolus utrinquè floridus *C. B. P. 41. Morif.*

Hist. 2. 443. Flore rubro.

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 41.*

Gladiolus floribus uno verso dispositis, minor

C. B. P. 41. Floribus eleganter rubellis.

Idem floribus incarnatis.

Gladiolus Æthiopicus, flore miniato *Cat.*

Hort. Reg. Paris. 78.

Gladiolus Æthiopicus, flore coccineo *Cornuti*

Morif. Hist. 2. Icon.

Gladiolus fœtidus *C. B. P. v. Iris.*

Glastum sativum, & spontaneum I. B. v. Isa-
tis.

Glastifolia Cichoroides I. B. v. Brassica.

* **G**LAUX maritima *C. B. P. 215. Glaux exi-*
gua maritima I. B. tom. 3. l. 29. 373.

GLYZYRRHIZA filiquosa vel Germanica
C. B. P. 352. Morif. Hist. 2. 89. Glyzyrrhi-
za, radice repente, vulgaris Germanica I. B.
tom. 2. l. 17. 328.

Gly-

Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. v. Onobrychis.

Glyzyrrhiza sylvestris, flore luteo pallescente
C. B. P. v. Astragalus.

GNAPHALIUM maritimum C. B. P. 263. I. B. tom. 3. l. 26. 157.

Gnaphalium latifolium Americanum C. B. P. 263. Gnaphalium Americanum I. B. tom. 3. l. 26. 162.

* Gnaphalium vulgare majus C. B. P. 263. Gnaphalium Germanicum I. B. tom. 3. l. 26. 158. ANN.

* Gnaphalium medium C. B. P. 263. Gnaphalio vulgari similis I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium minus repens C. B. P. 263. Gnaphalium minimum I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium roseum sylvestre C. B. P. 263. Gnaphalium umbellatum minimum I. B. tom. 3. l. 26. 162.

Gnaphalium majus, lato oblongo folio C. B. P. ANN.

* Gnaphalium majus, angusto oblongo folio C. B. P. 263. Gnaphalium vulgare tenuifolium I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium majus, angusto oblongo flore alterum C. B. P. 263. Gnaphalium rectum I. B. tom. 3. l. 26. 160. ANN.

- * *Gnaphalium montanum*, flore rotundiore *C.*
B. P. Var. 263. Pilosella minor quibusdam,
 aliis *Gnaphalii* genus *I. B. tom.* 3. l. 16. 162.
 Floribus candidis *C. B. P. Var.* 263.
 Idem floribus subpurpureis *C. B. P. Var.* 263.
I. B. tom. 3. l. 16. 162. *desc.*
 Idem floribus ex candido & rubro mixtis *C.*
B. P. Var. 263. *I. B. tom.* 3. l. 16. 162. *desc.*
 Idem floribus luteis.
 Idem floribus sulphureis.
Gnaphalium Veterum *I. B. v.* Dictamnus.
Gnaphalium Tragi *I. B. v.* Gramen.

GNAPHALIO affinis *Ocymastri* folio, flore
 ex purpureo violaceo. *Amarantho* affinis
Indiæ Orientalis, floribus conglomeratis,
Ocymoidis folio *Breyn. Cent.* 1. 109.
 ANN.

GOSSIPIUM arboreum Orientale, foliis Salicis digitatis latioribus. *Gossipium* Javanense, Salicis folio *C. B. P.* 430. Lanigera arbor peregrina *I. B. tom.* 3. l. 3. 347. Arbor lanigera *Bont. Hist.* l. 6. c. 14. Panja, Panjala *Hort. Malab. tom.* 3. 59.
 Idem foliis angustioribus Javanense.
Gossipium arboreum, flore atro purpureo.
Gossipium arboreum, caule levi *C. B. P.* 430.
Xylon arboreum *I. B. tom.* 3. l. 3. 346.
 Idem flore flavo.

Gof-

Gossipium herbaceum five Xylon *I. B. tom. 1. l. 3. 343.*

- * **G**RAMEN caninum arvense, five Gramen **G**Diosc. *C. B. P. 1. Gramen repens Officina- rum fortè Triticæ spicæ aliquatenus simile I. B. tom. 2. l. 18. 457.*
- * Gramen caninum longiùs radicaturn majus *C. B. P. 1. Gramen canarium longiùs radi- catum, latiore paniculâ I. B. tom. 2. l. 18. 457.*
- * Idem minus *C. B. P. 1. Gramen canarium, la- tiore paniculâ minus I. B. tom. 2. l. 18. 457.*
- * Gramen caninum supinum paniculatum dul- ce *C. B. P. 1. I. B. tom. 2. l. 18. 459.*
- * Gramen caninum supinum minus *C. B. P. 1. Gramen parvum repens, purpureâ spicâ I. B. tom. 2. l. 18. 459.*
- * Gramen caninum maritimum spicatum *C. B. P. 1. & I. B. tom. 2. l. 18. 467.* Et Gramen repens maritimum, spicâ exiguâ *I. B. tom. 2. l. 18. 478.*
- * Gramen caninum maritimum, spicâ foliaceâ *C. B. P. 2. Gramen longiùs radicaturn mari- num, utriculos pro spicâ gerens I. B. tom. 2. l. 18. 978.*
- * Gramen murorum, radice repente *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 468.*
- * Gramen nodosum Avenaceâ paniculâ *C. B. P. 2. Gramen nodosum I. B. tom. 2. l. 18. 456.*
- * Gramen nodosum, spicâ parvâ *C. B. P. 2. Gra- men cum parvâ caudâ muris, radice nodo-*

sa, repens *I. B. tom. 2. l. 18. 472.*

Gramen bulbosum ex Alepo *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 431.*

Gramen tremulum maximum *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*

Gramen tremulum majus *C. B. P. 2. Gramen tremulum I. B. tom. 2. l. 18. 469. ANN.*

Idem perenne.

Gramen tremulum minus paniculâ parvâ *C. B. P. 2. Gramen tremulum minus I. B. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*

Gramen paniculis elegantissimis, sive *ἰεγυρῶ-
ς*, majus *C. B. P. 2. Gramen amoris dictum I. B. tom. 2. l. 18. 470.*

* Gramen pratense paniculatum molle *C. B. P. Gramen lanatum Dalechampii I. B. tom. 2. l. 18. 466.*

* Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio: *ῥῖα* Theoph. *C. B. P. 2. Gramen pratense vulgare, spicâ ferè arundinaceâ I. B. tom. 2. l. 18. 461.*

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio *C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18. 461.*

* Gramen pratense paniculatum medium *C. B. P. 2.*

* Gramen pratense paniculatum minus *C. B. P. 2. Paniculâ & culmis purpurascens cibus C. B. Var. 3. Gramen paniculatum minus rubrum I. B. tom. 2. l. 18. 465.*

* Idem paniculâ & culmis albis *C. B. P. Var. 3. Gra-*

Gramen paniculatum minus album *I. B. tom.*
2. l. 18. 465.

- * Gramen arvense, paniculâ crispâ *C. B. P. 3.*
- * Gramen segetum altissimum, paniculâ sparsâ
C. B. P. 3. Gramen capillatum I. B. tom. 2.
l. 18. 462.

- * Gramen segetum paniculâ Arundinaceâ *C. B. P.*
3. Gramen agrorum Lob. I. B. tom. 2. l. 18.
461.

Gramen paniculatum odoratum *C. B. P. 3.*
Gramen Mariæ odoratum *I. B. tom. 2. l. 18.*
478.

- * Gramen palustre paniculatum, altissimum *C.*
B. P. 3. Gramen aquaticum Harundinace-
um, paniculatum Tab. I. B. tom. 2. l. 18.
488. & tom. 2. l. 18. 542.

- * Gramen aquaticum paniculatum, latifolium
C. B. P. 3. Gramen majus aquaticum Lobe-
lii I. B. tom. 2. l. 18. 481.

- * Gramen aquaticum fluitans, multiplici spicâ
C. B. P. 3. Gramen aquaticum cum longissi-
mâ paniculâ I. B. tom. 2. l. 18. 490.

- * Gramen aquaticum geniculatum spicatum *C.*
B. P. 3.

- * Gramen pratense cristatum, sive Gramen spicâ
cristatâ, læve *C. B. P. 3. Gramen cristatum*
I. B. tom. 2. l. 18. 468.

- * Gramen Typhoides maximum, spicâ lon-
gissimâ *C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris*
majoris longâ, majus I. B. tom. 2. l. 18. 472.

- * Gramen Typhoides molle C. B. P. 4. I. B. tom. 2. l. 18. 442. Gramen Alopecuroidi accedens, & Phalaridi, spicâ longiusculâ, folio lanuginoso I. B. tom. 2. l. 18. 474.
- * Gramen Typhoides asperum, primum C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris minus I. B. tom. 2. l. 18. 471.
- * Gramen Typhoides spicâ angustiore C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris purpurascente I. B. tom. 2. l. 18. 473. ANN.
- * Gramen Typhoides, culmo reclinato C. B. P. 4. Gramen Alopecuroides, spicâ rotundiore C. B. P. 4. Gramen Alopecuros altera Lobel. I. B. tom. 2. l. 18. 475. ANN.
- Gramen Alopecuros minor, spicâ longiore C. B. P. 4. Gramen Alopecuros, spicâ brevi I. B. tom. 2. l. 18. 474. ANN.
- * Gramen pratense tomentosum, paniculâ sparsâ C. B. P. 4. Gnaphalium Tragi, sive juncus Bombycinus I. B. tom. 2. l. 18. 514.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus, vel spicâ Secalinâ C. B. P. 5. Spartium spicatum pungens, Oceanicum I. B. tom. 2. l. 18. 511.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucronatis brevioribus C. B. P. 5. Gramen Sparteum, primum Tab. I. B. tom. 2. l. 18. 513.
- * Gramen Sparteum spicatum, latifolium C. B. P. 5. Spartum maritimum, sive Occanicum latifolium I. B. tom. 2. l. 18. 512.

- * Gramen Sparteum juncifolium C. B. T. 5.
Spartum parvum Lobel. I. B. tom. 2. l. 18.
513.
- * Gramen Sparteum minus, vel Hollandicum
C. B. P. 5. I. B. tom. 2. l. 18. 513.
- * Gramen Sparteum pennatum C. B. P. 5. Gra-
men pennatum, aliis Spartum I. B. tom. 2. l.
18. 512.
- * Gramen Sparteum variegatum C. B. P. 5. I. B.
tom. 2. l. 18. 512.
- * Gramen foliis junceis oblongis, radice albâ
C. B. P. 5.
- * Gramen foliis junceis brevibus, minus C. B. P.
5. Gramen tenue duriusculum & pene jun-
ceum I. B. tom. 2. l. 18. 463.
- * Gramen junceum polystachion C. B. P. 5. Gra-
men junceum aquaticum, majus, Tab. I. B.
tom. 2. l. 18. 543.
- * Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum
C. B. P. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab.
I. B. tom. 2. l. 18. 543.
- * Gramen junceum, folio articulato, aquaticum
C. B. P. 5. Juncus foliaceus capsulis triangu-
lis I. B. tom. 2. l. 18. 521.
- * Gramen junceum, foliis & spicâ junci C. B. P.
5. Juncus parvus cum pericarpis rotundis
I. B. tom. 2. l. 18. 522.
- * Gramen junceum, foliis, & spicâ junci, minus
C. B. P. 6. Gramen junceum marinum den-
se stipatum I. B. tom. 2. l. 18. 508.

* Gra-

- * Gramen junceum minimum maritimum
C.B.P. 6.
- * Gramen junceum spicatum seu triglochin
C.B.P. 6. Gramen triglochin *I. B. tom. 2. l.*
18. 508.
- * Gramen spicatum cum pericarpis rotundis
I. B. tom 2. l. 18. 508. Gramen spicatum
alterum C. B. P. 6.
- * Gramen Cyperoides latifolium, spicâ ruffâ
sive caule triangulo C. B. P. 6. Gramen Cy-
peroides cum paniculis nigris *I. B. tom 2. l.*
18. 494.
- * Gramen Cyperoides angustifolium, spicis
longis erectis C. B. P. 6. *I. B. tom. 2. l.* 18. 495.
- * Gramen Cyperoides spicâ pendulâ breviorē
C. B. P. 6. Graminis Cyperoidis genus, Pseu-
docyperus Lobelio, spicis vel panniculis
pendentibus ex longis pediculis *I. B. tom, 2.*
l. 18. 496
- * Gramen Cyperoides, paniculâ sparsâ, majus
C. B. P. 6. Gramen Cyperoides vulgatus
aquaticum *I. B. tom. 2. l.* 18. 495.
- * Gramen Cyperoides palustre majus, spicâ
compactâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides
palustre triquetrum, spicâ integrâ *I. B. tom.*
2. l. 18. 497.
- * Gramen Cyperoides palustre majus, spicâ di-
visâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides ex mon-
te Ballon, spicâ divulsâ *I. B. tom. 2. l.* 18.
497.

- * Gramen nigro-luteum vernum *I. B. tom. 2. l. 18. 494.* Gramen Caryophyllatæ foliis, spicâ divulsâ *C. B. P. 3:*
- * Gramen Cyperoides minus, paniculâ sparsâ subflavescente *C. B. P. 6.*
- * Gramen Cyperoides Miliaceum *C. B. P. 6.*
- * Gramen Arundinaceum, spicâ multiplici καλαμωδῶς *Diosc. C. B. P. 6.* Gramen Harundinaceum majus *Tabern. I. B. tom. 2. l. 18. 380.*
- * Gramen Arundinaceum, spicatum *C. B. P. 6.*
- * Gramen Harundinaceum minus cum spicâ *I. B. tom. 2. l. 18. 481.*
- * Gramen Arundinaceum, paniculâ molli spadicâ majus *C. B. P. 7.* Gramen plumosum Lobelii spicâ candidâ & Serici modo lucente *I. B. tom. 2. l. 18. 476.*
- * Gramen nemorosum, caliculis paleaceis *C. B. P. 7.* Gramen Matthioli junceum *I. B. tom. 2. l. 18. 510.*
- * Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus *C. B. P. 7.* Gramen rore lucidum nemorense, sive Luzulæ *I. B. tom. 2. l. 18. 492.*
- ANN.
- * Gramen hirsutum, capitulis Pysyllii *C. B. P. 7.*
- * Gramen exile hirsutum Cyperoides Lobelii *I. B. tom. 2. l. 18. 493.* ANN.
- * Gramen palustre aculeatum Germanicum, vel minus *C. B. P. 7.* Gramen palustre echinatum *I. B. tom. 2. l. 18. 497.*

* Gra-

- * Gramen dactylon maximum Americanum.
Cat. Hort. Reg. Paris. 82. Gramen dactylon Indicum esculentum, spicâ articulatâ.
Ambrosin. Phytol. 546. Sesamum perenne Indicum *Zanon. Hist. Baton.* 181.
- * Gramen dactylon folio Arundinaceo, aculeatum fortè Plinij *C. B. P.* 7. Gramen repens cum paniculis Graminis Mannæ *I. B. tom. 2. l. 18. 459.*
- * Gramen dactylon, folio latiore *C. B. P.* 8.
 Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis *C. B. P.* 8. Gramen digitatum hirsutum *I. B. tom. 2. l. 18. 445.*
- Gramen dactylon scoparium *C. B. P.* 8. Gramen scoparium, Ischæmi paniculis Gallicum *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- Gramen dactylon esculentum *C. B. P.* 8. Graminis genus Dens caninus tertius, sive graminum primum vel Galli crus *I. B. tom. 2. l. 18. 444.* Gramen Mannæ vulgo. *ANN.*
- Gramen dactylum Ægyptiacum *C. B. P.* 7. Gramen crucis, sive Neiemelm salib. *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- * Gramen Paniceum, spicâ divisâ *C. B. P.* 8. Graminis genus quibusdam, Gallis Dens caninus 2. sive Panicum sylvestre, spicâ divulsâ *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*
- * Gramen Paniceum, spicâ aristis longis armatâ *C. B. P.* 8.
- * Gramen Paniceum spicâ simplici: *Ελυμαζω-*

- 576 C. B. P. 8. *Panicum sylvestre dictum*, & *Dens caninus* I. B. tom. 2. l. 18. 443.
- * *Gramen Paniceum*, spicis nigris C. B. P. 8. *Graminis Dentis canini*, spicâ divulsâ tenuiori nigrâ, species. I. B. tom. 2. l. 18. 491.
- * *Gramen sylvaticum*, paniculâ Miliaceâ sparsâ, C. B. P. 8. *Gramen Miliaceum Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 462.
- * *Gramen Sorghi paniculâ erectâ* C. B. P. 8. *Gramen Sorghi effigie Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 467.
- Gramen latifolium*, spicâ triticeâ latiore compactâ C. B. P. 8. I. B. tom. 2. l. 18. 477.
- * *Gramen spicâ Brizæ majus* C. B. P. 9. I. B. tom. 2. l. 18. 477.
- Gramen incanum marinum spicâ Secalinâ*.
- * *Gramen Hordeaceum minus & vulgare* C. B. P. 9. *Hordeum murinum* I. B. tom. 2. l. 18. 431. ANN.
- * *Gramen Loliaceum*, spicâ longiore C. B. P. 9. *Lolium Gramineum spicatum*, caput tentans, I. B. tom. 2. l. 18. 437. ANN.
- * *Gramen Loliaceum angustiori folio & spicâ* C. B. P. 9. *Phoenix Lolio similis* I. B. tom. 2. l. 18. 436. ANN.
- * *Gramen Loliaceum Vlielandicum*. ANN.
- * *Gramen Loliaceum supinum* C. B. P. 9. *Gramen Phalaroides exile*, supinum, humi sparsum, *Danicum Lobelii* I. B. tom. 2. l. 18. 468. ANN.

* *Gramen montanum Avenaceum*, locustis rubris C. B. P. 10. *Gramen locustis rubris* I. B. tom. 2. l. 18. 434. ANN.

* *Gramen Avenaceum capillaceum*, minoribus glumis C. B. P. 10. ANN.

* *Gramen nemorale Avenaceum alterum*, ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum I. B. tom. 2. l. 18. 463. ANN.

Gramen Fuchsi seu Leucanthemon ejusque species I. B. v. *Lychnis*.

Gramen Gros Mompelgardensium I. B. v. *Festuca*.

Gramen Parnassi, albo simplici flore C. B. P. v. *Cistus humilis* in App.

* **G**RATIOLA Centauroides C. B. P. 279. *Gratiola* I. B. tom. 3. l. 30. 435. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta Moris. Hist.* 2. 479. *Gratiola caerulea*. C. B. P. v. *Scutellaria*.

* **G**RATIOLÆ affinis Americana, purpurea *Perficæ folio serrato*. *Digitalis Americana purpurea*, folio serrato Dodart. 78. *Dracocæphalon Americanum* Brein. Prodr. 34. *Pseudo digitalis Perficæ foliis* Bocc. Sic. 12. *Granata vulgò v. Malus Punica*.

* **G**ROSSULARIA simplici acino, vel spinosa sylvestris C. B. P. 455. *Uva crispa sive Grossularia* I. B. tom. 1. l. 6. 47. *Grossularia spinosa sativa*, C. B. P. 455.

Gros-

Grossularia spinosa sativa altera, foliis latioribus *C. B. P.* 455. Grossularia spinosa, fructu obscure purpurascente. *I. B. tom. 1. l. 6.* 48.

Eadem hirsuto fructu *C. B. P.* Var. 455.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarum *C. B. P.* 455. Ribes vulgaris acidus ruber *I. B. tom. 2. l. 15.* 97.

Eadem majore fructu rubro *C. B. P.* 455. Ribes flore rubente *I. B. tom. 2. l. 15.* 98.

Grossularia hortensis, fructu margaritis simili *C. B. P.* 455. Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens *I. B. tom. 2. l. 15.* 98.

Eadem majore fructu albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 83.

Eadem fructu albo, acinis rubentibus.

Grossularia vulgaris, fructu dulci *C. B. P.* 455. Ribes Alpinus dulcis *I. B. tom. 2. l. 15.* 98.

Grossularia non spinosa, fructu nigro *C. B. P.* 455. Ribes nigrum vulgò dictum, folio olente *I. B. tom. 2. l. 15.* 98.

Guajacum Patavinum. *v.* Lotus Arbor.

Guajacana *I. B.* *v.* Lotus Africana latifolia.

GUAJANA alba dulcis. Guajabo pomifera Indica *C. B. P.* 437. Guajaba *Pison. Hist.* 152. Xalxochotl, seu Pomum arenosum *Hern. Hist.* 84. Pela *Hort. Mal. tom. 3.* 31.

Pyra Indica seu Granatensis vulgò.

Eadem rubra acida.

H.

Hæmanthus Africanus. Tulipa Capensis, sive Promontorii Bonæ Spei *Bod. à Stapel.* 334. Narcissus Indicus puniceus, gemino latiori folio *Ferr. Flor. Cult.* 137. Narcissus Indicus Serpentarius *παχύφυλλος & πιλύκαρος Fab. Column. in Hern.* 885. & 899.

Halicacabum peregrinum multis I. B. v. Cor Indum.

Hedipnois Monspeffulana I. B. v. Hieracium.

Halimus latifolius sive fruticosus C. B. P. v. Atriplex.

Halimus seu Portulaca marina C. B. P. v. Atriplex.

Halimus angustifolius procumbens C. B. P. v. Atriplex.

Harmala I. B. v. Ruta.

* **H**EDERA arborea C. B. P. 305. Hedera communis major I. B. *tom.* 2. l. 15. III.

* Hedera major sterilis C. B. P. 305. Hedera communis minor I. B. *tom.* 2. l. 15. III.

Hedera Virginiana Clementis facie radice flavescente. Clementis Hederæ folio *Morif. Hort. Bles.* 255.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti 100.

Vitis Hederacea Indica *Bod. à Stapel.* 364.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. Apocynum trifolium Indicum vulgo Epimedium *Bod. à Stapel.* 364. Virgultis procumbentibus.

Ea-

Eadem virgultis erectis. An *Hederæ trifoliæ*
Canadensi affinis planta Indica: Arbor ve-
 nenata quorundam *Cat. Hort. Reg. Paris.*
 84?

* **H**EDERA terrestris vulgaris C. B. P. 306.
Chamæcissus sive *Hedera terrestris* I. B.
tom. 3. App. 853.

* Eadem minor elegantior C. B. *Var. 306.*
Hedypnois, sive Dens Leonis Fuchsi I. B. v.
Dens Leonis.

Hedysarum clypeatum, siliquâ asperâ I. B. v. O-
 nobrychis.

Hedysarum triphyllum Canadense Corn. v. O-
 nobrychis.

* **H**ELENIMUM vulgare C. B. P. 276. *Helenium,*
 sive *Enula campana* I. B. *tom. 3. l. 26. 208.*
Helenium Indicum maximum ejusque species
 C. B. P. v. *Chrysanthemum.*

Helenium Indicum tuberosum C. B. P. v. *Chry-*
santhemum.

Helenium Canadense ejusque species *Cat. Hort.*
Reg. Paris. v. Chrysanthemum.

Helianthemum ejusque species I. B. v. *Cistus*
humilis.

Helichrysum. v. Elichrysum.

HELIOTROPIMUM Americanum cœruleum,
 foliis *Hormini* *Dodart. Mem. 83. Latifo-*
lium. ANN.

Idem foliis angustioribus. *Jacua-Acanga* *Pis.*



l. 4. c. 31. p. 229. ANN.

Heliotropium majus Dioscoridi C. B. P. 253.

Heliotropium majus, flore albo l. B. tom. 3.

l. 33. 604. ANN.

Heliotropium tricocon C. B. P. 253. l. B. tom.

3. l. 33. 406. ANN.

* **H**ELLEBORINE *latifolia montana C. B. P.*
186. Helleborine Dodonæi l. B. tom. 3. l.
31. 416.

* *Helleborine angustifolia palustris, sive pra-*
tensis C. B. P. 187. Damasonium flore her-
baceo intus nonnihil candicante l. B. tom. 3.
l. 31. 517.

* *Helleborine flore carneo C. B. P. 187. Elle-*
borine flore carneo l. B. tom. 3. l. 31. 518.

* *Helleborine montana angustifolia purpura-*
scens C. B. P. 187. Damasonium purpu-
reum dilutum, sive Elleborine iv. Clusii
l. B. tom. 3. l. 31. 517.

HELLEBORINE *flore rotundo, sive Cal-*
ceolus C. B. P. 187. Damasonii species
quibusdam sive Calceolus D. Mariæ l. B.
tom. 3. l. 31. 518.

Eadem flore duplo majore C. B. P. Var. 187.

Helleborine Saniculæ folio minor C. B. P. v. A-
strantia.

HEL.

HELLEBORUS albus, flore subviridi *C. B. P.*
186. *l. B. tom. 3. l. 34. 633.*

Idem flore atro rubente *C. B. P.* 186. Ellebo-
rus albus, flore nigro *l. B. tom. 3. l. 34. 634.*

HELLEBORUS niger trifolius *Aldin.*
Hort. Farnes. 93.

Helleborus niger foetidus *C. B. P.* 185. Helle-
borus niger sylvestris adulterinus, etiam
hyeme virens *l. B. tom. 3. app. 880.*

Helleborus niger hortensis, flore viridi *C. B. P.*
185. Elleborus niger vulgaris, flore viridi
vel herbaceâ radice diuturnâ *l. B. tom. 3. l.*
34. 636.

Helleborus niger, flore roseo *C. B. P.* 186.
Elleborus niger, flore albo, interdum
etiam valde rubente *l. B. tom. 3. l. 34. 634.*
Idem minor Belgicus *Moris. Hort. Blef. 92.*

HELLEBORUS Ranunculoides hyemalis, ra-
dice tuberosâ, flore in medio folio. Aco-
nitum unifolium luteum bulbosum *C. B. P.*
183. Ranunculus cum flore in medio folio,
radice tuberosâ *l. B. tom. 3. l. 30. 414.*

Helleborus Ranunculoides, flore globoso.
Ranunculus Aconiti folio, flore globoso
C. B. P. 182. Ranunculus flore globoso, qui-
busdam Trollius flos *l. B. tom. 3. l. 30. 419.*

Helleborus Ranunculoides, flore albo multi-
plici. Ranunculus Aconiti folio, flore albo
multiplici *C. B. P.* 179.

Helleborus niger, *Saniculæ folio* C. B. P. v. A-
strantia.

Helleborus niger tenuifolius, *Bupthalmi flore*
C. B. P. v. Adonis.

Helxine cissampelos I. B. v. Convolvulus.

Hemerocallis Chalcedonica quibusdam I. B. v.
Lilium.

HEPATICA nobilis, flore simplici cœruleo.
Trifolium hepaticum flore simplici C. B. P.
330. *Morif. Hist.* 2. 433. Trifolium hepaticum
sive Trinitatis herba, flore cœruleo I. B.
tom. 2. l. 17. 389.

Eadem flore pleno. C. B. P. 330. I. B. *tom.* 2. l.
17. 390. *Morif. Hist.* 2. 433.

Eadem flore rubro simplici C. B. P. *Var.* 330.
Morif. Hist. 2. 433.

Eadem flore pleno.

Eadem flore albo simplici C. B. P. 330. *Morif.*
Hist. 2. 433. I. B. *tom.* 2. l. 17. 390.

Eadem flore carneo simplici *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 180.

Eadem flore cinereo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
108.

Hepatica stellaris I. B. v. Rubia.

Hepaticus flos quibusdam I. B. v. Cistus hu-
milis in App.

Hepatorium. v. Eupatorium.

HERBA Mimosa major frutescens spinosa
foliis angustis & pediculis non per paria
stan-

stantibus, sed in orbem collectis *Morif. Hist.*
 3. 199. An Mimosa altera spinis horridiuscula & sensitiva magis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 122? *Æschinomene* spinosa tertia, sive foliis *Acaciæ* angustioribus, siliquis parvis echinatis *Breyn. Cent.* 1. 40.

Herba Mimosa λεπτομακροκέραλον, caulibus & siliquis spinosis *Morif. Hist.* 2. 199. Mimosa spinosa di Pernambuco *Zanon. Hist. Bot.* 144.

Herba Mimosa non spinosa λεπτομακροκέραλον sive spuria de Pernambuco *Morif. Hist.* 2. 200. Mimosa spuria de Pernambuce, dicta Mimosa Italica *Zan. Hist. Bot.* 151. Mimosa Italica sive Herba viva spuria. *Ambrosin. Phyt.* 360. *Æschynomene* mitis Americana, foliis *Acaciæ* angustioribus, siliquis longis angustis, semine quadrangulari *Breyn. Cent.* 1. 48.

Herba Mimosa, non spinosa πλατυκέραλον seu βαρυπλατύλοβος de Jamaica Patavina dicta *Morif. Hist.* 2. 200. Mimosa de Jamaica dicta Patavina *Zanon. Hist. Bot.* 149.

Herba Mimosa non spinosa major Zeylanica *Breyn. v. Onobrychis.*

Herniaria glabra Morif. v. Polygonum.

Herniaria I. B. v. *Polygonum.*

Herva di Bidscho Lusitanis *Pison. v. Senna.*

HESPERIS hortensis C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 251. Hesperis flore albo I. B. *tom.* 2. l. 21. 877. Viola matronalis vulgo.

Eadem flore purpureo C. B. P. *Var.* 202. *Morif. Hist.* 2. 251. I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore vario I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore pleno albo odoratissimo *Morif. Hist.* 2. 251. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 86.

Viola matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

Eadem flore purpureo pleno odoratissimo *Morif. Hist.* 2. 251. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 86.

Eadem flore vario pleno.

Hesperis hortensis, flore viridi C. B. 202. I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. Hesperis hortensis, flore viridi seu abortivo *Morif. Hist.* 2. 251.

Hesperis montana pallida odoratissima C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 252. Hesperis colore ineleganti I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. ANN.

Hesperis peregrina, filiquis corniculatis torosis, Melancholica dicta. Hesperis peregrina, filiquis articulatis C. B. P. 202. *Morif. Hist.* 2. 252. Hesperis Syriaca I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. ANN.

* Hesperis Allium redolens *Morif. Hist.* 2. 202. Alliaria C. B. P. 110. I. B. *tom.* 2. l. 21. 883. ANN.

HIERACIUM Dentis leonis folio, flore suave rubente C. B. P. 127. ANN.

Hic

- Hieracium Dentis leonis folio monoclonon
glabrum C. B. P. 126.
- * Hieracium Dentis leonis folio, monoclonon
subasperum C. B. P. 127.
- * Hieracium Dentis leonis folio, hirsutie aspe-
rum minus laciniatum C. B. P. 127.
- * Idem magis laciniatum C. B. P. 127.
- * Hieracium Dentis leonis folio obtuso majus
C. B. P. 127. Hieracium Macrocaulon jun-
ceum, sive minus, primum Dodonæo I. B.
tom. 2. l. 24. 1031.
- Hieracium minus Dentis leonis folio oblongo
glabro C. B. P. 127. Hieracii parva species,
Hyoseris angustifolia aspera I. B. *tom. 2. l.*
24. 1032.
- * Hieracium minus, folio subrotundo C. B. P.
127. ANN.
- Hieracium maximum, Chondrillæ folio, aspe-
rum C. B. P. 127.
- * Hieracium Chondrillæ folio glabrum, radice
succisâ majus C. B. P. 127. Hieracium minus,
præmorsâ radice, sive Fuchsi I. B. *tom. 2. l. 24.*
1031.
- * Idem minus C. B. P. 127.
- * Hieracium hirsutum, foliis caulem ambi-
bus: Cichoreum pratense luteum, hirsutie
asperum C. B. P. 126. Hieracium multis,
aliis. Cichoreum luteum hirsutum I. B. *tom.*
3. l. 24. 1025. & Hieracium asperum, ma-

jori flore, in agrorum limitibus *I. B. tom. 2. l. 24. 1029.*

* Idem lævius. Cichorium pratense luteum lævius *C. B. P. 126.* Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum *I. B. tom. 2. l. 24. 1029.*

Hieracium lanatum, Sonchi seu Erigerontis facie. Sonchus villosus luteus major *C. B. P. 124.* Sonchus lanatus Dalechampii *I. B. tom. 2. l. 24. 1026.*

Hieracium incanum, lanuginosum, ramosum, Lusitanicum. An Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum *I. B. tom. 2. l. 24. 1025?*

Hieracium Intybaceum, flore magno albido *C. B. T. 128.* Chondrillæ Creticæ nomine missa, semine crispo *I. B. tom. 2. l. 24. 1013.*

Hieracium Castorei odore Monspeliensibus *Raji Catal. 161.* Hieracium foliis Cichorii sylvestris villosis, odore Castorei *Mognol. Botan. 129. ANN.*

Hieracium barbatum medio-nigrum *Cat. Hort. Reg. Paris. 87.* Majus. *ANN.*

Idem minus. Hieracium proliferum falcatum *C. B. P. 128.* Hieracium calyce barbato Columnæ Ecphr. 2, 27, *ANN.*

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti *C. B. P. 128.* Hieracium capitulis Cardui benedicti maximum, Buglossum Echioides quibusdam *I. B. tom. 2. l. 24. 1029 ANN.*
Hie-

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti majus Arabicum, folio sinuato *Hort. Edinburg. Sutherl.* 152. ANN.

Hieracium Alpinum latifolium villosum, flore magno C. B. P. 128. Hieracium Alpinum, hirsuto folio quodammodo incano Clusio *I. B. tom. 2. l. 24.* 1027.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. P. 129. Hieracium latifolium glabrum, ex valle Griesbachiana *I. B. tom. 2. l. 24.* 1033.

* Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. P. 129. Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 24.* 1033.

* Idem folio minus piloso non maculato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89. *Hort. Bles. Moris. Hist.* 2. 95. & 271.

* Idem angustiore folio.

* Hieracium murorum laciniatum minus pilosum C. B. P. 129. Pilosellæ majoris sive Pulmonariæ luteæ species magis laciniata *I. B. tom. 2. l. 24.* 1034.

Hieracium latifolium pilosum coccineum umbellatum Indicum, Pilosella Indica *Cornuti* 209.

* Hieracium fruticosum latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas altera *I. B. tom. 2. l. 24.* 1030.

* Hieracium fruticosum latifolium hirsutum
C. B. P.

C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas I. E-
rinus quibusdam Matthioli dicta I. B. tom.
2. l. 24. 1000.

* Hieracium fruticosum angustifolium majus
C. B. P. 129. Hieracium rectum rigidum,
quibusdam Sabaudum I. B. tom. 2. l. 24.
1030.

Hieracium fruticosum, angustissimo incano
folio.

Ex fibrosis candidis radicibus fruticant
singulis annis novi furculi sesquicubitales
tenuis in viridi albentes lactescentes, foliis
concoloribus longis angustis pene setaceis
ab uno ad summum usque dense stipati,
quorum fastigia in complures abeunt ramu-
los, sustinentes è calyce oblongo incano
modicè hirsuto & squamato flores luteos ex
multis petalis planis, in gyrum dispositis,
confarctos, qui marcidi faceffunt in semina
atro-rubentia, gracili pappo cristata.

Hieracium perfoliatum, flore sulphureo. Hæ-
dipnois Monspeffulana, sive Dens Leonis
Monspeffulanus I. B. tom. 2. l. 24. 1036. An
Hieracium perfoliatum singulare Creticum
Cat. Hort. Patav. Turr. 45?

Hieracium majus, folio Sonchi C. B. P. v. Son-
chus.

Hieracium majus, foliis Sonchi, semine curvo
C. B. P. v. Sonchus.

Hieracium capitulum inclinans, semine adunco
C. B. P.

HIERACIUM FRUTICOSUM, ANGUSTISSIMO IN-
CANO FOLIO.

- C.B.P. & florem inclinans* I. B. v. Calendula.
Hieracium siliquâ falcatâ C. B. P. v. Calendula.
Hieracium stellatum I. B. v. Calendula.
Hiposelinum Theophr. C. B. P. v. Smyrnum.
Hippoglossum Matth. v. Laurus Alexandrina.
Hirundinaria vulgò. v. Asclepias.

HOLOSTEUM hirsutum albicans majus C. B. P. 190. Holostium Plantagini simile I. B. tom. 3. l. 3 l. 508.

Holosteum hirsutum albicans minus C. B. P. 190. Holostium Monspeffulanum I. B. tom. 3. l. 3 l. 508.

- * Holosteo affinis, caudâ muris C. B. P. 190.
 Myosuros I. B. tom. 3. l. 31. 512. ANN.

HORDEUM polystichum hybernum C. B. P. 22. I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

Hordeum polystichum vernum C. B. P. 22.
 Hordeum hexastychum pulchrum I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

Hordeum distichon C. B. P. 23. I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

- * Hordeum nudum Cat. Hort. Edinb. Suthel. 156. ANN.

Hordeum murinum I. B. v. Gramen.

HORMINUM Æthiopicum incanum, foliis sinuosis, Æthiopis dictum. Æthiopis folio

folio sinuoso C. B. P. 241. *Æthiopis* multis
I. B. tom. 3. l. 28. 107. ANN.

Idem foliis in profundas lacinias divisis C. B.
T. 241. ANN.

Horminum Syriacum C. B. P. 238. *Gallitrichum* exoticum, flore magno albo I. B. tom.
3. l. 28. 310. ANN.

Horminum majus, amplo flore violaceo lobis
florum punctis aureis notatis *Morif. Hort.*
Blef. 272. An Horminum Indicum maxi-
mum, flore variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*
89? ANN.

Horminum sativum C. B. P. 238. Horminum
comâ purpureo-violaceâ I. B. tom. 3. l. 28.
309. ANN.

Idem comâ rubrâ I. B. tom. 3. l. 28. 309. ANN.

Idem foliis totis viridibus *Cat. Hort. Reg. Paris.*
88. ANN.

Horminum Sclarea dictum C. B. P. 238. *Galli-*
trichum sativum I. B. tom. 3. l. 28. 309.

Horminum luteum glutinosum C. B. P. 238.
Galliopsis species lutea, viscida, odorata
nemorensis I. B. tom. 3. l. 28. 304.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum
C. B. P. 238. *Gallitricho* affinis planta, *Hor-*
minum sylvestre latifolium *Clusio* I. B. tom.
3. l. 28. 14.

Horminum pratense, foliis serratis C. B. P. 238.
Gallitrichum sylvestre vulgo, sive sylve-
stris *Sclarea*, flore purpureo, cœruleove ma-
gno

320 HORTUS ACADEMICUS.

gho *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.*

Idem flore minore rubro *C. B. P. Var. 238.*

Horminum pratense, foliis serratis, floribus dilutè cœruleis omnium minimis. An Gallitrichi varietas *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Horminum folio Betonicæ *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 157.* An Horminum parvum, foliis Betonicæ, flosculis exiguis cœruleis, Hispanicum *Mentz. pugil.*

Horminum sylvestre Lavendulæ flore *C. B. P. 239.* Gallitrichis affine Maru, si non genus aliquod, Sclarea Hispanica Tabernæmontani *I. B. tom. 3. l. 28. 313.* Horminum Scutellariæ folio vulgò.

Idem folio crassiori & rugosiori,

HYACINTHUS comosus major purpureus *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.* Hyacinthus maximus Botryoides, comâ cœruleâ *I. B. tom. 2. l. 19. 574.*

Idem ruber *C. B. Var. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Idem albus Belgicus *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Hyacinthus comosus paniculâ cœruleâ *C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371.*

Hyacinthus calamistratus comâ paniculosâ brevior *Cat. Reg. Paris. 89.* Hyacinthus

co-

comosus calamistratus *Cornut. 210.* Coma ampliori.

Hyacinthus coma racemosâ strictiori. An Hyacinthus calamistratus coma racemosâ breviori *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.*

HYACINTHUS racemosus, major latifolius spetiosior, Arbuteo flore cœruleo *Morif. Hist. 2. 372.* Hyacinthus racemosus cœruleus major *C. B. P. 42.*

Idem minor *Morif. Descr. Hist. 2. 372.* Hyacinthus racemosus cœruleus minor latifolius *C. B. P. 43.* Hyacinthus Botryoides vernus: minor latifolius cœruleus inodorus *I. B. tom. 2. l. 19. 572.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.* Flore niveo aut lacteo *Morif. Descr. Hist. 2. 372.*

Hyacinthus racemosus cœruleus, minor juncifolius *C. B. P. 43.* *Morif. Hist. 2. 372.* Hyacinthus vernus Botryoides minor cœruleus, angustioribus foliis, odoratus *I. B. tom. 2 l. 19. 571.*

Idem flore exalbido *C. B. P. Var. 43.*

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.*

Hyacinthus racemosus moschatus *C. B. P. 43.*

Hyacinthus racemosus seu Botryoides major, seu Mascari majus obsoleto albo flore *Morif. Hist. 2. 372.* Hyacinthus odoratissimus, dictus Tibcadi & Muscari *I. B. tom. 2. l. 19. 578.* Dipcadi vulgò.

Idem gryseo flore obsoleto *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

Hyacinthus racemosus Moschatus luteus C. B. P. 43. Hyacinthus odoratissimus. Tibcadi luteus I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Hyacinthus luteus, præcox. C. B. P. 43. Hyacinthi Tibcadi lutei varietas, sive Muscari lutei præcox I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Hyacinthus oblongo cœruleo pendulo flore *Morif. Hist.* 2. 373. Hyacinthus oblongo flore, cœruleus major C. B. P. 43. Hyacinthus Anglicus sive Belgicus I. B. tom. 2. l. 19. 185.

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore rubro *Morif. Descr. Hist.* 2. 373.

Idem flore albo. Hyacinthus Anglicus albus *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 160.

Idem flore Amethystino C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore ex cœruleo & albo mixto.

Hyacinthus serotinus albicans, facie Orientalis C. B. P. 44.

Hyacinthus obsoleto flore æstivus. Hyacinthus obsoleto flore C. B. P. 44. Hyacinthus obsoletior Hispanicus, Anglico similis I. B. tom. 2. l. 19. 587.

Hyacinthus oblongo cœruleo flore, minor C. B. P. 44. Hyacinthus minor Hispanicus angustifolius cœruleus I. B. tom. 2. l. 19. 587.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinquè dispositis C. B. P. 44. *Morif. Hist.* 2. 373.

HYACINTHUS Orientalis, caule maculato
C. B. P. 44. *Morif. Hist.* 2. 373.

Idem flore argentei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris.* 90.

Idem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 90.

Hyacinthus Orientalis purpureus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore majore *I. B. tom.* 2. l. 19. 575.

Hyacinthus Orientalis exalbidus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis albus, primus C. B. P. 44.

Idem albore splendido *Cat. Hort. Reg. Paris.* 90.

Hyacinthus Orientalis Brumalis, flore cœruleo, foliis infernâ parte maculis purpureis notatis.

Idem flore albo. Hyacinthus Orientalis albus, alter C. B. P. 44. Hyacinthus Brumalis albus *I. B. tom.* 2. l. 19. 577.

Hyacinthus Orientalis maximus C. B. P. 44.

Hyacinthus minor *πλευάνθες I. B. tom.* 2. l. 19. 576.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Idem flore incarnato.

Idem caliculis suavè rubentibus *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Idem polyanthes, flore cinerei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Idem flore argenteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Idem flore violaceo odoratissimo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Ejusdem multiplices, quoad florum colorem, seriem, figuram, magnitudinem & odorem differentia.

Hyacinthus præcox albus *C. B. P. 45.*

Hyacinthus Orientalis latifolius *C. B. P. 54.*

Hyacinthus Orientalis, polyanthes foliis *I. B. tom. 2. l. 19. 576.*

Hyacinthus Orientalis latifolius, Polyanthes maximus, flore in cœruleo purpureo - violaceo.

Ejusdem quoad floris colorem magnitudinem & elegantiam miræ varietates, cultorum industriâ vario è satù productæ.

Hyacinthus Orientalis ramosus *C. B. P. 45.*

Hyacinthus Orientalis, caule folioso *C. B. P. 45.*

Hyacinthus Orientalis, flore duplici, seu altero alteri innato, ex colore albo & cœruleo ad pediculum parùm virescenti *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacinthus Orientalis, flore duplici *C. B. P. 46.*

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo, duplici oblongo.

Idem flore duplici cœruleo, Romanus dictus.

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo pleno *C. B. P. 45.*

Idem flore purpureo pleno.

Hyacinthus Orientalis, flore subcœruleo pleno, maximus Belgarum *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore purpureo violaceo, caliculis turgidis.
Hya-

Hyacinthus Orientalis albus, multiplici flore
C. B. P. 45.

Idem pallidè incarnatus.

Hyacinthus Orientalis roseus, Italicus dictus,
multiplici flore candidissimo.

Idem flore duplici, Capucinus dictus.

Idem flore elegantiori.

HYACINTHUS stellaris Germanicus, præ-
cox bifolius *Morif. Hist.* 2. 474. Hyacin-

thus bifolius stellaris Germanicus C. B. P. 45.

Hyacinthus stellatus vernus dumetorum,
flore cœruleo *I. B. tom.* 2. l. 29. 579.

Idem ex albido flore C. B. P. *Var.* 45. Flore albo
I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Idem flore suaviter rubente C. B. P. *Var.* 45.

Idem flore ad carneum vergente C. B. P. *Var.*
45.

Hyacinthus stellaris Germanicus præcox tri-
folius *Morif. Hist.* 2. 474. Hyacinthus stella-
ris trifolius C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus
trifolius vernus dumetorum, flore cœruleo
I. B. tom. 2. l. 19. 584.

Hyacinthus stellatus monophyllos Lusitani-
cus *Cat. Hort. Edinb. Sutheri.* 162.

Hyacinthus stellaris albus C. B. P. 46. Hyacin-
thus stellaris albicans serotinus *I. B. tom.* 2.
l. 19. 584.

Hyacinthus stellaris spicatus seu fastigiatus,
latâ depressâ spicâ *Morif. Hist.* 2. 474. Hya-

cinthus stellaris spicatus cinereus C. B. P. 46.

Hyacinthus stellatus multiflorus, cineracei coloris I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris, caulibus pluribus ex eodem bulbo ortis, singulis pluribus floribus oneratis *Morif. Hist.* 2. 474. Hyacinthus stellaris cœruleus amœnus C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus Bizantinus alter, elegantissimus serotinus bullatus I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris Byzantinus, Borraginis flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Hyacinthus stellaris obsoletè cœruleus, vel major C. B. P. 46.

Hyacinthus stellaris æstivus cœruleo-purpurascens, major C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus æstivus I. B. tom. 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris autumnalis major *Morif. Hist.* 2. 474. C. B. P. 46. Hyacinthus autumnalis major I. B. tom. 2. l. 19. 574.

Idem minor C. B. P. 47. *Morif. Hist.* 2. *Descr.* 375.

Hyacinthus stellatus Peruvianus multiflorus, floribus cœruleis, in rotundum metam fastigiatus *Morif. Hist.* 2. 375. Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus C. B. P. 47. Hyacinthus Peruvianus I. B. tom. 2. l. 19. 585.

Idem flore albicante *Cat. Hort. Reg. Paris.* 92.

Floribus niveis, visu per amœnis *Morif. Hist.* 2. *desc.* 375.

HYACINTHUS Eriophorus Orientalis *Morif. Hist.* 375. Bulbus Eriophorus orientalis

C. B. P.

C. B. P. 47. I. B. tom. 2. l. 19. 585.

Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lilii C. B. P. 46. Moris. Hist. 2. 375. Hyacinthus Lilifolius stellatus I. B. tom. 2. l. 19. 489. Floribus cœruleis.

Idē flore niveo Mor. Hist. 2. 376. C. B. P. Var. 46.

HYACINTHUS Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis C. B. P. 47. Hyacinthus Indicus, tuberosâ radice Mor. Hist. 2. l. 376. I. B. tom. 2. l. 19. 588.

Hyacintho affinis Africana, tuberosâ radice, umbellata cœrulea inodora.

Hydropiper I. B. v. *Perficaria urens*.

HYDROPHYLLON Morini *Jonqu. Hort.* 43. Dentariæ affinis, Echii flore, capsulâ rotundâ Moris. Hort. Bles. 259. Dentariæ affinis Echii flore, capsulâ Anagallidis *Dod. Mem.* 77. Echio affinis, Dentariæ foliis *vulgò*

* **H**YOSCYAMUS vulgaris vel niger C. B. P. 169 Moris. Hist. 2. 494 I. B. tom. 3. l. 34. 627.

Hyoscyamus albus major vel 3. Diosc. & 4. Plinii C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. Hyoscyamus albus I. B. tom. 3. l. 34. 627.

Hyoscyamus albus minor C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628.

Hyoscyamus Creticus luteus major C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628. desc.

Hyosiris angustifolia aspera I. B. v. *Hieracium*.

HYPECOUM siliquis erectis articulatis incurvis Mor. Hist. 2. 579. Hypecoum C. B. P. 172.

Hypocoum filiquosum I. B. tom. 2. l. 21. 899.

- * **H**YPERICUM vulgare C. B. P. 179 *Mor. Hist.* 2. 469. *Hypericum vulgare*, sive *Perforata* caule rotundo, foliis glabris I. B. tom. 3. l. 29. 381.

- * *Hypericum minus supinum*, vel *supinum glabrum* C. B. P. 279. *Morif. Hist.* 2. 569. *Hypericum minimum supinum* I. B. tom. 3. l. 29. 384.

Hypericum seu *Coris legitima* *Ericæ* similis *Morif. Hist.* 2. 469. *Coris lutea* C. B. 280. *Hypericoides* *Coris* quorundam, & *Coris Cretica* I. B. tom. 3. l. 29. 384.

Hypericum supinum tomentosum majus, vel *Hispanicum* C. B. P. 279. *Morif. Hist.* 2. 470.

Hypericum supinum tomentosum minus, vel *Monspeliacum* C. B. P. 279. *Hypericum tomentosum* I. B. tom. 3. l. 29. 384.

- * *Hypericum* seu *Androsæmum perfoliatum* & *perforatum* C. B. P. 280. *Morif. Hist.* 2. 470.

Hypericum minus glabrum erectum pulchrum *Morif. Hist.* 2. 470. *Hypericum minus erectum* C. B. P. 179. *Hypericum pulchrum* *Tragi* I. B. tom. 3. l. 29. 383.

Hypericum seu *Androsæmum foetidum*, capitulis longissimis filamentis donatis C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 471. *Ruta Hypericoides*, quibusdam *Sicilianæ* affinis, sive *Tragium* I. B. tom. 3. l. 29. 384.

- * *Hypericum* seu *Androsæmum bifolium glabrum*

brum perfoliatum, non perforatum *Morif. Hist.* 2. 471. Ascyrum sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum *C. B. P.* 280. Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato *I. B. tom.* 3. l. 29. 383.

* Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum, caule quadrangulo glabro *Morif. Hist.* 2. 471. Androsæmum hirsutum *C. B. P.* 280. Hypericum Ascyrum dictum caule quadrangulo *I. B. tom.* 3. l. 29. 132.

Hypericum seu Androsæmum Ascyrum dictum, caule rotundo hirsuto *Morif. Hist.* 2. 471. Hypericum Androsæmum dictum *I. B. tom.* 3. l. 29. 382.

* Hypericum seu Androsæmum maximum (quasi frutescens) bacciferum *Morif. Hist.* 2. 472. Androsæmum maximum frutescens *C. B. P.* 280. Siciliana, aliis Ciciliana vel Androsæmon *I. B. tom.* 3. l. 29. 385.

Hypericum seu Androsæmum flore & thecâ quinquecapsulari omnium maximis *Morif. Hist.* 2. 472. Ascyrum magno flore *C. B. P.* 280.

Hypericum frutescens Americanum fl. albo.
v. Pruno affinis.

HYSSOPUS Officinarum cœrulea sive spicata *C. B. P.* 217. Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius, flore cœruleo *I. B. tom.* 3. l. 28. 274.

Idem flore rubro C. B. P. 217. I. B. tom. 3. l. 28. 274.

Idem flore purpureo I. B. tom. 3. l. 28. 274.

Idem flore albo. Hyssopus vulgaris alba
C. B. P. 218

Hyssopus Anglica C. B. P. 218. ab unâ parte lutea alterâ viridis.

Hyssopus hirsuta C. B. P. 219.



Hyssopus umbellata C. B. P. 219.

Hyssopus angustifolia spicata C. B. P. 219.

Hyssopus Austriacus, magno flore, foliis Chamæpitydis. Chamæpitys cœrulea Austriaca
C. B. P. 250.

Hyssopifolia C. B. P. v. *Lyfimachia*.

I.

*  ACÆA nigra pratensis, latifolia C. B. P. 271. Jacæa nigra pratensis vulgaris & squammosa I. B. tom. 3. l. 25. 27.
*  Eadem flore albo C. B. P. 271.

Jacæa nigra, squammoso capite, major C. B. P. 271. Jacæa montana squammosa major, semine nigro I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa latifolia, capite hirsuto C. B. P. 271. Jacæa cum squamis pennatis, sive capite villoso, elatior I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa Lusitanica semper virens *Morif. Hort. Blef.* 276. Jacæa elatior Lusitanica semper virens *Boccon. Ic. & Desc.* 72. Jacæa Lu-
virens

fitanica maxima, semper virens *Dod. Mem.*
85.

Jacæa integri folia humilis C. B. P. 271.

* *Jacæa nigra laciniata C. B. P. 271. Centaurium*
Collinum Gesneri, flore purpureo l. B. tom.
3. l. 25. 32.

* *Eadem flore albo.*

Jacæa incana, Cyani folio, fibris in capite nigris.

Jacæa humilis alba, Hieracii folio C. B. P. 271.

Jacæa Monspeffulana, cui in squammis fi-
bræ nigre, interdum acaulis l. B. tom. 3. l. 25.

29. Flore purpureo.

Jacæa latissimo laciniato folio C. B. P. 272.

Jacæa Arborea argentea Ragulina Zan. Hist.
Bonon. 107. Floribus luteis.

Jacæa montana candidissima, Stoces foliis
C. B. P. 272. Floribus purpureis, foliis an-
gustioribus.

Eadem foliis latioribus,

Jacæa montana incana, capite Pini C. B. P. 272.

Jacæa montana, capite magno strobili l. B.
tom. 3. l. 25. 30.

Jacæa capite longis aculeis spinoso C. B. P. 272.

Eadem capite brevioribus aculeis spinoso.

Jacæa spinosa Cretica Zanon. Hist. Ba-
tan. 105.

Jacæa laciniato Sonchi folio, sive Jacæa lati-
folia purpurea, capitulo spinoso C. B. P.
272.

Ja-

Jacea Sphærocephala spinosa Tingitana Cat. Hort. Edinb. Suntherl. 167.

Planta est *Jaceæ spinosæ Creticæ Zanon.* persimilis; Ast omnibus partibus major & amplior, raraque hirsutie pubescens; Radice rectâ crassâ albidâ ventriosâ aliquando brachiatâ; Caulibus cubitalibus neutiquam alatis; Foliis in profundiores lacinias rigidasquæ crenas divisiss, formâ ad *Sonchi* folia accedentibus; Capitulis Sphæricæ rotunditatis, quorum spinosis squamis interjacet subalbidum tomentum, telis aranearum simile. Floribus purpureis magis expansis; Seminibus cinereis, congenerum more barbâ cristatis. Collegi ex Horto Dni Petri de Wolff Plantarum rariorum cultoris eximii, qui ex seminibus, *Tingide* acceptis, educaverat.

Jacea lutea capite spinoso C. B. P. 272. Majori *Centaureum Collinum*, sive *Jacæa spinosa* flore luteo *I. B. tom. 3. l. 25. 34. ANN.*

Jacea lutea, capite spinoso minori. *Carduus stellatus luteus*, foliis *Cyani C. B. 387.* *Spina solstitialis I. B. tom. 3. l. 25. 90. ANN.*

Jacea Sricula Erucæ folio lutea echinata Dod. Mem. 87. ANN.

Jacea Melitensis capitulis conglobatis Bocc. Ic. & Desc. 65. Spinis erectis longioribus. *ANN.*

Eadem spinis recurvis brevioribus. *ANN.*

Jacea lutea spinosa Centauroides C. B. P. 272.

Ja-

JACEA SPHOEROCÆPHALA SPINOSA TINGI-
TANA SUTHERL.



Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus.

Levi tomento in viridi canescit tota hæc Planta, attollens ex radice crassâ brachiata caules plures, sesquicubitum excedentes, angulosos, lignosos, duros, valde ramosos; Folia radici proxima conspiciuntur palmam lata, spithamum longa, modo per ambitum leviter crenata, modo profundis aliquot incisuris præcipuè versus pediculum dissecta; superiora verò minora & omnino integra, suaquè basi caulem amplectentia. Singuli rami sustinent capitulum ex squamis hispidis in brevissimas aliquot flavescences cuspides desinentibus compactum, cui insident flores vulgari similes, exteriores rubentes, interiores flavescences, sequentibus seminibus cæteris hujus tribus similibus. Hanc ex Cretâ delatam nobis concessit Dnus Jacobus Zandoni, Vir, dum viveret, in naturalium scientia pertissimus.

Jacea Cyanoides, echinato capite C. B. P. 272.
Flore purpurascens.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 272.

JACEÆ & Serratulæ affinis, capitulis Bacharidis, foliis Trachelii, Zeylanica Breyn.
Prodr. 39.

Jacea Oleæ folio ejusquè species C. B. P. v. Xeranthemum.

JACEA INCANA CRETICA . FLORE LYTEO MEDIO PURPUREO, SQVAMIS IN MOLLIORES SPINAS ABEVNTIBVS.



Jacea tricolor ejusquè species I. B. v. Viola.

JACOBÆA maritima C. B. P. 131. Jacobæa marina sive Cineraria I. B. tom. 3. l. 24. 1056.

* Jacobæa vulgaris laciniata C. B. P. 131. Jacobæa vulgaris I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

Eadem foliis, *Quercus tenuifoliæ* instar, divisis C. B. P. Var. 131.

Jacobæa Alpina, laciniato flore Bupthalmi C. B. P. 131. Jacobæa Pannonica latifolia I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis *Raji Catal.* 170.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia, non laciniata C. B. P. 131. Jacobæa Pannonica, folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 24. 1056.

JASMINUM flavum odoratum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 94. *Moris. Hort. Bles.* 133. Gelseminum Indicum flavum odoratissimum *Ferrar. Flor. Cultur.* 393.

Jasminum humilius luteum C. B. P. 397. Jasminum luteum I. B. tom. 2. l. 15. 102.

Jasminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. P. 398. Trifolium fruticans quibusdam Polemonium flore luteo I. B. tom. 3. l. 11. 575.

Jasminum Virginianum *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 169.

Jasmi-

Jasminum vulgatus, flore albo C. B. P. 397.

Jasminum sive *Jelsemium* flore albo I. B. tom. 3. l. 15. 101.

Jasminum humilius, magno flore C. B. P. 398.

Jasminum Hispanicum, flore majore exterrè rubente I. B. tom. 2. l. 15. 101.

Jasminum Arabicum Clus. v. *Syringha*.

Jasminum Indicum, flore phæniceo Ferrar. v. *Clematis*.

Jasminum Millefolii folio I. B. v. *Convolvulus*.

Jasminum Persicum Cat. Hort. Edinb. Sutherl. v. *Syringha*.

Jasminum Mexicanum I. B. v. *Mirabilis Peruviana*.

IBERIS latiore folio serrato Moris. Hist. 2. 311.

Iberis latiore folio C. B. P. 97. *Iberis* I. B. tom. 2. l. 22. 918.

Iberis humilior annua Virginiana ramosior. Moris. Hist. 2. 311. ANN.

Iberis Nasturtii folio C. B. P. 97. Moris. Hist. 2. 311.

Iberis Fuchsii I. B. v. *Nasturtium*.

Iberidi Fuchsii adfinis I. B. v. *Nasturtium*.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato C. B. P. v. *Aquifolium*.

ILEX oblongo serrato folio C. B. P. 423. *Ilex arborea* I. B. tom. 1. l. 7. 95.

Ilex folio rotundiorè molli modiceque sinuata.

nuato, sive Smilax Theophrasti C. B. P. 425.
 Ilex aculeata Cocci glandifera C. B. P. 425. Ilex
 coccigera I. B. tom. 1. l. 7. 106.

IMPERATORIA major C. B. P. 56. Impera-
 toria I. B. tom. 1. l. 7. 106.

Imperatoriae affinis umbellifera maritima Sco-
 tica Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 366.

Indigo Indica Morisf. v. Colutea.

INTYBUS sativa latifolia, sive Endivia vulgaris
 C. B. P. 125. Intybum sativum latifolium I. B.
 tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

Intybus sativa angustifolia C. B. P. 125. Inty-
 bum sativum angustifolium I. B. tom. 2. l.
 24. 1011. ANN.

Intybus crispa C. B. P. 125. Intybum sativum
 crispum I. B. tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

IRIS tuberosa, folio anguloso, flore obscure
 viridi colore Morisf. Hist. 2. 348. Iris tubero-
 sa, folio anguloso C. B. P. 40. Iris tuberosa
 Belgarum I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris agria foetida vel Xyris Morisf. Hist. 2. 349.

Gladiolus foetidus C. B. P. 30. Spatula fœ-
 tida, plerisque Xiris I. B. tom. 2. l. 19. 731.

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris C. B. P.
 30. Morisf. Hist. 2. 350. Iris vulgaris violacea,
 sive purpurea sylvestris I. B. tom. 2. l. 19. 709.

Iris hortensis latifolia C. B. P. 31. Iris vulgaris

- violacea, sive purpurea hortensis *I. B. tom.*
 2. l. 19. 709.
 Iris hortensis pallidè cœrulea *C. B. P. 31.*
 Iris hortensis alba Germanica *C. B. P. 31.* Iris
 flore albo *I. B. tom. 2. l. 19. 719.*
 Iris alba Florentina *C. B. P. 31. Morif. Hist. 2.*
 351. Iris flore albo *I. B. tom. 2. l. 19. 719.*
 Iris Susiana, flore maximo ex albo nigricante
C. B. P. 31. Morif. Hist. 2. 351. Iris latifolia
 major Susiana, vel Chalcedonica, flore ma-
 jore variegato, Clusio prima *I. B. tom. 2. l.*
 19. 721.
 Iris Asiatica cœrulea polyanthos *C. B. P. 31.*
 Iris Asiatica cœrulea sive 2. Clusii *Morif. Hist.*
 2. 352. Iris Asiatica cœrulea omnium Iri-
 dum amplissima, Dalmaticæ affinis *I. B. tom.*
 2. l. 19. 716.
 Iris Dalmatica major *C. B. P. 30.* Iris Dalmati-
 ca major, flore vulgari minus violaceo *I. B.*
tom. 2. l. 19. 715.
 Iris latifolia Germanica ochroleucos *C. B. P. 31.*
 Iris major latifolia ochroleucos Clus. *I. B.*
tom. 2. l. 19. 721.
 Eadem labris dilutè purpureis, bifidis & ere-
 ctis obsoletè flavescentibus.
 Iris latifolia gloriosa Belgarum, labris candi-
 dis, oris purpurascentibus, petalis erectis
 violaceis.
 Iris latifolia Pannonica, colore multiplici
C. B. P. 31.

- Iris latifolia* Belgica, odore Sambucci C. B. P. 32.
Iris Lusitanica verna violacea & Clusio major latifolia nona, cum venis purpureis I. B. tom. 2. l. 19. 717.
Iris biflora, flore minore, odore Lillii convallium C. B. P. 32. *Iris biflora Lusitanica*, flore violaceo Clusio 22. I. B. tom. 2. l. 19. 722.
* *Iris palustris* lutea, sive *Acorus adulterinus* I. B. tom. 2. l. 17. 732. *Morif. Hist.* 2. 353.
Acorus adulterinus C. B. P. 34. Foliis longioribus viridibus.
* *Eadem* foliis glaucis brevioribus.
Iris lutea fativa C. B. P. 32. *Iris lutea*, foliis florum repandis variegatis I. B. tom. 2. l. 19. 721.
Iris lutea variegata Lobelii C. B. P. 32.
Iris media, longissimis foliis, lutea C. B. P. 32.
Iris Tripolitana, foliis longissimis, flore aureo I. B. tom. 2. l. 19. 730.
Iris tuberosa pratenfis angustifolia, folio foetido *Morif. Hist.* 2. 353. C. B. P. 32.
Iris tuberosa pratenfis angustifolia non foetida altior *Morif. Hist.* 2. 254. C. B. P. 32. *Iris tenuifolia* major flore cœruleo & striato, angustifolia 2. I. B. tom. 2. l. 19. 727.
Iris angustifolia Prunum redolens major C. B. P. 33.
Iris angustifolia hortensis versicolor C. B. P. 33.
Iris angustifolia, flore violaceo, reflexis foliis lacteis, & purpureis venis variis Clusio 5. I. B.

5. *I. B. tom. 2. l. 19. 731.* Iris humilis, seu Chamæiris variegata *C. B. P.*

32. Iris humilis, seu Chamæiris, flore saturo-vio-
laceo *C. B. P. 32.*

Iris humilis, seu Chamæiris minor, flore pur-
pureo *C. B. P. 33. Morif. Hist. 2. 354.* Iris
humilis latifolia minor *I. B. tom. 2. l. 725.*

Eadem flore atro-purpureo.

Eadem flore variè picto *C. B. P. 33.* Iris humi-
lis latifolia minor elegantissimè variè picta,
Clusio Chamæiris 7. *I. B. tom. 2. l. 19. 725.*

Eadem flore purpureo flavescente *C. B. P. 33.*
Iris humilis latifolia minor, flore vario,
ejus foliis valde incurvis: Clusio Chamæi-
ris 8. *I. B. tom. 2. l. 19. 725.*

Eadem flore pallido & albo *C. B. P. 33.*

Eadem flore ochroleuco.

Ejusdem variæ species, floris colore inter se di-
screta.

Iris humilis seu Chamæiris angustifolia Gra-
minea. Chamæiris Tab. *Morif. Hist. 2. 355.*

Iris angustifolia, Prunum redolens minor
C. B. P. 33. Iris Graminea, cui quotannis
pereunt folia. *I. B. tom. 2. l. 19. 727.*

Iris bulbosa latifolia præcox, acaulos odora
Morif. Hist. 2. 357. C. B. P. 38. Iris bulbosa
latifolia, flore cœruleo *I. B. tom. 2. l. 19. 703.*

Eadem flore lactei coloris *C. B. P. Var. 38.* Iris

bulbosa latifolia; flore candido *J. B. tom. 2. l. 19. 703.*

Iris bulbosa præcox minus odora, Persica variegata *Morif. Hist. 2. 357.* Iris Persica variegata præcox *Ferr. Flor. Cult. 152.* Iris Persica bulbosa variegata præcox *Dodon. Mem. 83.*

Iris bulbosa latifolia serotina, caule donata *Morif. Hist. 2. 357. C. B. P. 38.*

Iris bulbosa latifolia candida *C. B. P. 38.*

Eadem Porcellana dicta.

Iris bulbosa major, flore cœruleo, variegata, sive Chamoletta *Joh. Rea. Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 174.*

Eadem flore Lavendulaceo. Chamoletta Lavendulacea *Belgarum.*

Eadem flore purpureo versicolor *Joh. Rea. Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 174.* Chamoletta purpurea *Belgarum.*

Iris bulbosa latifolia Hispanica, caule instar Serpentariæ maculato *Cat. Hort. Reg. Paris. 96.* Serpentina Americana *Belgarum*, vulgò

Iris bulbosa angustifolia tricolor *C. B. P. 38. Morif. Desc. Hist. 2. 358.*

Eadem foliis albis, ligulâ luteâ, velis sub cœruleis *Cat. Hort. Reg. Paris. 96.*

Iris bulbosa angustifolia, foliis repandis ex luteo virescentibus, velis obsoletè xerampelinis *Cat. Hort. Reg. Paris. 96.*

Iris

Iris bulbosa angustifolia, labris virescentibus, maculâ aureâ, bifidis pallidè cœruleis, erectis, saturatè cœruleis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*

Iris bulbosa cœruleo-violacea C. B. P. 40.

Iris bulbosa angustifolia alba C. B. P. 40.

Iris bulbosa alba, oris cœruleis Swertii.

Iris Bulbosa lutea inodora major C. B. P. 39.

Morif. Hist. 2. 358. *Iris bulbosa lutea* I. B. tom. 2. l. 19. 705.

Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior C. B. P. 39. *Morif. Hist.* 2. 358. *Iris bulbosa versicolor flavo-varia*, prima Clusio I. B. tom. 2. l. 19. 706.

Iris bulbosa angustifolia tota aurea *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 175.

Iris bulbosa angustifolia, labris luteis, maculâ aureâ bifidis & erectis pallidè cœruleis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 175.

Iris bulbosa tricolor surrecta major, multiplici flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Iris bulbosa angustifolia, pleno flore cœruleo Batavorum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Iridum Bulbosarum vario è satu educatarum varietates plures, versicolore in floribus picturâ mirificè lascivientes.

Iris Uvaria *Prom. Bonæ Spei Stap. v. Apocynum.*

ISATIS fativa vel latifolia C. B. P. 113. *Morif. Hist.* 2. 286. Isatis, sive Glaſtum fativum I. B. tom. 2. l. 21. 909.

Isatis sylvestris vel angustifolia C. B. P. 113. Isatis sylvestris *Morif. Hist.* 2. 286. Isatis, sive Glaſtum ſpontaneum I. B. tom. 2. l. 21. 909. *Isatis Indica, foliis Rorismarini, Glaſto affinis* C. P. B. v. Colutea.

Iſchæmum vulgò. v. Gramen daſtylum.

Iva moſchata Monſpeliensium I. B. v. Chamæpitys.

JUJUBÆ majores oblongæ C. B. P. 446. Zizipha fativa I. B. tom. 1. l. 6. 40.

* **J**UNCUS acutus maritimus, capitulis rotundis C. B. P. 11.

Juncus acutus, paniculâ ſparsâ C. B. P. 11. Juncus foliaceus I. B. tom. 2. l. 18. 228.

* Juncus maximus, ſive Scirpus major C. B. P. 12. Juncus maximus holoschænos I. B. tom. 2. l. 18. 525.

* Juncus ſive Scirpus medius C. B. P. 12.

* Juncus lævis, paniculâ ſparsâ major C. B. P. 12. Juncus paniculâ arundinaceâ I. B. tom. 2. l. 18. 520.

* Juncus lævis paniculâ non ſparsâ C. B. P. 12. Juncus Matthioli I. B. tom. 2. l. 18. 520.

* Juncus capitulis Equiſeti major C. B. P. 12. Juncus capitulis longis, ſive clavatus I. B. tom.

tom. 2. l. 18. 525.

Juncellus capitulis Equiseti minor & fluitans
C. B. P. 12. I. B. tom. 2. l. 18. 525.

Juncus Bombycinus I. B. v. Gramen.

JUNCUS floridus major C. B. P. *Juncus flori-*
dus I. B. *tom. 2. l. 18. 525.*

JUNIPERUS vulgaris fruticosa C. B. C. 488.
Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis
I. B. tom. 2. l. 9. 293.

Juniperus minor montana, folio latiore fru-
ctuquè angustiore C. B. P. *Juniperus Alpina*
I. B. tom. 1. l. 9. 301.

Juniperus major, baccâ rufescente C. B. P. 489.
Cedrus Phœnicea Bellonio, sive *Oxyce-*
drus, quibusdam Juniperus major baccâ ru-
brâ I. B. *tom. 1. l. 9. 297.*

Juniperus foliis Cupressi major, fructu flave-
scente. Cedrus foliis Cupressi major, fru-
ctu flavescente C. B. P. 487. *Cedrus Lycia,*
retusa Bellonio dicta I. B. *tom. 1. l. 9. 300.*

Juniperus Bormudiana.

In metam fastigiatam suâ sponte excre-
 scit hæc arbor junipero vulgari tam facie
 quàm virtutibus similis; Est verò foliis an-
 gustioribus tenuioribus in rigidas & leviter
 pungentes cuspides desinentibus, densò ele-

gantiquè ordine ramulos ambientibus, superne glaucis, inferne hilari perpetuo virore nitentibus; Flores fert exiles amentaceos purpuro-croceos; Baccas rotundas Avellanæ magnitudine, ex fusco phœniceas squamatis aliquot tuberculis obsitas, in quibus tres quatuorvè angulosi arilli, ritu congenerum, continentur. Excrevit in Angliâ feminibus ex Bormudos Insulâ delatis. In Belgia feliciter propagatur per submersionem, circumpositionem vel ramulos avulsos, & terræ infixos.

Juniperus Virginiana.

Eandem requirit culturam, quam Bormudiana, cui & formâ & crescendi modo respondet; Ast folia edit angustiora molliora & omnino viridia. Hanc acceptam referimus munificentiae maximè Reverendi Episcopi Londinensis, stirpium rariorum æstimatoris incomparabilis, cui ob insignia hortensia munera in nos collata multum debemus.

Juniperus ex Goa.

Hujus propaginem hoc ipso mense transmisit ad nos ex Angliâ Dnus Watsius nomine, Cedri ex Goa. Ramis est magis expansis gracilibus foliis glaucis, tenuissimis & brevissimis. Cœteroquin superiori videtur similis.

LUGDUNO-BATAVUS. 347

JUNIPERUS BORMUDIANA.



K.

KALI majus, cochleato semine
C. B. P. 289. *Morif. Hist.* 2. 609. Ca-
 li vulgare *I. B. tom.* 3. 35. 705.
 ANN.

Kali minus album, semine splendente *C. B. P.*
 289. *Morif. Hist.* 2. 607. Cali minus, sive
 Sedum minus arborescens vermiculatum
I. B. tom. 3. l. 35. 705. ANN.

* Kali geniculatum majus *C. B. P.* 289. *Morif. Hist.*
 2. 611. Cali geniculatum, sive Salicornia
I. B. tom. 3. l. 35. 704. ANN.

Kali fruticosum minus, flore minore *Morif.*
Hist. 2. 611. Sedum minus fruticosum *C. B.*
P. 284. Sedum minimum arborescens ver-
 miculatum, flore luteo *I. B. tom.* 3. l. 35. 695.

* Kali species, sive Vermicularis marina arbo-
 rescens *I. B. tom.* 3. l. 35. 705.

* Kali spinoso affinis *C. B. P.* 289. Kali affinis
 spinosa Planta *Morif. Hist.* 2. 611. Tragus
 spinosus Matthioli, sive Kali spinosum *I. B.*
tom. 3. l. 35. 706. Anthyllis Chamæpityi-
 des frutescens *C. B. P.* 282.

Kali Crassulæ minoris folio C. B. P. & Morif.
v. Ficoides.

Kapamava Hort Mal. v. Anacardium.

Katmer Bouhour Turcarum Corn. v. Cyclamen.

Ketmia

Ketmia Syrorum Moris. & I. B. v. Althæa;
Knawel Tragi Moris. v. Polygonum.

L.

L *ablav Alpini. v. Phascolus.*
Labrum Veneris I. B. v. Dipfacus.
Luburnum I. B. v. Anagyris.
Laburnum Zeylanicum. v. Cro-
talaria.

Lachryma Jobi multis, sive Milium Arundina-
ceum I. B. v. Milium.

L ACTUCA *fativa C. B. P. 122. Lactuca fativa*
vulgaris non capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997.
 ANN.

Lactuca foliis Endiviæ C. B. 122. ANN.

Lactuca maculosa C. B. P. 123. Lactuca rubra
I. B. tom. 2. l. 24. 998. ANN.

Lactuca folio obscurius virente semine nigro
C. B. P. 123. Lactuca Romana longa dulcis
I. B. tom. 2. l. 24. 998.

Lactuca Italica laciniata C. B. P. 123. ANN.

Lactuca capitata C. B. P. 123. Lactuca fativa
vulgaris capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997. ANN.

Lactuca fativa maxima Austriaca capitata va-
riegata Lactuca Caryophyllacea vulgò.
 ANN.

Refert variegato colore Caryophyllum
 hortensem.

Lactuca crispa C. B. P. 123. Lactuca crispa &
tenuiter dissecta I. B. tom. 2. l. 24. 999. ANN.
 Lactuca

Lactuca crispa altera C. B. P. 123. *Lactuca crispa laciniata* I. B. tom. 2. l. 24. 999. ANN.

* *Lactuca sylvestris*, costâ spinosâ C. B. P. 123. *Lactuca sylvestris*, sive *Endivia* multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso I. B. tom. 2. l. 24. 1003. ANN.

Lactuca sylvestris, odore viroso C. B. P. 123. *Lactuca sylvestris*, lato folio, succo viroso I. B. tom. 2. l. 24. 1002. ANN.

Lactuca montana purpureo-cœrulea C. B. P. v. *Sonchus*.

Ladanum segetum, flore rubro quorundam I. B. v. *Sideritis*.

Lagopus ejusquè species I. B. v. *Trifolium*.

LAM IUM Arboreum perenne Canadense
Zan. Hist. Botan. 112.

* *Lamium purpureum foetidum*, folio subrotundo, sive *Galeopsis* Dioscoridi C. B. P. 230. *Galeopsis* sive *Urtica iners*, flore purpurascente majore, folio non maculato I. B. tom. 3. l. 28. 321. ANN.

* *Idem minus*. ANN.

* *Lamium album non foetens*, folio oblongo C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *Urtica iners*, floribus albis I. B. tom. 3. l. 28. 324.

* *Idem minus* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 99.

Lamium folio oblongo luteum C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *Urtica iners*, flore luteo I. B. tom. 3. l. 28. 325.

Idem

Idem maculis albis respersum. An Lamium luteum folis maculatis *Sutherl. Cat. Edinb.* 181.

Lamium albâ lineâ notatum *C.B.P.* 231. Galeopsis folio maculato *I. B. tom.* 3. l. 28. 324.

* Lamium foliis caulem ambientibus, majus *C.B.P.* 231. Galeopsis, sive Urtica iners minor, folio caulem ambiente *I. B. app. tom.* 3. 853, ANN.

* Lamium folio caulem ambiente minus *C.B.P.* 231. ANN.

Lamium maximum sylvaticum foetidum *C.B.P.* 231. Galeopsis, sive Urtica iners magna foetidissima *I. B. App. tom.* 3. 853.

Lamium maximum sylvaticum alterum *C.B.P.* 223. Galeopsis maxima, flore magno rubro *I. B. tom.* 3. *App.* 853.

Idem folio variegato.

* Lamium paludosum Belgicum, Melissæ folio. ANN.

Exilem albicantem fibrosam gerit radicem, cauliculum palmarem aliquando longiorem, quadrangulum, geniculatum, subhirsutum, in ramos divisum, quorum geniculis adstant folia ex longioribus petiolis binâ ex adverso, Melissæ foliis paria, sed graciliora, Summitates ambiunt verticillatâ serie flosculi exigui, pallide purpurascens, galeâ angustiori minori & integrâ, labello majori latiori & trilobato. Hos excipiunt semina

mina fusca quaterna in utriculis foliaceis quinquifidis. Sponte suâ luxuriat in paludosis Belgia, fœtido & gravi odore ad congeneres species accedens.

Lamium montanum Melissæ folio C. B. P. v. Melissa.

Lamium Astragalodes Corn. V. Scutellaria.

Lamium peregrinum C. B. P. Scutellaria.

Lanigera arbor peregrina l. B. v. Gossampinus.

Lantana l. B. v. Viburnum.

L APATHUM præstantissimum, Rhabarbarum Officinarum dictum *Morif. Hist.* 2: 677. Rhabarbarum Officinarum C. B. P. 116. Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum Dioscoridis C. B. P. 116. Rhabarbarum l. B. tom. 2. l. 23. 989. Rhaponticum l. B. l. 23. 984. Rha & Rhaponticum l. B. App. tom. 2. 1069.

Lapathum Alpinum, folio subrotundo *Morif. Hist.* 2. 578. Lapathum hortense rotundifolium, sive montanum C. P. B. 115. Lapathum folio rotundo Alpinum l. B. tom. 2. l. 23. 987.

Lapathum hortense latifolium C. P. B. 115. Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum l. B. tom. 2. l. 23. 985.

* Lapathum folio acuto plano C. B. P. 115. Lapathum acutum. *Morif. Hist.* 2. 578. Lapathum acutum, sive Oxylapathum l. B. tom. 2 l. 23. 983.

* Lapathum folio minùs acuto C. B. P. 125. Lapathum

LAMIUM MELISSÆ FOLIO, PALUDOSUM BELGICUM.

pathum vulgare, folio obtuso *I. B. tom. 2. l. 23. 984.*

Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis *C. B. P. 114. Morisf. Hist. 2.*

579. Lapathum fativum Lapas *I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum aquaticum, folio cubitali *C. B. P. 116.* Lapathum maximum aquaticum, seu Hydrolapathum *I. B. tom. 2. l. 23. 986.* An Britannica antiquorum vera *Muntingii de Vera Herba Britan. 1.*

* Lapathum folio acuto rubente *C. B. P. 115.* Lapathum sanguineum, sive Sanguis Draconis, Herba *I. B. tom. 2. l. 23. 988.*

* Lapathum folio acuto crispo *C. B. P. 115. Morisf. Hist. 2. 579.* Lapathum acutum crispum *I. B. tom. 2. l. 23. 988.* & Lapathum aquaticum minus *C. B. P. 116. I. B. tom. 2. l. 23. 987.*

* Lapathum minimum *C. B. P. 115. Morisf. Hist. 2. 579.* Lapathum acutum minimum *I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis *Morisf. Hist. 2. 580.*

* Idem folio oblongo paludosum *Belgicum.*

* Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucrio dentato, foliis inferioribus fidium instar *Morisf. Hist. 2. 580.* Lapathum pulchrum Bonienſe ſinuatum *I. B. tom. 2. l. 23. 688.* Lapathum Pariſienſe ſinuatum *Cat. Hort. Reg. Pariſ. 100.*

Lapathum hortense, semine spinoso, non spinoso & sterile. v. *Spinachia*.

Lapathum unctuosum folio triangulo C. B. P. v. *Blitum*.

* **L**APPA major C. B. P. 198. Personata, sive *Lappa major*. An *Bardana*? I. B. tom. 3. l. 32. 570. ANN.

* *Lappa major montana*, capitulis tomentosis, sive *Arctium* C. B. P. 198. Personata altera, cum capitulis villosis I. B. tom. 3. l. 32. 571. ANN.

Lappa minor C. B. P. v. *Xanthium*.

Lappula canaria latifolia, ejusque species I. B. v. *Caucalis*.

LARIX C. B. P. 493. *Larix folio deciduo*, conifera I. B. tom. 1. l. 9. 265.

LASERPITIUM foliis latioribus lobatis *Morif. Umbell.* 28. *Libanotis latifolia* altera, sive vulgatiores 157. *Libanotis Theophrasti* quorundam, sive *Seseli Æthiopicum* *Matthiolo*, *Cervaria alba* I. B. tom. 3. l. 27. 164.

LasERPitium Daucoides Prutenicum, viscoso semine *Breyn. Cent.* 167. *Prodr.* 40.

LasERPitium foliis angustioribus saturatè virentibus & lucidis *Morif. Umbell.* 28.

LasERPitium foliis angustioribus dilutè virentibus *Morif. Umbell.* 28. *LasERPitium Gal-*

licum C. B. P. 156. Laserpitium è regione Massiliæ allatum I. B. tom. 3. l. 27. 137.

Laserpitio Lobelii similis, angustifolia I. B. tom. 3. l. 27. 137.

Lathyrus major C. B. P. & *minor* I. B. v. *Tithymalus*.

* **L**ATHYRUS radice tuberosâ repente *Morif. Hist. 2. 51.* Lathyrus arvensis repens tuberosus C. B. P. 344. Chamæbalanus leguminosa I. B. tom. 1. l. 17. 324.

* Lathyrus sylvestris & dumetorum, flore luteo *Morif. Hist. 2. 344.* Lathyrus luteus sylvestris dumetorum I. B. tom. 2. l. 17. 304.

Lathyrus latifolius C. B. P. 344. *Morif. Hist. 2. 51.* Lathyrus major latifolia, flore majore purpureo speciosior I. B. tom. 3. l. 17. 303.

Lathyrus angustifolius Narbonensis major I. B. tom. 3. l. 735. 4. *Morif. Hist. 2. 50.* Lathyrus angustifolius, alter *Morif. Hist. 2. 51.* An Lathyrus major sylvestris, alter C. B. P. 344?

Lathyrus ἀμφίναρπ, seu supra infraquæ terram siliquas gerens *Morif. Hist. 2. 51.* Vicia similis supra infraquæ terram fructum edens C. B. P. 345. Arachidna vulgò.

Lathyrus sativus minor, semine anguloso *Morif. Hist. 2. 52.* Lathyrus sativus, flore fructuquæ albo C. B. P. 343. Lathyrus anguloso semine I. B. tom. 2. l. 17. 307. ANN.

Idem flore purpureo *Morif. Hist. 2. 54.* Lathyrus

- rus sativus, flore purpureo *C.B.P.* 344. ANN.
 Lathyrus Narbonensi similis annuus. ANN.
 Lathyrus arvensis, siliquis Pisi minoris *Morif. Hist.* 2. 52. ANN.
 Lathyrus arvensis annuus luteus; siliquis hirsutis *Morif. Hist.* 2. 52. Lathyrus siliquâ hirsutâ *I. B. tom.* 2. l. 17. 305. Lathyrus angustifolius siliquâ hirsutâ *C. B. P.* 394. ANN.
 Lathyrus annuus flore cœruleo Ochri siliquâ. ANN.
 Lathyrus Boeticus, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 51. ANN.
 Lathyrus Hispanicus, flore luteo. ANN.
 Lathyrus luteus annuus, foliis Convolvuli minoris *Morif. Hist.* 2. 52. Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli minoris *C. B. P.* 345. Vicia quæ Pitina Anguillaræ, latâ siliquâ, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 17. 317. Aphaca vulgò. ANN.
 Lathyrus Tingitanus, siliquis Orobi, flore amplo ruberrimo *Morif. Hist.* 2. 55. ANN.
 Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœnicco, foliis labialibus subalbescens, siliquis Orobi *Morif. Hist.* 2. 55. ANN.
 Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus cœruleis *Morif. Hist.* 2. 56. ANN.
 Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine rotundo, flore rubello *Morif. Hist.* 2. 56. ANN.

Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine anguloso, flore cœruleo *Morif. Hist.*

2. 56. ANN.

Lathyrus sylvestris C. B. P. 344. *Morif. Hist.*

2. 56. Catanance leguminosa quorundam

I. B. tom. 2. l. 17. 309. ANN.

Lathyrus folio integro, producente bina foliola, capreolos emittentia *Morif. Hist.* 2.

58. Ochrus folio integro, capreolos emit-

tente C. B. P. 343. Lathyri species quæ Er-

vilia sylvestris Dodonæi *I. B. tom. 2. l. 17.*

305. ANN.

Idem fructu hispido ex cœruleo nigricante,

semine pullo *Cat. Hort. Reg. Paris. 130.*

Semine pullo C. B. P. *Var. 343. ANN.*

LAVANDULA latifolia C. B. P. 216. Pseudo-

nardus, quæ vulgo Spica *I. B. tom. 3. l. 28.*

280.

Lavandula angustifolia C. B. P. 216. Pseudo-

nardus, quæ Lavandula vulgò *I. B. tom. 2.*

28. 281. Flore violaceo.

Eadem flore albo C. B. P. 217. *I. B. tom. 3. l.*

28. 381.

Lavandula folio dissecto C. B. P. 216. Lavendu-

la multifido folio *I. B. tom. 3. l. 28. 281. ANN.*

LAUREOLA semper virens, flore viridi, quibusdam Laureola Mas C. B. P. 462. Laureo-

la semper virens, flore luteolo *I. B. tom. 1.*

l. 5. 564.

Lau-

- Laureola folio deciduo, flore purpureo C. B. P.
 462. Laureola folio deciduo, sive Mezereum
 Germanicum I. B. tom. 1. l. 5. 566.
 Eadem flore sub purpureo C. B. P. Var. 462.
 Eadem flore albo C. B. P. Var. 462.
 Eadem folio deciduo variegato Cat. Hort. E-
 dinb. Suntherl. 189.

- L**AURUS Indica Hort. Farnes. Aldin. 60.
 Laurus Americana Sterb. Citr. cultur. 257.
 Laurus Regia Cat. Hort. Paris. 102.
 Laurus latifolia *πλατυφύλλη* Diolc. C. B. P. 460.
 Laurus vulgaris C. B. P. 460. Laurus I. B. tom.
 1. l. 4. 405.
 Laurus vulgaris, folio undulato Cat. Hort. Reg.
 Paris. 102.
 Laurus tenuifolia mas Tab. 1361.
 Lauro serrata odorata Stapelianæ similis in-
 odora Capitis Bonæ Spei Breyn. Prodr. v.
 Evonymo adfinis.
 Lauro Cerasus I. B. v. Cerasus.
 Laurus non odora fructu globoso Africana Ster-
 beck. v. Evonymo adfinis.

- L**AURUS sylvestris, Corni Fœminæ foliis
 subhirsutis C. B. P. 461. Laurus Tinus sive
 sylvestris I. B. tom. 1. l. 4. 419.
 Laurus sylvestris, foliis venosis C. B. P. 461.
 Tinus altera I. B. tom. 1. l. 4. 419.
 Laurus sylvestris, folio minori C. B. P. 461.

LAURUS Alexandrina, fructu pediculo infidente C. B. P. 304. Bonifacia sive Bislingua *I. B. tom. 1. l. 5. 557.*

Laurus Alexandrina, fructu folio infidente C. B. P. 305. Laurus Alexandrina *I. B. tom. 1. l. 5. 574.* Hippoglossum Matth.

Laurus Alexandrina ramosa, fructu è summitate caulium prodeunte *Cat. Reg. Paris. 102*

Ledon ejusque species I. B. v. Cistus.

LENS vulgaris minor *Morif. Hist. 2. 59.*

Lens vulgaris C. B. P. 346. Lens *I. B. tom. 2. l. 17. 317. ANN.*

Lens major C. B. P. 346. *Morif. Hist. 2. 59. I. B. tom. 2. l. 17. 317. ANN.*

Lens monanthos. ANN.

* **L**ENTICULA palustris vulgaris C. B. P. 362. Lens palustris *I. B. tom. 3. l. 38. 785.*

* Lenticula palustris major *Cat. Plant. Holland. Camel. 63.*

* Lenticula aquatica trifulca C. B. P. 362. *I. B. tom. 3. l. 38. 786.*

* Lenticula palustris quadrifolia C. B. P. 362. Lens palustris quadrifolia *I. B. tom. 3. l. 38. 385.*

LENTISCUS vulgaris C. B. P. 399. Lentiscus *I. B. tom. 1. l. 3. 283.* Folius amplioribus & viridioribus.

Eadem foliis minoribus & pallidioribus.

Lentiscus Peruana C. B. P. 399. Molle *I. B. tom. 1. l. 5. 535.*

LEON.

LEONTOPETALON C. B. P. 324. *Morif. Hist. 2. 285. I. B. tom. 3. l. 30. 489.*

Leonurus Breyn. v. Cardiac.

Leonurus annuus Americanus vulgò. v. Cardiac.

LEPIDIUM latifolium serratum *Morif. Hist. 2. 312. Lepidium latifolium C. B. P. 97.*

Lepidium Pauli I. B. tom. 2. l. 22. 941.

Lepidium Glastifolium C. B. P. 97. Lepidium Glastifolium perenne Morif. Hist. 2. 312. Lepidium non repens I. B. tom. 2. l. 22. 941. ANN

Lepidium Dentillaria dictum C. B. P. v. Dentillaria.

Leucanthemum Dioscoridis C. B. P. & vulgare amarum I. B. v. Chamæmælum.

Leucanthemum I. B. v. Lychnis.

Leucanthemo Affinis I. B. v. Lychnis.

LEUCOJUM bulbosum minus præcox, tribus petalis albis minoribus, cingentibus terna minora herbacei coloris *Morif. Hist. 2. 364.*

Leucojum bulbosum trifolium minus C. B. P. 56. Leucojum bulbosum minus, triphyllon I. B. tom. 2. l. 19. 591.

Leucojum bulbosum majus præcox, Bizantinum, tribus petalis albis majoribus, terna minora herbacea seu viridia cingentibus Morif. Hist. 2. 364. Leucojum bulbosum trifolium, majus C. B. P. 56. Leucojum bul-

bosum præcox, Byzantinum *I. B. tom. 2. l. 19. 591.*

Leucojum bulbosum præcox majus, sex petalis æqualibus & albis *Morif. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum vulgare *C. B. P. 55.* Leucojum bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rariùs bino *I. B. tom. 2. l. 19. 590.*

Leucojum bulbosum serotinum majus, multiflorum *Morif. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum majus, sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinii statuunt *C. B. P. 55.* Leucojum bulbosum polyanthemum tardiùs florens, floribus minoribus *I. B. tom. 2. l. 19. 562.* Floribus simplicibus.

Idem floribus plenis.

L E U C O J U M incanum majus *C. B. P. 200.* *Morif. Hist. 2. 240.* Leucojum hyemale, & diu durans album *I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.*

Idem roseum *I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.*

Idem purpureum *I. B. tom. 2. l. 21. 874.* Leucojum purpureum vel rubrum *C. B. P. 200. ANN.*

Idem coccineum *Morif. Hist. 2. 240. ANN.*

Idem variegatum. Leucojum incanum majus variegatum, simplici flore *Morif. Hist. 2. 240. C. B. P. 240.* Vario colore. *ANN.*

Leucojum incanum majus multiplex *C. B. P. 200.* flore multiplici plenovè *Morif. Hist. 2. 240.* Purpuro-violaceo *C. B. P. Var. ANN.*

• Idem

Idem flore rubro C. B. P. *Var.* 200. *Morif. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore purpureo C. B. P. 200. *Morif. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 200. Flore candi-
do *Morif. Hist.* 2. 240. ANN.

Idem flore variegato. Leucojum incanum ma-
jus variegatum, pleno flore C. B. P. 201. *Mo-
rif. Hist.* 2. 241. Vario colore. ANN.

Idem foliis in ambitu argenteis. ANN.

Leucojum maritimum latifolium, annuum
Morif. Hist. 2. 241. Leucojum maritimum
latifolium C. B. P. 201. Leucojum mariti-
mum latifolium, flore cœruleo-purpurante
I. B. *tom.* 2. l. 21. 880. ANN.

Leucojum maritimum, sinuato folio C. B. P.
201. *Morif. Hist.* 2. 241. Leucojum mariti-
mum magnum latifolium I. B. *tom.* 2. l. 21.
875. ANN.

Leucojum maritimum angustifolium C. B. P.
201. *Morif. Hist.* 2. 241. Leucojum maritimum
angustifolium I. B. *tom.* 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum maritimum, foliis & siliquâ hirsu-
tis, eaque tribus in summo apicibus donatâ
Morif. Hist. 2. 242. Leucojis affine Tripo-
lium Anguillare, & Leucojum maritimum
Camerarii I. B. *tom.* 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum flore albo, siliquis uno versu dispo-
sitis & reflexis *Morif. Hist.* 2. 243. Brassica
sylvestris, foliis integris per terram stratis.
& in

& in caulibus hispidis *Morif. Hist. 2. 211.*
Brassica sylvestris hispida, non ramosa C. B.
P. 112. Turritis vulgarior I. B. tom. 2. l.
 21. 836.

Leucojum Africanum cœruleo flore, latifolium hirsutum. ANN.

Ex radicula tenui albente fibrosâ exoriuntur caules singulares vel ramosi, bipalmes, graciles hirsuti, atro-virentes, quibus ad ramorum sinus adstant folia non nihil sinuosa, pilosa, crassiuscula, integra, rarò laciniis incisa, digitum lata, unguem nunc latiora nunc angustiora, nervis venisvè nullis inscripta. Flores brevibus insident petiolis formâ & colore Lini sativi floribus æmuli, ast quatuor tantum petalis constructi, totidemquè subtus viridantibus parvis foliolis muniti. Hos excipiunt siliquæ digitum longæ, angustæ, compressæ, bivalves & bicipitales, quarum septo intermedio ab utraquè parte hærent semina exigua, rufescentia, oblonga, paululum compressa. Incola est Promontorii Bonæ Spei, amans saxosa, inculta, sole illustrata. Semen sapor deprehenditur subacris; Odor florum nullus.

Leucojum Africanum, cœruleo flore, angusto Coronopi folio, majus. ANN.

Hoc altius assurgit, cauliculis, foliisque glabris, angustis, Coronopi in modum dissectis, rarò integris; Floribus amplioribus;

**LEUCOIUM AFRICANUM COERULEO
FLORE, LATIFOLIUM HIRSUTUM.**

bus; Siliquis torosis angustissimis, Cætera superiori respondent. Nacti sumus ex liberalitate supra laudati Petri de Wolff in cuius viridario ex seminibus Africis pronatum, retro acto anno offendimus.

Idem minus. ANN.

Ab antecedente differt partium omnium exilitate.

Leucojum maritimum parvum folio virente crassiusculo I. B. v. Draba.

LEUCOJUM flore albo odoratissimo, folio lucidè virente *Morif. 243.* Leucojum album odoratissimum, folio viridi *C. B. P. 202.* Leucojum hyemale diu durans, flore albo, folio viridi & livido glabro *I. B. tom. 2. l. 21. 875.* ANN.

* Leucojum luteum vulgare *C. B. P. 202. Morif. Hist. 2. 243.* Leucojum luteum vulgò, Cheiri flore simplici. *I. B. tom. 2. l. 21. 874.*

Leucojum luteum sylvestre angustifolium. *C. B. P. 202. Morif. Hist. 244.* Leucojum luteum sylvestre Clusii *I. B. tom. 2. l. 21. 873.*

Leucojum luteum, pleno flore majus *C. B. P. 202.*

Idem flore ex purpuro colore & aureo varium. *Cat. Hort. Reg. Paris. 114.*

Leucojum pleno flore minus *C. B. P. 202. Morif. Hist. 2. 244.* Leucojum luteum, pleno flore *I. B. tom. 2. l. 21. 873.*

LEV.

LUGDUNO-BATAVUS. 367
LEUCOIVM AFRICANVM, COERULEO FLORE, CO-
RONOPH ANGVSTO FOLIO, MINVS.



LEUCOJUM lunatum seu lunarium latifolium majus annuum, filiquâ rotundâ, flore violaceo seu subcœruleo *Morif. Hist. 2. 245.* Viola lunaria major, filiquâ rotundâ C. B. P. 203. Lunaria major, filiquâ rotundiore *I. B. tom. 2. l. 21. 881.* Flore purpureo. ANN.

Idem flore variegato. ANN.

Leucojum majus perenne filiquâ lunatâ longâ Coronatâ *Morif. Hist. 2. 246.* Viola lunaria major, filiquâ oblonga. C. B. P. 203. Lunaria major, filiquâ longiore *I. B. tom. 2. l. 21. 882.* Flore ex albo subcœruleo.

Idem flore purpureo.

Leucojum asperum, filiquis asperis clypeiformibus *Morif. Hist. 2. 246.* Leucojum Alifoides clypeatum majus. C. B. P. 201. Alysson filiquâ latâ asperâ, quibusdam Lunaria flore luteo *I. B. tom. 2. l. 22. 934.* ANN.

Leucojum montanum flore pedato, *Col. Morif. Hist. 2. 247.* Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato. C. B. P. 107. ANN.

Leucojum incanum, filiquis tumidis subrotundis *Morif. Hist. 2. 247.* Leucojum incanum, filiquis rotundis C. B. P. 202.

Leucojum biscutatum asperum, Hieracifolium majus *Morif. Hist. 2. 249.* Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium & majus. C. B. P. 107. Lunaria biscutata. *I. B. tom. 2. l. 22. 935.* ANN.

Leucojum biscutatum asperum minus C. B. P. *Mo-*

Morif. Hist. 2. 249. ANN.
Levisticum vulgò. v. Ligusticum.

LIBANOTIS nigra, seu Saxifragia Vene-
 torum. *Lob. Morif. Umbell. 42.* Daucus
 montanus, Apii folio, major C. B. P. 150. Li-
 banotis altera quorundam, aliis dicta Cerva-
 ria nigra I. B. tom. 3. l. 27. 165.

Libanotis latifolia altera sive vulgarior C. B. P.
v. Laserpitium.

Libanotis latifolia, Aquilegiæ foliis C. B. P. v.
Siler.

Libanotis Ferulæ folio, semine angulosò. C. B. P.
v. Cachrys.

Libanotis Ferulæ folio & semine C. B. P. v.
Ferula.

Libanotis cachryophoros quibusdam floribus
luteis I. B. v. Cachrys.

Libanotis quibusdam flore luteo, semine Ferulæ
I. B. v. Ferula.

* **L**ICHEN petræus latifolius, sive Hepatica
 fontana C. B. P. 362. Lichen sive Hepatica
 fontana I. B. tom. 3. l. 37. 758.

* Lichen petræus stellatus C. B. P. 362.

* Lichen petræus umbellatus C. B. P. 362.

* Lichen petræus, caliculo calceato C. B. P. 362.

* Lichen petræus minimus, fructu Orobi C. B. P.
 362.

* Lichen cinereus terrestris J. Raii Cat. Plant.
Angl. 185.

* Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis nigricantibus constans *Merett. Pin.* 72.

Lichen Arboreus I. B. v. Muscus.

* **L**IGUSTICUM *Moris. Umb.* 7. Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis C. B. P. 157? Ligusticum vulgare, foliis Apii I. B. *tom.* 3. l. 27. 122. Levisticum vulgo.

Ligusticum quod Seseli Officinarum C. B. P. v. Siler.

Ligusticum Rauwolffi, foliis Aquilegiae I. B. v. Siler.

LIGVSTRUM Germanicum C. B. P. 475. Ligustrum I. B. *tom.* 1. l. 5. 529.

Idem foliis argentatis *Breyn. Prodr.* 41.

Idem foliis auratis *Breyn. Prodr.* 41.

Ligustrum foliis laciniatis C. B. P. v. Syringha.

Idem foliis integris C. H. R. P. v. Syringha.

LILIVM Persicum C. B. P. 79. *Moris. Hist.* 2. 406. Lilium Persicum sive Susianum I. B. *tom.* 2. l. 19. 699.

Lilium, sive Corona Imperialis C. B. P. 79. *Moris. Hist.* 2. 406. Corona Imperialis sive Tufai aliis I. B. *tom.* 2. l. 19. 697.

Idem foliis variegatis *Moris. Hist.* 2. 407. Lilium sive Corona Imperialis Sinensium seu foliis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 107.

Lilium sive Corona Imperialis flore rubescen-

te aut Sandaracæ Sandycisve colorem referens, instar astaci elixi chelarum ferè *Morisf. Hist. 2. 402.*

Lilium sive Corona Imperialis, flore multiplici *Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 199.*

Lilium sive Corona Imperialis, flore pleno *Cat. Hort. Reg. Paris. 107.*

Lilium sive Corona Imperialis, flore luteo *Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 199.*

Idem flore luteo striato *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 199.*

Lilium, sive Corona Imperialis duplici corona *C. B. P. 79. Morisf. Hist. 2. 407.*

Idem triplici corona, seu triplici florum ordine *Cat. Hort. Lugd. Schuyli 23.*

Lilium, sive Corona Imperialis multiflora latoquè caule *C. B. P. 69. Morisf. Hist. 2. 407.*

Lilium, sive Corona Imperialis ramosa *C. B. P. 97. Morisf. Hist. 2. 407.*

Lilium, sive Corona Imperialis per omnia major *Cat. Hort. Reg. Paris. 106.*

LILIIUM Martagon montanum majus floribus reflexis *Morisf. Hist. 2. 408.* *Lilium* flore nutante maximum *I. B. tom. 2. 19. 694.*

Idem minus. *Lilium* floribus reflexis montanum *C. B. P. 77.* *Lilium* flore nutante ferrugineo majus *I. B. tom. 2. l. 19. 692.*

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris. 106.*

flore albicante C. B. P. 77. *Morif. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium Martagon, floribus reflexis rubris, punctatum *Morif. Hist. 2. 408.* Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Idem non punctatum *Morif. Hist. 2. 408.* Floribus dilutè purpurascentibus, maculis caesentibus C. B. P. *Var. 78.*

Lilium Martagon, floribus reflexis albis punctatis *Morif. Hist. 2. 408. C. B. P. 78.*

Idem non punctatis *Morif. Hist. 2. 408. C. B. P. 78.* Lilium flore nutante albo I. B. *tom. 2.*

l. 19. 694. Lilium floribus reflexis polyanthos album punctatum C. B. P. 78. *Morif. descr. Hist. 2. 408.*

Lilium Martagon Canadense maculatum *Park. Morif. Hist. 2. 408.*

Lilium angustifolium purpuro-sanguineum, flore reflexo *Morif. Hist. 2. 408.* Lilium purpuro-sanguineum, flore reflexo C. B. P. 78. Lilium flore miniato nutante, sive Hemerocallis Chalcedonica quibusdam I. B.

tom. 2. l. 19. 695. Præcox.

Idem serotinum *Morif. Hist. 2. 409.*

Lilium Byzantinum miniatum C. B. P. 78. *Morif. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium brevi & Gramineo folio C. B. P. 79.

Lilium præcox, nutante flore rubro, tenuifolium I. B. *tom. 2. l. 19. 696.*

Li-

Li-

Lilium miniatum angustifolium odorum C. B. P. 79. Martagon Pomponii Clusii Morisf. Hist. 2. 409.

Lilium Martagon flavum angustifolium C. B. P. 79. Morisf. Hist. 2. 409. Martagon flore luteo præcox I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Idem serotinum, foliis latioribus, atro-virentibus, flore saturè phœniceo Lob. C. B. P. Var. 79.

LILIIUM album vulgare & odoratum, flore erecto *Morisf. Hist. 2. 409. Lilium album vulgare, flore erecto & vulgare C. B. P. 76.*

Lilium album vulgare I. B. tom. 2. l. 19. 685.

Lilium lato caule, multiflorum Cat. Hort. Reg. Paris. 405. Lilium album Syriacum Rauwolfii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium album, flore pleno Cat. Hort. Lugd. Schuyt. 42.

Lilium album floribus dependentibus five peregrinum C. B. P. 76. Lilium album peregrinum, floribus albis, & foliis angustioribus Morisf. Hist. 2. 409. Lilium album Constantinopolitanum, Sultan Zambach dictum Clusii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium Canadense, imperfectis floribus & irregularibus multis albis Morisf. Hist. 2. 410.

Lilium purpuro croceum majus C. B. P. 76. Morisf. Hist. 2. 411. Lilium rubens croceum majus I. B. tom. 2. l. 19. 688.

Idem flore pleno C. B. P. 77.

Lilium purpuro-croceum minus C. B. P. 77.

Lilium rubens vel croceum minus I. B. tom.

2. l. 19. 689.

Lilium bulbiferum latifolium majus C. B. P. 77.

Morif. Hist. 2. 411.

Idem bulbiferum minus C. B. P. 77. *Morif. Hist.*

2. 411. Lilium bulbiferum repens I. B. tom.

2. l. 19. 691.

Lilium bulbiferum incanum C. B. P. 77. *Morif.*

Hist. 2. descr. 411. I. B. tom. 2. l. 19. 691.

Lilium Africanum, Narcissinis foliis, polyanthos saturo colore purpurascens. Lilionarcissus Indicus, saturato colore purpurascens *Morif. Hist.* 2. 367. Narcissus Indicus Liliaceus, saturo colore purpurascens *Fer. Flor. cult.* 119.

Idem diluto colore purpurascens. Narcissus Indicus liliaceus, diluto colore purpurascens *Fer. Flor. cult.* 121.

Lilium Indicum, Narcissinis foliis, monanthos rubrum. Lilio-narcissus Jacobæus latifolius Indicus, rubro flore *Morif. Hist.* 2. 366.

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. 49.

Narcissus Indicus latifolius, rubro flore I. B. tom. 2. l. 19. 609.

Idem ex albo rubrum. Narcissus ex albo rubescens C. B. P. 49.

Lilium Africanum sphæricum, floribus phœniceis majoribus, bulbo rotundo Lilio-narcissus

cissus Indicus maximus sphœricus, floribus plurimis rubris Liliaceis *Morif. Hist. 2. 368.*

Narcissus Indicus, flore Liliaceo, sphœricus *Ferr. Flor. cult. 129.*

Lilium Africanum sphœricum, floribus obsoletè puniceis minoribus, foliis guttatis, ad margines ciliî instar pilosis, bulbo oblongo. Bulbus oblongus Æthiopicus, foliis guttatis & ciliî instar pilosis *Breyn. Cent. 1. 89.*

LILIUM luteum, radice Asphodeli *C. B. P. 80. Morif. Hist. 2. 412.* Lilium Asphodeli radice luteum, sive Lilio-asphodelus quorundam, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 700.*

Idem minus *Morif. Hist. 2. descr. 412.*

Lilium rubrum Asphodeli radice *C. B. P. 80. Morif. Hist. 2. 412.* Lilium radice Asphodeli, phœniceum, sive Lilio-asphodelus quibusdam *I. B. tom. 2. l. 19. 701.*

Idem minus.

Lilium Indicum puniceum, gemino latiori folio. Morif. v. Hæmanthus Africanus.

Lilium Alexandrinum I. B. v. Ornithogalum.

Lilionarcissus albus maritimus minor. Morif. v. Narcissus.

Lilionarcissus albus maritimus major. Morif. v. Narcissus.

Lilio-narcissus jacobæus latifolius Indicus, rubro flore. Morif. v. Lilium.

Lilio-narcissus Indicus, saturo colore purpurascens Moris. v. Liliū.

Lilio-narcissus Indicus maximus Sphaericus Moris. v. Liliū.

* **L**ILIIUM convallium album C. B. P. 304.
Lilium convallium vulgò *I. B. tom. 3. l. 31. 531.*

* Idem flore rubente. C. B. P. 304. *I. B. tom. 3. l. 31. 533.*

* Lilium convallium minus C. B. P. 304. Unifolium sive Ophris unifolia *I. B. tom. 3. l. 31. 535.*

Lilium convallium Virginianum, Polygonati foliis, racemosum. Polygonatum racemosum. *Corn. 36.*

Limonia malus C. B. P. seu Limon ejusque species I. B. v. Malus Limonia.

* **L**IMONIUM maritimum majus C. B. P. 192. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum *I. B. tom. 3. app. 876.*

Limonium maritimum minus, Oleæ folio C. B. P. 192. Limonium minus *I. B. tom. 3. app. 877.*

Limonium peregrinum, foliis Asplenii C. B. P. 192. Limonium quibusdam rarum *I. B. tom. 3. app. 877. ANN.*

LINARIA Americana maxima, purpureo flore.

Tri-



Triplex constituitur Linariarum classis, desumpta à triplici seminum formâ. Prima exhibet semina orbiculata compressa foliacea; secunda angulosa vel rugosa; tertia rotunda. Priori annumeratur Linaria Americana, cui sunt caules rotundi læves & ramosi, humanâ altitudine quandoque superiores; Folia quina quaterna ternavè ex adverso, absque petiolis ordinatim disposita, consimili ferè facie Gentianæ cruciatæ, ex basi latâ in acutum mucronem tendentia, supernè glabra lætè viridia, infernè pallida aliquot per longitudinem excurrentibus nervis inscripta: Summas virgas occupant flores monopetali, in fundo integri, purpurei, reliquis omnibus Linariæ speciebus ampliores, antè rictum, posteriùs calcar habentes; His defluxis succedunt vascula rotunda, sursum versus bifariam dehiscentia, in quibus semina nigra orbiculata compressa foliacea, quæ globulo fungoso pallido tanquam septo intermedio imbricato ordine circumstant. Radix subest alba, tenuis, fibrosa, vario reptatu longè latèque sese diffundens, & singulis annis nova germina protrudens. Ex America ad nos transfluxit curâ & operâ Dni Philippi de Flines.

- * Linaria vulgaris, luteo flore majore *Morif. Hist.* 2. 499. C. B. P. 212. Linaria lutea vul-

vulgaris *I. B. tom. 3. l. 30. 456.*

Linaria flore pallido, rictu purpureo *C. B. P. 213. Hist. Morif. 2. 500.* **Linaria** Pannonica, flore luteo, minore quàm in vulgari *I. B. tom. 3. l. 30. 458.*

Linaria flore pallido, rictu aureo *C. B. P. 213. Morif. Hist. 2. 500.*

Eadem foliis incanis, *Maldavica dicta.*

Linaria purpurea major odorata *C. B. P. 213. Morif. Hist. 2. 500.* **Linaria** purpurea magna *I. B. tom. 3. l. 30. 460.*

Linaria triphylla minor lutea *C. B. P. 212. Morif. Hist. 2. 502.* **Linaria** trifolia *I. B. tom. 3. l. 30. 458. ANN.*

Linaria annua Chalepensis minor erecta, flore albo, lineis violaceis notato, calyci, ex quinque foliolis uncialibus constructo, insidente *Morif. Hist. 2. 502. ANN.*

Eadem flore omnino albo. *ANN.*

* **Linaria** minima, foliis hirsutis, floribus obsoletè fusci coloris *Morif. Hist. 2. 502.* **Anthirrhinum** arvense minus *C. B. P. 212.* **Anthirrhinum** minimum *I. B. tom. 3. l. 30. 465. ANN.*

* **Eadem** foliolis brevibus reflexis. *ANN.*

Linaria hirsuto folio subrotundo, flore ex herbido flavescente *Morif. Hist. 2. 503.* **Elatine** folio subrotundo *C. B. P. 212.* **Elatine** Mas folio subrotundo *I. B. tom. 3. l. 29. 372. ANN.*

Linaria hirsuto folio acuminato, in basi auriculato Morisf. Hist. 2. 503. Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo C. B. P. 253. Elatine Fœmina, folio anguloso I. B. tom. 3. l. 29. 372. ANN?

* *Linaria folio glabro subrotundo, Hederae folio Clematidis Morisf. Hist. 2. 503. Cymbalaria C. B. P. 306. Cymbalaria flosculis purpurascentibus I. B. tom. 3. l. 35. 685. ANN.*

Linaria Scoparia C. B. P. v. Atriplici affinis.

Linaria folioso capitulo luteo maj. C. B. P. v. Virga aurea.

LINGUA cervina Officinarum C. B. P. 353.
Phyllitis, sive Lingua cervina vulgi I. B. tom. 3. l. 37. 756.

Lingua cervina, majore folio, in duas tresvè lacinias & profundius dissecto Cat. Hort. Reg. Par. 108.

Lingua cervina maxima, undulato folio, auriculato per basin Cat. Hort. Reg. Par. 108.

Phyllitis crispa I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Lingua cervina multifido folio C. B. P. 353.

Phyllitis polyschides I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Eadem laciniiis singulis cruciatim decussatis.

Hujus copiam nobis fecit Dñus Jacobus Bobartus à quo in sylvis Angliæ reperta est.

Lingua cervina angustifolia major, suâ lanugine foliorum lacinias involvente Cat. Hort.

Hort. Reg. Paris. 109.

Lingua cervina, medio folii nervo in aculeum delinente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 109.

Lingua cervina minima Anglica Bobarti.

Lingua cervina, seu Phyllitis minima, undulato folio *Cat. Hort. Reg. Par.* 109.

Lingua cervina ramosa Cretica, angustissimo folio. Phyllitis ramosa *Alpin. in Eox.* 67.

Lingua Plinii l. B. v. Ranunculus.

LINUM annum cœruleum sativum *Morif. Hist.* 2. 572. Linum sativum C. B. P. 214. Linum l. B. tom. 3. l. 30. 450. ANN.

* Linum arvense C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 573. Linum sylvestre, sativum planè referens l. B. tom. 3. l. 30. 452. ANN.

Linum perenne majus cœruleum, capitulo majore *Morif. Hist.* 2. 573.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo majore.

Partium omnium teneritate & parvitate à Præcedente cognoscitur. Provenit ex feminibus à Dno Jacobo Bobarto transmissis.

Linum maritimum luteum C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 374. Linum luteum Narbonense l. B. tom. 3. l. 30. 454.

Linum sylvestre angustifolium, flore magno C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 574.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens vel carneis C. P. B. 214.

Morif. Hist. 2. 214. *Linum sylvestre angustifolium album*, lineis in umbilico purpureis I. B. tom. 3. l. 30. 455. ANN.

Linum umbilicatum Park. v. *Cynoglossum*.

Liliasphodelus I. B. v. *Lilium*.

Liquiritia vulgò v. *Glyzyrhiza*.

LITHOSPERMUM majus erectum C. B. P. 258. *Lithospermum*, sive *Milium solis* I. B. tom. 3. l. 33. 590.

Lithospermum Arundinaceum C. B. P. v. *Milium*.

Lithospermum Arundinaceum aliud Hernand. v. *Milium*.

Lithospermum Gramineum spicatum I. B. v. *Gramen*.

Locusta herba I. B. v. *Valerianella*.

LONCHITIS aspera C. P. B. 359. *Lonchitis altera* cum foliis denticulatis, sive *Lonchitis altera* Matthioli I. B. tom. 3. l. 37. 745.

Lonchitis minor C. B. P. 359. *Lonchitis altera*, foliis *Polypodi* I. B. tom. 3. l. 37. 745.

LOTUS fructu Cerasi C. B. P. 447. Lotus, Arbor, fructu Cerasi I. B. tom. 1. l. 2. 229.

Lotus Africana latifolia C. B. P. 447. Guaiacana I. B. tom. 1. l. 2. 238. Guajacum Patavinum vulgò.

LOTUS annua ὀλιγοκέραλον, siliquis singularibus binis ternisvè Morisf. Hist. 2. 175. Lotus corniculata, siliquis singularibus binis ternisvè I. B. tom. 2. l. 17. 356. ANN.

* Lotus ὀλιγοκέραλον τετραγωνόλοβος perennis Monspeliensis flore luteo Morisf. Hist. 2. 176. Lotus pratensis filiquosus luteus C. B. P. 332. filiquosa lutea Monspeliensis I. B. tom. 2. l. 17. 359.

Eadem maritima, folio pingui glabro. Lotus maritima filiquosa, folio pingui glabro. Magnol.

Lotus ὀλιγοκέραλος τετραγωνόλοβος annua Cretica flore saturate rubro seu holoserico coccineo Morisf. Hist. 2. 176. Lotus ruber filiquâ angulosâ C. B. P. 332. Lotus filiquosa, flore fusco tetragonolobus I. B. tom. 2. l. 17. 359. ANN.

Lotus πολυκέραλος annua procumbens latifolia, siliquis Ornithopodii Morisf. Hist. 2. 176. Lotus siliquis Ornithopodii C. B. P. 332. I. B. tom. 2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέραλον, siliquis recurvis, pedes corvinos referentibus C. B. P. 332. Morisf. Hist.

Hist. 2. 177. Loto filiquoso aliquomodo similis, Coronopus ex Cod. Cæs. 1. B. tom. 2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέρατος lutea minor, foliis & filiquis glabris brevioribus, & crassioribus *Morif.*

Hist. 2. 177. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra C. B. P. 332. Lotus corniculata glabra minor 1. B. tom. 2. l. 17. 356.

Eadem major, flore splendente. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente C. B. P. 332. Loti corniculatae major species 1. B. tom. 2. l. 17. 355.

* Lotus πολυκέρατος lutea minor, foliis & filiquis hirsutis longioribus & tenuioribus *Morif.* *Hist.* 2. 177. An Lotus corniculata hirsuta minor 1. B. tom. 2. l. 17. 355.

Lotus πολυκέρατος fruticosa Cretica argentea, filiquis longissimis propendentibus rectis *Morif.* *Hist.* 2. 177.

Lotus πολυκέρατος frutescens hirsuta alba major latifolia, filiquis curtis tenuibus erectis *Morif.* *Hist.* 2. 177. An Lotus pentaphyllus

filiquosus villosus C. B. P. 332? sive Lotus filiquosus glaber, flore rotundo C. B. P. 332.

An Trifolium rectum Monspeßulanum 1. B. tom. 2. l. 17. 359. Lotus Lybica Dalechampii vulgò.

Lotus πολυκέρατος frutescens incana alba, filiquis curtis crassioribus & brevioribus erectis *Morif.* *Hist.* 2. 177. Trifolium album re-

ctum

etum hirsutum valdè I. B. tom. 2. l. 17. 360.

Lotus hæmorrhoidalis major, sive Trifolium hæmorrhoidale majus Park. Theatr. 1102.

Eadem minor.

Lotus πολυκέρατ frutescens incana, filiculis subrotundis erectis Moris. Hist. 2. 178. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis C. B. P. 329. Dorycnium Monspelienfium vulgò.

Lotus hortensis odora C. B. P. v. Melilotus.

Lotus sativa odorata annua, flore cæruleo I. B. v. Melilotus.

Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P. v. Anthyllis.

Loto affinis vulneraria pratensis C. B. P. v. Anthyllis.

Eadem flore suavè rubente Moris. v. Anthyllis.

Loto affinis major vesicaria Hispanica Moris. v. Anthyllis.

Loto affinis Egyptiaca C. B. P. v. Senna.

Luffa Arabum Vestling. v. Pepo.

LUNARIA racemosa minor, vel vulgaris C. B. P. 354. Lunaria Botrytis I. B. tom. 3. l. 35. 709.

Lunaria racemosa, multifido folio C. B. P. 355.

Lunaria Botrytis racemosa Silesiaca I. B. tom. 3. l. 35. 711.

Lunaria radiata Robini I. B. v. Astragalus.

Lunaria flore luteo I. B. v. Leucojum.

Lunaria major ejusquè species I. B. v. Leucojum.

LUPINUS peregrinus major, vel villosus
cœruleus major C. B. P. 348. *Morif. Hist.* 2.

87. Lupinus exoticus hirsutissimus I. B. tom.

2. l. 17. 289. Lupinus Indicus Corn. 207 ANN.

Idem incarnatus. ANN.

Lupinus sativus, flore albo C. B. P. 347. Lupi-
nus vulgaris, seu sativus albus *Morif. Hist.* 2.

86. Lupinus vulgaris, semine & flore albo,
sativus I. B. tom. 2. l. 17. 288. ANN.

Lupinus flavo flore *Morif. Hist.* 2. 87. Lupinus

sylvestris, flore luteo C. B. P. 348. Lupinus

luteo flore, semine compresso vario I. B. tom.

2. l. 17. 291. ANN.

Lupinus sylvestris angustifolius *Morif. Hist.* 2. 88

Lupinus sylvestris, flore cœruleo C. B. P. 348.

Lupinus sylvestris, purpureo flore, semi-
ne rotundo vario I. B. tom. 2. l. 17. 291. ANN.

Lupinus Indicus, angustissimo folio. An Lu-

pinus Indicus minor *Cat. Hort. Reg.*

Paris. III. ANN.

Lupinus Ægyptius sylvestris Vestlingi. v.
Sinapistrum.

LUPULUS Mas C. B. P. 298. I. B. tom. 2. l. 15.

151. Convolvulus perennis heteroclitus,

floribus herbaceis, capsulis foliaceis strobili

instar *Morif. Hist.* 2. 37.

Lupulus Fœmina C. B. P. 298. I. B. tom. 2. l. 15.

152. Lupulus sylvestris minor sine fructu

Morif. Hist. 34.

LUTEOLA herba, *Salicis folio* C. B. P.
v. Reseda.

Luteola Cretica C. B. P. v. Reseda.

LYCHNIS sylvestris perennis, quæ Been al-
bum vulgò *Morif. Hist. 2. 535.* Lychnis syl-
vestris, quæ Been album vulgò C. B. P. 205.
Been album Officinarum *I. B. tom. 3. l. 29.*
357. Papaver spumeum vulgò.

Lychnis sylvestris perennis latifolia hirsuta
Morif. Hist. 2. 535. Lychnis Papaver spu-
meum latifolium vulgare hirsutum *Morif.*
Hort. Bles. 284. An Lychnis sylvestris, quæ
Been album vulgò, foliis hirsutis *Cat. Hort.*
Edinb. Sutherl. 211?

Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
bra, flore albo, seu foliis acutioribus & angu-
stioribus C. B. P. *Var. 205.*

Eadem flore pallidè incarnato. An Lychnis
Papaver spumeum angustifolium, glabrum,
flore purpureo *Morif. Hort. Bles. 124?*

Eadem flore ex luteo pallescente.

Eadem flore ex viridi rubente. An Eadem
montana flore ex viridi purpurascente C. B.
P. Var. 205?

Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
bra, flore pleno odorato albo *Clus. Hist.*
l. 1. c. 3. p. 239.

Lychnis perennis angustifolia marina Anglica
procumbens *Morif. Hist. 2. 535.* Lychnis ma-

ritima repens C. B. P. 205. *Lychnis marina*
Anglicana I. B. tom. 3. l. 29. 357.

Lychnis sylvestris, plurimis foliis simul jun-
 ctis C. B. P. 205. *Morif. Hist.* 2. 535. *Lychnis*
sylvestris, foliis angustis, & pluribus ex ge-
 nericulis singulis Clusio I. B. tom. 3. l. 29. 345.

Lychnis sylvestris seu montana latifolia visco-
 sa, florum petalis suprâ albis, subtus vire-
 scentibus interdium se contrahentibus *Morif.*
Hist. 2. 535. *Lychnis montana viscosa alba*
latifolia C. B. P. *Polemonium Petraeum* Ges-
 neri I. B. tom. 3. l. 29. 351.

Eadem florum petalis suprâ albis, subtus pur-
 purascentibus.

**Lychnis viscosa*, flore muscoso C. B. P. 206.
Morif. Hist. 2. 536. *Muscipula muscoso flore*,
 sive *Ocymoides belliforme* I. B. tom. 3. l. 29.
 350. *Otites* vulgò.

**Lychnis pratensis*, flore laciniato simplici *Mo-*
ris. Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*,
 flore laciniato simplici, sive *Flos cuculi* C. B.
 P. 210. *Flos cuculi*, *Odontis* quibusdam I. B.
 tom. 3. l. 29. 347.

*Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 210.

Lychnis pratensis, flore laciniato pleno *Morif.*
Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*, flore
 pleno C. B. P. 210. *Flos cuculi*, flore multi-
 plicato purpureo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Eadem flore albo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Lychnis

Lychnis foliis glabris, calyce duriore Boccon.

Id. & Desc. 27. Moris. Hist. 2. 537.

Lychnis frutescens noctiflora Moris. Hist. 2. 538.

Lychnis noctiflora C. B. P. 205. Ocymoides non speciosum I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis frutescens Myrtifolia, Been albo similis C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 538. Flore carneo.

Eadem flore albo.

Lychnis Chalcedonica, flore miniato seu aurantiaco simplici Moris. Hist. 2. 538. Lychnis

major hirsuta, flore coccineo C. B. P. 203.

Flos Constantinopolitanus miniatus I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 538. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore albo Moris. Hist. 538. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore vario I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis Chalcedonica, flore pleno miniato seu aurantiaco Moris. Hist. 2. 538. Flos Constantinopolitanus, flore pleno C. B. P. 203.

Lychnis coronaria sativa, flore rubro Moris. Hist. 2. 540. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa C. B. P. 203. Lychnis coronaria vulgò I. B. tom. 3. l. 29. 340.

Eadem flore ruberrimo seu coccineo.

Eadem flore albo Moris. Hist. 2. 540. C. B. P. Var. 203.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 540.

Eadem flore albo, lineis vel punctis rubris variegato C. B. P. 203. Flore punctato *Morif. Hist.* 2. 540.

Eadem flore ex carneo candidoque mixto *Morif. Hist.* 2. 540. Eadem incarnato punctato C. B. P. 203.

Eadem flore intus rubro, extus albo.

Lychnis coronaria sativa, flore coccineo pleno *Morif. Hist.* 2. 540. *Lychnis coronaria sativa multiplex* C. B. P. 204. *Lychnis coronaria*, flore pleno I. B. tom. 3. l. 29. 341.

Lychnis coronaria sylvestris C. B. P. 204. *Morif. Hist.* 2. 540. *Lychnis umbellifera montana Helvetica Zan. Hist. Bon.* 128. An *Verbascum acuto Salviæ folio* C. B. P. 240? & *Verbascum Lychnites Syriacum incanum summitate floris Hierosolymitani* I. B. *App.* tom. 3. 876?

* *Lychnis sylvestris hirsuta perennis alba simplex* *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis sylvestris alba simplex* C. B. P. 204. *Ocymoides album multis* I. B. tom. 3. l. 29. 342. *Ocymastrum vulgò.*

Eadem multiplex *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis alba multiplex* C. B. P. 204. *Ocymoides album*, flore pleno I. B. tom. 3. l. 29. 343.

* *Lychnis sylvestris minus hirsuta, flore rubello simplici* *Morif. Hist.* 2. 541. *Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex* C. B. P. 204. *Ocymoides purpureum multis* I. B.

tom.

tom. 3. l. 29. 343.

Eadem flore rubello eleganter multiplici *Morif. Hist. 2. 541.* *Lychnis purpurea multiplex C. B. P. 204.*

Lychnis Chalepensis annua, foliis parùm hirtis & angustis, flosculis carneis pediculis infirmis biuncialibus insistentibus, capsulis ferè rotundis Morif. Hist. 2. 541. ANN.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis C. B. P. 205. Morif. Hist. 2. 542. Centaurium minus adulterinum, quibusdam *Lychnidis viscidæ* genus *I. B. tom. 2. l. 29. 355.* *Muscipula vulgò. ANN.*

Eadem flore albido *Morif. Hist. 2. 542.* Seu albo *C. B. P. Var. 205. ANN.*

* *Lychnis segetum, Vaccaria dicta Morif. Hist. 2. 542.* *Lychnis segetum rubra, foliis Perfoliatæ C. B. P. 204.* *Vaccaria I. B. tom. 3. l. 29. 357. ANN.*

Lychnis sylvestris lanuginosa major C. B. P. 206, Morif. Hist. 2. 543. *Lychnis sylvestris lanugine canescens, flore majusculo rubescente Clusii 5. I. B. tom. 3. l. 29. 348.*

* *Lychnis hirsuta segetum major Morif. Hist. 2. 543.* *Lychnis segetum major C. B. P. 204.* *Pseudomelanthium I. B. tom. 3. l. 29. 341.* *Nigellastrum vulgò. ANN.*

* Eadem flore albo *C. B. P. Var. 204. ANN.*

Lychnis Pseudomelanthio similis Africana glabra angustifolia. Lychnis segetum

Nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello Moris. Hist. 2. 543. ANN.

Collegimus in Promontorio Bonæ Spei & Clarissimo Morisonio, qui eandem in Historiâ Oxoniensi descripsit transmisimus.

* *Lychnis sylvestris latifolia, caliculis striatis turgidis C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 543.*

Muscipula major, calyce turgido ventricolo I. B. tom. 3. l. 29. 349. ANN.

Lychnis sylvestris lanuginosa minor C. B. P. 206. Moris. Hist. 2. 544. ANN.

Eadem flore rubro Moris. Hist. 2. 544. ANN.

Eadem flore mixto, ex albo & pulcherrimo rubro Moris. Hist. 2. 544. ANN.

Eadem flore variegato, seu maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato Moris. Hist. 2. 544. Lychnis hirsuta minor, flore variegato Dodart. Mem. 99. ANN.

Lychnis segetum meridionalium annua hirsuta, floribus albis uno versu dispositis Moris. Hist. 2. 544. ANN.

Lychnis vel Ocymoides montanum hirsutum procumbens Moris. Hist. 2. 544. Lychnis

Ocymoides repens montanum C. B. P. 206.

Saponaria minor quibusdam I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis minima rigida Cherleri I. B. tom. 3. l. 29. 352. Moris. Hist. 2. 544.

* *Lychnis arvensis minor vulgaris hirsuta Moris. Hist. 2. 545. Caryophyllus arvensis hirsutus*

tus

LYCHNIS PSEUDOMELANTHIO SIMI-
LIS AFRIC. GLAB. ANGUSTIF.



tus flore majore *C. B. P.* 210.

Lychnis incana & tomentosa cauliculis procumbentibus, foliis latioribus & brevioribus. *Lychnis incana repens C. B. P.* 206. *Morif. Hist.* 2. 537. *Ocymoides Lychnitis reptante radice I. B. tom.* 3. l. 29. 353.

Lychnis maritima incana & tomentosa *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus holostius tomentosus latifolius C. B. P.* 210. *Caryophyllus holostius tomentosus I. B. tom.* 3. l. 29. 360. Foliis longioribus & angustioribus.

Lychnis caulibus ad genicula foliosis *Morif. Hist.* 2. 546. *Auricula muris, pulchro flore albo I. B. tom.* 3. l. 29. 360.

Lychnis Graminea hirsuta umbellifera *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro C. B. P.* 210. *Caryophyllus arvensis umbelliferus I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

* **Lychnis arvensis glabra, flore majore** *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis glaber, flore majore C. B. P.* 210. *Gramen Fuchsii, sive Leucanthemon I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

* **Eadem flore minore** *Morif. Hist.* 2. 546. *Caryophyllus arvensis glaber, flore minore C. B. P.* 210. *Gramini Fuchsii Leucanthemo affinis, & similis herba I. B. tom.* 3. l. 29. 361.

Lychnis minima muralis *Morif. Hist.* 2. 547. *Caryophyllus minimus muralis C. B. P.* 211.

ANN.

Lychnis

Lychnis, Saponaria dicta major vulgaris simplex *Morif. Hist.* 2. 547. Saponaria major levis C. B. P. 206. Saponaria vulgaris, I. B. tom. 3. l. 29. 346.

Eadem multiplex *Morif. Hist.* 2. 547. Saponaria flore pleno *Cornut.* 209.

Saponaria concava Anglica C. B. P. 206. *Morif. Hist.* 2. 548. Gentiana folio convoluto I. B. tom. 3. l. 21, 521,

Lycium Hispanicum, folio oblongo C. B. P. 478.

Lycium Hispanicum, folio Buxi C. B. P. 478.

Lycium quorundam, folio Myrti Tarentinæ aut Buxi I. B. tom. 1. l. 6, 61.

Lycopsis ejusquæ species C. B. P. v. Echium.

Lycopsis Africana. v. Echium.

LYSIMACHIA latifolia, dicta Chamænerion C. B. P. 245. *Morif. Hist.* 2. 269. Lyfimachia speciosa, quibusdam Onagra dicta, siliquosa I. B. tom. 2. l. 21. 906. Flore purpureo si-
ve cœruleo C. B. P. *Var.* 245.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 245.

Lyfimachia, Chamænerion dicta angustifolia C. B. P. 245. *Morif. Hist.* 2. 270. Lyfimachia speciosa siliquosa angustifolia I. B. tom. 2. l. 21. 907.

* Lyfimachia siliquosa hirsuta, magno flore C. B. P. 245. *Morif. Hist.* 2. 270. Lyfimachia
sili-

filiquosa hirsuta, majore flore purpureo *I. B. tom. 2. l. 21. 905.*

* *Lyfimachia* filiquosa hirsuta, parvo flore *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 270.* *Lyfimachia* filiquosa hirsuta, flore minore *I. B. tom. 2. l. 21. 906.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra major *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 270.* *Lyfimachia* lævis *I. B. tom. 2. l. 21. 907.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra minor *C. B. P. 245. Morif. Hist. 2. 271.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra minor latifolia *I. Raj. Catal. 194.*

* *Lyfimachia* filiquosa glabra angustifolia *C. B. P. 245.*

LYSIMACHIA lutea corniculata non papposa Virginiana major *Morif. Hist. 2. 271.*

Lyfimachia lutea corniculata *C. B. P. 245. ANN.*

Eadem flore sulphureo. *ANN.*

Lyfimachia lutea corniculata non papposa, Virginiana minor *Morif. Hist. 2. 271. ANN.*

Lyfimachia Indica non papposa, flore luteo minimo filiquis Caryophyllum aromaticum æmulante. *Carambu. Hort. Malab. tom. 2. 95.*

LY-

* **L**YSIMACHIA lutea major, quæ Diosc. *C. B. P.* 245. *Lyfimachia lutea I. B. tom. 2. l. 21. 903.* Blattariæ affinis planta major, flore luteo *Morif. Hist. 2. 491.*

* *Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis C. B. P. 245. Lyfimachia lutea minor I. B. tom. 2. l. 21. 904.* Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis *Morif. Hist. 2. 491.*

Lyfimachia semper virens spicata, Ephemeron dicta, Blattariæ flore. Ephemeron Matthioli vel potius Ephemeron spurium C. B. P. 244. Blattariæ affinis, planta bifolia lævis, flore albo, Ephemeron Morif. Hist. 2. 491.

* *Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo C. B. P. 245. Lyfimachia lutea altera Lobelio, flore quasi spicato I. B. tom. 2. l. 21. 904.*

* *Lyfimachia spicata purpurea fortè Plinii C. B. P. 246. Lyfimachia purpurea quibusdam spicata I. B. tom. 2 l. 21. Blattaria rubra spicata major glabra communis, folio acuto Morif. Hist. 2. 490.*

Eadem folio subrotundo Ocymi facie.

Omnibus notis præcedenti respondet, exceptis foliis subrotundis Ocymi facie. Habemus ex Angliâ ubi sponte nascitur.

Lyfimachia spicata purpurea affinis Hyssopifolia. Hyssopifolia C. B. P. 219. Hyssopifolia aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 792.

Lyfi-

Lysimachia spicata cœrulea C. B. P. v. *Veronica*.

Lysimachia cœrulea galericulata C. B. P. v.

Scutellaria.

M.



ahaleb I. B. v. *Ceraso* affinis,

MAJORANA tenuifolia C. B. P. 224. *Ma-*
ajorana tenuior & lignosior I. B. tom. 3. l.

28. 141.

Majorana vulgaris C. B. P. 224.

Majorana latifolia aurea Park. *Theatr.* 12.

Majorana sylvestris perennis C. B. P. 224. *Ori-*
ganum Heracleoticum Ruellii, sive *Majo-*
rana major I. B. tom. 3. l. 28. 257.

Majorana rotundifolia scutellata exotica Cat.

Hort. Reg. Paris. 114. *Origano cognata*

Zatarhendi C. B. P. 223. *Zatarhendi Herba*

I. B. *Zatarhendi Origanum Indicum* *Vesling.*

Observ. 31.

Majorana Syriaca vel Cretica. v. *Marum*.

MALVA hirsuta, folio cordato *Moris. Hist.*
2. 520. ANN.

Malva annua trimestris, flore cum unguibus
purpureis, seminibus multis nigris rotun-
dis, subter membranaceis duplicatis orbicu-
lis latentibus *Moris. Hist.* 2. 320. *Malva tri-*
mestris, flore cum unguibus purpureis I. B.

tom.

tom. 2. l. 23. 950. ANN.

Malva annua, foliis crispis *Morif. Hist. 2. 520.*

Malva foliis crispis *C. B. P. 314. Malva crispa*
I. B. tom. 2. 23. 952. ANN.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium
minimis albis, pentapetalis, verticillatim ge-
nicula ambientibus, & seminibus arctè iis-
dem verticillatim adhærentibus *Morif. Hist.*
2. 521. ANN.

Malva annua hirsuta, foliis Hederæ instar an-
gulosis *Morif. Hist. 2. 521. ANN.*

Malva sylvestris perennis procumbens, flore
minore albo, folio rotundo *Morif. Hist. 2.*
521. Malva sylvestris, folio rotundo C. B. P.
314. Malva vulgaris, flore minore, folio ro-
tundo I. B. tom. 2. l. 23. 949.

Eadem variegato folio *Cat. Hort. Reg. Paris.*
114.

Malva sylvestris procerior seu elatior rectavè,
flore majore subrubente aut purpureo, ve-
nis saturatè purpureis picto, folio sinuato
Morif. Hist. 2. 521. Malva sylvestris, folio si-
nuato C. B. P. 314. Malva vulgaris, flore
majore, folio sinuato I. B. tom. 2. l. 23. 949.

Eadem flore albo *Cat. Edinb. Sutherl. 219.*

Malva perennis Hispanica, flore carneo amplo
Morif. Hist. 2. 522.

Eadem flore incarnato, vel eleganter rubello
colore *Morif. Hist. 2. 522. descr.*

Malva sylvestris Betonicæ folio *Boccon. desc.*
& Ic.

& Ic. 15. *Zanoa. Hist. Botan.* 130. *Morif. Hist.* 2. 522.

Malva sylvestris, vel palustris, aut Ibiscus *Morif. Hist.* 2. 523. Althæa Dioscoridis & Plinii *C. B. P.* 315. Althæa, sive Bismalva *I. B. tom.* 2. l. 23. 954.

Eadem folio rotundiori, sive minus acuminato *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 19.

Eadem folio angulosiori.

Malva Hispanica, foliis mollibus undulatis, in margine superiùs micis sulphureis ad solem splendentibus donatis *Morif. Hist.* 2. 523.

Malva maritima Arborea Veneta dicta, parvo flore *Morif. Hist.* 2. 523. Malva Arborea, Veneta dicta, parvo flore *C. B. P.* 315. An Malva Arborea *I. B. tom.* 2. 952? ANN.

Malva maritima Arborea Britannica *Morif. Hist.* 2. 523. ANN.

Malva frutescens, folio auriculato, Hederae instar *Morif. Hist.* 2. 523. Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore *C. B. P.* 316.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore simplici *Morif. Hist.* 2. 524. Malva Rosea, folio subrotundo *C. B. P.* Malva Rosea, sive hortensis *I. B. tom.* 3. l. 23. 951. Floribus candidis *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus saturatiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus dilutiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem

Eadem floribus purpuræ modo relucetibus
C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus ex rubro nigricantibus C. B. P.
Var. 315.

Eadem floribus incarnatis C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus sulphureis *Morif. Hist.* 2. 524.

Eadem floribus luteis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
115.

Eadem floribus violaceis *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore pleno
C. B. P. 315. *Morif. Hist.* 2. 524. Flore albo
C. B. P. *Var.*

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore rubro C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore puniceo C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore nigricante C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Eadem flore subluteo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Malva Rosea peregrina, folio Ficus obscure vi-
ridi *Morif. Hist.* 2. 524. Malva Rosea, folio
Ficus C. B. P. 315. Flore simplici atro-pur-
pureo.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Par.* 115.

Eadem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore nigricante *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva peregrina folio Ficus flore pleno atro-
purpurante *Jonqu. Hort.* 81.

Eadem flore incarnato pleno *Cat. Hort. Altorf. Hoffm.*

Eadem flore luteo pleno *Cat. Hort. Alt. Hofm.*

Eadem flore albo pleno *Cat. Hort. Alt. Hofm.*

Malva Rosea, folio Ficus altera C. B. P. 315.

Flore nigricante.

Eadem flore rubro.

MALUS sylvestris major, fructu albo
Ionst. de Arbor. 2. Mala sylvestria alba
majora C. B. P. 435.

Eadem fructu rubente *Ionst. de Arbor. 2.* Mala
sylvestria rubra majora C. B. P. 435.

Malus sylvestris minor *Ionst. de Arbor. 3.* Mala
sylvestria minora C. B. P. 435. Malus sylve-
stris, fructu parvo flavescente *I. B. tom. 1.*
l. 1. 26. descr.

Eadem fructu rubente *I. B. tom. 1. l. 1. 26. descr.*

Malus domestica vulgaris *Ionst. de Arbor. 2.*

Pomus sive Malum C. B. P. 434. Malus *I. B.*
tom. 1. l. 1. 1.

Eadem flore pleno C. B. P. 435.

Malus prægrandis præcox tenerrima *Cat.*
Hort. Med. Paris. 115.

Mala Porstoriana *I. B. tom. 1. l. 1. 5.* Curti-
pendula *I. B. tom. 1. l. 1. 21.* Redolentia
vulgò.

Mala Prasomela C. B. P. *descr. I. B. tom. 1. l. 1. 6.*
Renetica vulgò.

Mala Oenomela vinosa *I. B. tom. 1. l. 1. 9.*

Re-

Mala pentagona perelegantia acido dulcia
utrinque sessilia *I. B. tom. 1. l. 1. 10.*

Mala duracina alba *I. B. tom. 1. l. 1. 5.*

Mala duracina striata seu Mala D. Matthiæ
I. B. tom. 1. l. 1. 14.

Mala Presiliana *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala Vitrea *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala turbinata dulcia *I. B. tom. 1. l. 1. 19.*

Malorum domesticorum, præcocium, medio-
rum, ferotinorum, dulcium, acidorum, vi-
nosorum, variæ diversitates, multiplicæ in-
sitionis ingenio productæ.

Malus pumila, quæ potius frutex, quàm ar-
bor *C. B. P. 435.*

Eadem fructu candido *C. B. P. Var. 435.*

Ejusdem aliæ differentiæ, fructuum magnitu-
dine, figurâ, colore, sapore & tempore ma-
turescendi inter se discretæ.

Malus non florens fructificans tamen *C. B. P.*
435. Malus fructifera, fugaci flore *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 115. Malus non florida
dicta *I. B. tom. 1. l. 1. 21.*

MALUS Cydonia, fructu brevior & rotun-
diorè *Cat. Hort. Reg. Paris. 115.* Mala
Cotonea minora *C. B. P. 434.*

Malus Cydonia, fructu oblongo & læviori
Cat. Hort. Reg. Paris. 116. Mala Cotonea
majora *C. B. P. 434.* Cotonea malus *I. B.*
tom. 1. l. 1. 27.

Malus Cotonea sylvestris C. B. P. 435. Coto-
nea sylvestris I. B. tom. 1. l. 1. 35.

MALUS Citria, fructu mediocri I. B. tom. 1.
l. 1. 94. Malus Medica C. B. P. 435. Ma-
lum Citreum vulgare Ferr. Hesp. 56. Citrus
vulgò.

Malus Citria, fructu magno I. B. tom. 1. l. 1. 94.

Malus Medica, fructu ingenti tuberoso C. B.
P. 435.

Malus Citrea, dulci medullâ Fer. Hesp. 73.

MALUS Limonia acida C. B. P. 436. Limo-
nia malus I. B. tom. 1. l. 1. 96. Limon vul-
garis Fer. Hesper. 191.

Malus Limonia major dulcis C. B. P. 436. Li-
mon dulci medullâ Ferr. Hesp. 227.

Malus Limonia, fructu rotundo orbiculato. C.
B. P. 436.

Malus Limonia Sbardonii. Limon Sbardonius
Fer. Hesp. 251.

Malus Limonia pusilla Calabrica. Limon pu-
sillus Calaber. Fer. Hesp. 209.

Eadem minor, foliis Phillyreæ Fer. Hesp.
desc. 209.

Malus Limonia Spatafora dicta Cat. Hort.
Reg. Par. 116. Limon Spatafora Rhegius
Fer. Hesp. 239.

Malus Limonia Ligustica. Limon Ligusticus
seu St. Remi Fer. Hesp. 195.

Malus Limonia, fructu pyriformi. Limon
Pyri

Pyri effigie, vulgò Peretta, sive Spatafora
Fer. Hesp. 231.

Eadem fructu longiori. Limon Perettæ con-
similis *Fer. Hesp. 237.*

Malus Limonia, fructu superficie Aurantii.

Adami pomum *Fer. Hesp. 313* Malus Adami

C. B. P. 437. Poma Adami l. B. tom. 1. l. 1. 99.

Malus Limonia minor acida *Cat. Hort. Reg.*

Par. 331. Limon, qui Lima nuncupatur,
acris *Ferr. Hesp. 331.*

Eadem dulcis. Limon, qui Lima nuncupatur,
dulcis *Ferr. Hesp. 331.*

Malus Limonia Citrata. Limon Citratus pri-
mæ notæ lævior *Ferr. Hesp. 265.*

Eadem fructu fructum includente. Limon Ci-
tratus alterum includens *Fer. Hesp. 269.*

Limones prægnantes, alium fructum mino-
rem in se continentes C. B. P. 436.

MALUS Arantia Indica, fructu omnium
maximo, Pumpelmus dicto medullâ pal-
lescente.

Eadem medullâ rufescente.

Utraque hæc Arantia partium omnium
prodigiosâ magnitudine à cæteris conge-
neribus discriminatur, imprimis fructu hu-
manum caput aliquando excedente, pulpâ
intus vinosâ sapidissimâ, coloris vel rufes-
centis vel pallescentis. Colitur in Poma-
riis Javæ Zeylonæ aliarumque Indiæ O-

rientalis regionum. Sub nostro climate, licet ex satis feminibus facili negotio in elegantem arborem adolescat, hætenus tamen fructus nullos peperit, quicquid etiam artis & industriæ à nobis adhibitum.

Malus Arantia major *C. B. P.* 436. Arantia malus *I. B. tom.* 1. l. 1. 97. Aurantium vulgare *Fer. Hesp.* 474. Medulla acida.

Eadem acri dulciquæ medullâ. Aurantium acri dulciquæ medullâ vulgare *Fer. Hesp.* 377.

Malus Arantia sylvestris *I. B. tom.* 1. l. 1. desc. Aurantium sylvestre, medullâ acriori *Fer. Hesp.*

Malus Arantia, folio crispo. Aurantium crispo folio *Fer. Hesp.* 387.

Malus Arantia, fructu stellato & roseo. Aurantium stellatum & roseum *Fer. Hesp.* 393.

Malus Arantia, foliis & fructu variegatis *Cat. Hort. Reg. Par.* 116. Aurantium virgatum striatumquæ *Fer. Hesp.* 397. Foliis latioribus.

Eadem foliis angustioribus.

Malus Arantia, fructu corniculato. Aurantium Hermaphroditum dictum, sive corniculatum *Fer. Hesp.* 407. Fructu majori.

Eadem fructu minori *Cat. Hort. Reg. Paris.* 116.

Malus Arantia Lusitanica *Cat. Hort. Reg. Par.* 116. Aurantium Olyssiponense *Fer. Hesp.*

425. Pomum Sinense Belgis.

Malus Arantia, fructus cortice dulci. Aurantium dulci cortice *Fer. Hesp.* 430.

Malus Arantia, Lauri angustis foliis *Boccon. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia, fructu Arantii malo Citrio prægnantis. Malum Aurantium malo Citrio prægnans *Boccon. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia hermaphrodita, fructu medio Citrio, medioquè Arantio, odoratissimo.

Inter hortensia miracula, multivario cultu & insitionis artificio producta, annumerandum est hoc Arantium, quod tam fructus suavissimâ fragrantia, quam mirificâ conformatione sese commendat. Arbor est ramosâ densitate, staturâ ab Arantia non multum abhorrens. Ramorum duplex conspicitur facies. Alii foliis floribus & fructibus Arantiam omnino æmulantur; Alii mediam obtinent naturam inter Citrum & Arantiam: Folia angusta longula, superficie inæquali scabrâ, viridi sulphureoque colore subinde maculata, marginibus aliquando leviter in crispatis aut nonnihil ferratis: Flores ex albo modestè rubent: Fructus gemello partu fecundi parte altera Arantium alterâ Citrum exprimunt, distinguente hunc geminum foetum commissurâ utriusquè callosâ scabrâ productiori.

Malus Arantia humilis C.B.P. 436. Aurantium
Sinense *Fer. Hesp.* 430.

MALUS Punica sativa C.B.P. 438. Malus Punica I. B. *tom.* 1. l. 1. 76. Granata vulgò.
Eadem fructu dulci *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Malus Punica, flore pleno *Cat. Hort. Reg. Par.* 117. Balauſtia flore pleno n. ajore C.B. P. 438. Balauſtia Hispanica I. B. *tom.* 1. l. 82.

Malus Punica, flore pleno majore variegato
Cat. Hort. Reg. Par. 117.

Malus Persica C.B.P. v. Persica.

Malus Armeniaca C.B.P. v. Armeniaca.

Mamæra Fœmina *Clus.* v. Pepo arboreſcens.

MANDRAGORA, fructu rotundo C. B. P. 169. Mandragora Mas I. B. *tom.* 3. l. 34. 617.
Mandragora, fructu Pyri C. B. P. 169. Mandragora Fœmina I. B. *tom.* 3. l. 34. 618.

Mannæ Gramen. v. Gramen dactylon.

Maracot Indicum *Aldin.* v. Cucumis.

Maragoſa Luſitan. v. Cucumis.

MARRUBIUM paluſtre glabrum C. B. P. 230. Marrubium aquaticum quorundam
I. B. *tom.* 3. l. 28. 318.

* Idem foliis tenuiùs diſſectis *Moriſ. Hiſt. Bleſ.* 131. & 286.

* Idem foliis profundiffimè diſſectis.

Mar-

* Marrubium nigrum foetidum. Ballote Dioscoridis C. B. P. 230. Marrubium nigrum sive Balote I. B. tom. 3. l. 28. 318.

Marrubium nigrum, rotundifolium C. B. P. 230.

Marrubium nigrum longifolium C. B. P. 230. Herba venti Monspelienfibus vulgò.

* Marrubium album vulgare C. B. P. 230. Marrubium album I. B. tom. 3. l. 28. 316.

Marrubium album latifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium candidum, folio subrotundo I. B. tom. 3. l. 28. 317.

Marrubium album angustifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium album, angustiore folio I. B. tom. 3. l. 28. 317.

Marrubium Alysson dictum, foliis profundè incisis. Alysson verticillatum, foliis profundè incisis C. B. P. 232.

MARUM Syriacum vel Creticum. Majorana Syriaca vel Cretica C. B. P. 224.

Marum Mastichen redolens C. B. P. v. Clinopodium.

Mastichi a Gallorum I. B. v. Clinopodium.

MATRICARIA sylvestris, flore toto luteo C. B. P. 133.

Matricaria vulgaris, seu fativa C. B. P. 133.

Matricaria vulgo, minus Parthenium I. B. tom. 3. l. 26. 129.

Eadem caulibus rubentibus.

Eadem floribus nudis bullatis. *Matricaria* nuda *Morif. Hort. Bles.* 131. *Matricaria* flore aphylo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 118.

Eadem florum petalis fistulosis.

Matricaria flore pleno C. B. P. 134. I. B. tom. 3. l. 26. 130. Petalis planis.

Eadem petalis fistulosis. *Matricaria* foliis florum fistulosis *Cat. Hort. Reg. Par.* 118.

Eadem petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis.

Maizio seu Mays. v. *Frumentum Indicum.*


Medica cochleata major *διχαρπ*Ⓢ, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ, nigrâ planâ, oris crispis *Morif. Hist.* 2. 152. *Trifolium cochleatum* vel *scutellatum*, fructu latiore, folio minuto obtuso C. B. P. 329. *Medica orbiculata* I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Eadem capsulâ lævi sine oris crispis *Morif. Hist.* 2. 152. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ*Ⓢ, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ rugosâ albâ *Morif. Hist.* 2. 152. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ*Ⓢ, fructus capsulâ rotundâ globosâ scutellatâ *Morif. Hist.* 2. 152. *Trifolium cochleatum* fructu latiore C. B. P. 329. *Medica scutellata* I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Medica cochleata major *διχαρπ*Ⓢ, fructus capsulâ turbinatâ planâ *Morif. Hist.* 2. 343. ANN.
Me-

Medica cochleata major *δικάρπ* , fructus capsulâ turbinatâ rugosâ *Morif. Hist. 2. 153.*

Medica magna turbinata *I. B. tom. 2. l. 17.*

385. An Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata major *δικάρπος* spinosa, seu capsulâ rotundiore majore, spinis paucioribus & rigidioribus *Morif. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata major *δικάρπος* spinosa, capsulâ seu spinis longioribus, sursum & deorsum tendentibus *Morif. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata, echinis omnibus erectis *Park. Ic. Cat. Hort. Reg. Par. 129.* ANN.

Medica cochleata *δικάρπος*, capsulâ spinosâ rotundâ minore, rarius spinis crassioribus & levioribus armatâ *Morif. Hist. 2. 153.* Medica hirsuta, echinis rigidioribus *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* Trifolium fructu compresso, spinis horrido *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata *δικάρπος*, capsulâ spinosâ crassiore, & spinulis brevibus & rarius dispositis armata *Morif. Hist. 2. 154.* Medica echinata magna hirsuta *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* ANN.

Medica cochleata *πολύκαρπος*, capsulâ spinosâ minore, perennis, incana maritima *Morif. Hist. 2. 154.* Trifolium cochleatum maritimum tomentosum *C. B. P. 329.* Trifolium cochleatum maritimum, sive medica mari-

na *I. B. tom. 2. l. 17. 378. ANN.*

Medica cochleata δύνκαρος, capsulâ rotundâ spinosâ; foliis eleganter dissectis. Trifolium echinato capite *Dod. Mem. 123. Trifolium cochleatum spinosum Syriacum, foliis lacinatis Breyn. Cent. 1. 81. ANN.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua, capsulâ majore albâ, folio cordato maculâ fuscâ notato *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, folio cordato maculato C. B. P. 329. Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.*

Eadem sine maculis nigricantibus *I. B. tom. 2. l. 17. 384. & descr. 385.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua capsulâ nigrâ hispidiore *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, fructu nigro hispidulo C. B. P. 329. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minimâ rotundâ *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 329. Medica echinata minima I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minima, coronatâ *Morif. Hist. 2. 154. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 230. Medica echinata minima I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minima coronatâ *Morif. Hist. 2. 145. Medica*

dica coronata Cherleri parva I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.

Medica sylvestris frutescens, filiquâ cornutâ tortili *Morif. Hist. 2. 157.* Trifolium sylvestre luteum, filiquâ cornutâ, vel Medica frutescens C. B. P. 330. Medica sylvestris I. B. tom. 2. l. 17. 383.

Eadem flore coeruleo C. B. P. Var. 330.

Eadem flore violaceo C. B. P. Var. 330.

Eadem flore fusco.

Eadem flore viridi.

Eadem flore ex luteo & violaceo mixto C. B. P. Var. 330.

Medica sativa, filiquâ cornutâ magis tortili *Morif. Hist. 2. 158.* Trifolium filiquâ cornutâ sive Medica C. B. P. 330. Medica major erectior, floribus purpurascens I. B. tom. 2. l. 17. 382. Fœnum Burgundiacum vulgò.

Medica annua filiquâ falcatâ, crenatâ *Morif. Hist. 2. 258.* Trifolium filiquâ falcatâ C. B. P. Medica lunata I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.

Medica frutescens incana, seu Trifolium frutescens incanum, filiquâ falcatâ planâ *Morif. Hist. 2. 158.* Cytisus incanus, filiquis falcatis C. B. P. 389. Cytisus filiquâ incurvâ, folio candicante I. B. tom. 1. l. II. 366.

Medium I. B. v. Campanula.

- * **M**ELAMPYRUM purpurascens comâ
 C. B. P. 234. Melampyrum multis, sive
 Triticum vaccinium I. B. tom. 3. l. 40. 439.
 Melampyrum cœruleâ comâ C. B. P. Melam-
 pyro affinis, Parietaria cœrulea quorun-
 dam I. B. tom. 3. l. 30. 440. Parietaria Li-
 psiensium vulgô. ANN.
 Melampyrum luteum latifolium C. B. P. 234.
 Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive
 Satureia lutea sylvestris I. B. tom. 3. l. 30.
 441. ANN.
 Melampyrum cristatum, flore albo & purpu-
 reo I. B. tom. 3. l. 30. 440. ANN.
Melanthium ejusque species I. B. v. Nigella.
Meleagris I. B. v. Fritillaria.

MELIANTHUS Africanus. Pimpinella spi-
 cata maxima Africana Barthol. Act. Hafn.
 An. 1673. Vol. 2. p. 58.

Mellifera hæc Africana planta, cujus so-
 bolem Anno M. DC. LXXII. ex Promontorio
 Bonæ Spei Hafniam ad Cl. Bartholinum
 transmiseram, superiori demum anno ope-
 râ Cl. Viri Petri Hotton inde in Belgiam
 reducis huc delata & Curiosorum Hortis
 familiaris facta est, Radice nititur vivaci
 lignosâ crassâ pallidâ brachiatâ longo pro-
 fundoquè reptatu hinc inde diffusa. Scapo
 multiplici supra viri altitudinem assurgente,
 viroris & vigoris perpetui, pollicem crasso

LUGDUNO-BATAVUS. 415
MELIANTHUS AFRICANUS.



rotundo, striato, scabro, geniculato, ad radicem lignoso, solido, in progressu ex ruffo virente, &, ubi in floriferam spicam fastigiatur, punicante, facîle ex geniculis in terram demissis sese propagante. Foliis pinnatis, facie Pimpinellæ, ast sextuplo amplioribus, rigentibus, nervosis, per ambitum profundius serratis, colore in glauco virente, costâ mediâ ad summum usque, cui folia ex adverso strictius adhærent, alatâ & crenatâ, parte verò imâ & pronâ contactâ folio, digitum longo concolori integro, latâ suâ carinataquè basi, quâ ad scapi genicula prorumpit, in mucronem porrecto, & costæ, instar linguæ, incumbente; Odore foetido narcotico gravi, sapore herbaceo parùm adstringente. Floribus in summo numerosis, nudis, ex nigro puniceis, in spicam congestis, hærentibus ex petiolis longulis punicantibus tenui rarâquè concolori lanugine pubescentibus; quibus singulis subjicitur foliolum nunc puniceum nunc ex puniceo virescens, unguem adæquans & in deltoideam effigiem gracilescens. Flos ut plurimum quinque construitur petalis, ex floris fundo ampliori, cui arctè junguntur, in longum protensis, duobus supernis latioribus & longioribus, binis lateralibus brevioribus & angustioribus, unico inferno brevissimo carinato, Hoc in flore constan-

stantur deprehenditur, reliquorum verò
 numerus & amplitudo variant. Ex his pro-
 fluunt decem stamina punicei saturati colo-
 ris, quinque longiora & tenuiora apicibus
 flavescentibus parvis, totidemque breviora
 apicibus rubustioribus, levissimâ concussi-
 one deciduis. Inferiori petalo includitur
 receptaculum cartilagineum cariniforme,
 refertum liquore melleo diluto puniceo, sa-
 poris vinosi jucundissimi. Hunc à Belgis
 ad Bonæ Spei Promontorium degentibus
 non inepto nomine Melianthus sive Flos
 mellis apellatur. Mellea verò hæc substan-
 tia, neutiquam videtur productum roris
 seu aëris in flore collecti, sed eo ipso, quo
 flos perficitur, incipit ex porulis & villulis
 internæ floris baseos, instar subtilissimi va-
 poris emanare & in hiantem hanc carinulam
 deponi. Sive enim plantam mox flores pa-
 rituram aëre liberiori exposueris, sive in
 conclavi diligenter custodiveris, æquam
 mellis proportionem observabis, tantâ u-
 trobique ubertate, ut in subjecta folia stilla-
 tim defluat. Melle florequè exarescente se-
 quitur vasculum ventriosum membraneum,
 facie & magnitudine Nigellæ fructum adæ-
 quans, tetragonum, quaternis dissepimen-
 tis distinctum, quasi ex totidem vasculis
 esset compactum, singula continent semen
 ovale nigrum lucidum, semini Pæoniæ sup-

par. Sponte sua luxuriat locis udosis & paludosis ad Promontorium Bonæ spei. Transposita in hortos mirum in modum multiplicatur, brumam rigidiusculam quamvis patienter ferat, tamen custodienda est in commodo hybernaculo, ne flores, quos mediâ sæpe hyeme suppetere solet, vitium capiant & pereant. Floris Nectar uti vinoso & suavi suo sapore melli vulgari nihil cedit, ita virtutibus, ni illud superet, saltem adæquat. Eo adeò delectantur Hottentotti & nunc quoque Belgæ, ut Melianthum nunquam prætereant, quin Melleam ejus dulcedinem avidè resorbeant.

* **M**ELILOTUS fruticosa candida major. *Morif. Hist.* 2. 161. Melilotus Officinarum Germaniæ, flore albo. *C. B. P.* 331. Trifolium odoratum sive Melilotus vulgaris, flore candido *I. B. tom.* 2. l. 17. 370. ANN.

* Melilotus fruticosa lutea vulgaris, vel Officinarum. *Morif. Hist.* 2. 161. Melilotus Officinarum Germaniæ *C. B. P.* 331. Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 17. 370. ANN.

Eadem humilior, foliis & floribus minoribus pallidè flavescentibus. ANN.

Eadem filiculis longioribus. Dodonæi *Morif. Hist.* 2. 161. ANN.

Me-

Melilotus lutea, seminis pericarpio magno rugoso rotundo albo. *Morif. Hist.* 2. 161. **Melilotus Italica**, folliculis rotundis *C. B. P.* 331. **Melilotus** magno semine rotundo rugoso. *I. B. tom.* 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minor, floribus & filiculis minoribus, spicatim & densè dispositis *Morif. Hist.* 2. 161. ANN.

Melilotus lutea minima procumbens palmaris & sesquipalmaris, folio minore & angustiore *Morif. Hist.* 2. 162. **Meliloto vulgari nostrati affinis**, folio minore & angustiore *I. B. tom.* 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minima hirsuta procumbens, spicâ breviori densissimè disposita, seminis pericarpio renali nigro *Morif. Hist.* 2. 162. **Trifolium pratense luteum capitulo breviori** *C. B. P.* 328. **Trifolium pratense luteum mas**, flore minore semine multo *I. B. tom.* 2. l. 17. 380. ANN.

Melilotus minima recta lutea, siliquis crassis, curtis, in capitulum congestis, semine *Fœnugræci* *Morif. Hist.* 2. 162. ANN.

Melilotus major odorata violacea *Morif. Hist.* 2. 162. **Lotus hortensis odora** *C. B. P.* 331. **Lotus sativa odorata annua**, flore cœruleo *I. B. tom.* 2. l. 17. 368.

* **Melilotus lutea major**, corniculis inflexis ex eodem centro ortis *Morif. Hist.* 2. 162. **Melilo-**

tus corniculis reflexis major C. B. P. 331.
 Trifolium Italicum, sive Melilotus Italica
 corniculis incurvis I. B. tom. 2. l. 17. 372.
 ANN.

MELISSA hortensis C. B. P. 229. Melissa
 vulgaris odore Citri I. B. tom. 3. l. 28. 232.
 Melissa peregrina, folio oblongo C. B. P. 229.
 Melissa Turcica multis dicta I. B. tom. 3. l. 28.
 234. Flore cœruleo C. B. P. Var. 229. ANN.
 Eadem flore albo C. B. P. Var. 229. I. B. descr.
 tom. 3. l. 28. 234. ANN.
 Melissa Moluccana odorata. C. B. P. v. Mo-
 lucca.

Melissa Moluccana fœtida C. B. P. v. Molucca.

MELO Hispanicus I. B. tom. 2. l. 16. 244.
 Morif. Hist. 2. 29. ANN.

Melo vulgaris C. B. P. 310. Morif. Hist. 2. 29.

Melones I. B. tom. 2. l. 16. 242. ANN.

Idem reticulatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem turbinatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem sessilis C. B. P. Var. 310. ANN.

Ejusdem aliæ varietates fructus formâ colore,
 sapore & odore discretæ.

Melo Moschatellinus rotundus parvus seu Me-
 lo sacharinus dictus I. Bauhino Morif. Hist.

2. 40. Melo rotundus parvus C. B. P. 311.

Melo Moschatellinus rotundus parvus I. B.
 tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem pyriformis I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Melo

Melo-pepo clypeiformis C. B. P. v. Pepo.

Melo-pepo compressus C. B. P. v. Pepo.

Melochia I. B. v. Corchorus.

Melocotonea quorundam I. B. v. Persica.

MENTHA hortensis verticillata, Ocymi
odore C. B. P. 227. Mentha verticillata
minor acuta non crispa, odore Ocymi I. B.
tom. 3. l. 28. 216.

Mentha arvensis verticillata hirsuta I. B. tom.
3. l. 28. 217. Calamintha arvensis verticil-
lata C. B. P. 229.

Mentha crispa verticillata C. B. P. 227. Mentha
crispa verticillata, folio rotundiore I. B. tom.
3. l. 28. 216.

Mentha crispa Danica aut Germanica specio-
sa *Parkinsf. Theatr.* 32.

Mentha rotundifolia crispa spicata C. B. P. 227.
I. B. tom. 3. l. 28. 218.

Eadem foliis rotundioribus rugosis. Mentha
rotundifolia spicata altera C. B. P. 227. Men-
thastrum spicatum cultum, folio rotundiore
rugoso I. B. tom. 3. l. 28. 219.

Mentha spicata, folio variegato C. P. B. 227.

Menthastrum spicatum, folio crispo rotun-
diore, colore partim albo, partim cinereo
vel virente I. B. tom. 3. l. 28. 219.

* Mentha angustifolia spicata C. B. P. 227. Men-
tha spicata, folio longiore, acuto glabro ni-
griori I. B. tom. 3. l. 28. 220.

* *Mentha sylvestris*, rotundiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato odore gravi, I. B. tom. 3. l. 28. 219.

* *Mentha sylvestris* longiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum spicatum, folio longiore can-
 dicante I. B. tom. 3. l. 28. 221.

* *Mentha rotundifolia palustris*, seu *aquatica*
major C. B. P. 227. *Mentha aquatica* sive *Sisymbrium* I. B. tom. 3. l. 28. 223. Foliis gla-
 bris.

Eadem floribus conglomeratis, Foliis hirsutis.
Mentha aquatica, sive *Sisymbrium* hirsu-
 tius I. B. tom. 3. l. 28. 224.

* *Mentha palustris*, folio oblongo. C. B. P. 228.
Menthastrum aquatici genus hirsutum, spicâ la-
 tiore I. B. tom. 3. l. 28. 222.

Mentha hortensis corymbifera C. B. P. v. Ta-
 nacetum.

Mentha tuberosâ radice C. B. P. v. Calamin-
 tha.

Mentha cattaria ejusque species C. B. P. & I.
 B. v. Calamintha.

Menthastrum ejusque species I. B. v. *Mentha*.

Menthastrum tuberosâ radice I. B. v. Calamin-
 tha.

* **M**ERCURIALIS testiculata, sive Mas
 Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. Morisf.
 Hist.

Hist. 2. 612. Mercurialis Mas I. B. tom. 2. l. 23. 677. ANN.

* Mercurialis spicata, sive Fœmina, Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. *Morif. Hist.* 2. 612. Mercurialis Fœmina I. B. tom. 2. l. 23. 677. ANN.

Mercurialis montana testiculata C. B. P. 122. Cynocrambe Mas, sive Mercurialis repens. I. B. tom. 2. l. 23. 979.

Mercurialis montana spicata C. B. P. 122. *Morif. Hist.* 2. 613. Cynocrambe Fœmina, sive Mercurialis repens. I. B. tom. 2. l. 23. 979.

Mercurialis perennis maritima incana, Phyllon dicta testiculata. *Morif. Hist.* 2. 613. Phyllon testiculatum, C. B. P. 122. Phyllon Arrhenogonon, folio incano Monspefful. I. B. tom. 2. l. 23. 981.

Merulius I. B. v. Fungus.

MESPILUS Germanica, folio Laurino non ferrato C. B. P. 453. Mespilus vulgaris I. B. tom. 1. l. 1. 69.

Mespilus folio Laurino major C. B. P. 453.

Mespilus spinosa sive Oxyacantha maxima Virginiana.

Mespilus spinosa sive Oxyacantha Virginiana nigra.

Mespilus Apii folio laciniato C. B. P. 453. Mespilus Aronia Veterum I. B. tom. 1. l. 1. 67. Spinosa flore simplici,

Eadem flore pleno.

Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, sive
Oxyacantha C. B. P. 454. Sorbus tormina-
lis & Crataegus Theophrasti I. B. tom. 1. l. 1. 63.

* Mespilus Apii folio sylvestris spinosa sive
Oxyacantha C. B. P. 454. Oxyacantha vul-
garis sive Spinus albus I. B. tom. 1. l. 6. 44.

Mespilus spinosa Pyri folio. Oxyacantha Dio-
scoridis sive Spina acuta Pyri folio C. B. P.
454. Pyracantha quibusdam I. B. tom. 1.
l. 6. 51.

Mespilus Alni lanato folio minor. Alni effigie
lanato folio minor C. B. P. 452. Dyopsyrus
I. B. tom. 1. l. 1. 75.

Mespilus Alni lanato folio major. Alni effigie
lanato folio major C. B. P. 452. Sorbus Al-
pina I. B. tom. 1. l. 1. 65. Aria Theophrasti
vulgò.

Mespilus humilis, folio mali Cydoniæ rotundo
non ferrato. Cotoneaster folio rotundo non
ferrato C. B. P. 452. Chamæmespilus Cordi
C. B. P. 432. Cotoneaster I. B. tom. 1. l. 1. 73.

Idem folio oblongo ferrato C. B. P. Chamæ-
mespilus I. B. tom. 1. l. 1. 72.

M EUM foliis Anethi C. B. P. 148. Meum
Athamanticum Moris. Umbell. 4. Meum
vulgare, sive Radix ursina I. B. tom. 3. l.
27. 11.

Meum spurium Moris. Umbell. 5. Meum lati-
folium

folium adulterinum C. B. P. 148. Meum Al-
terum Italicum quibusdam *I. B. tom. 3. l.*
27. 15.

Mezereum Germanicum I. B. v. Laureola.

MILIMUM semine luteo C. B. P. 26. Milium
semine fulvo vel aureo *I. B. tom. 2. l. 18.*
446. descr. ANN.

Milium semine albo C. B. P. 26. *I. B. tom. 2. l. 18.*
446. descr. ANN.

Milium semine nigro C. B. P. 26. *I. B. tom. 2.*
l. 18. 446. ANN.

Milium Indicum Arundinaceo caule, granis
flavescentibus. ANN.

In septenum pedum altitudinem assur-
git, culmo Arundineo, digitum crasso, quem
à geniculo ad geniculum involvunt folia
frumento Indico angustiora & longiora, li-
neâ albâ per mediam longitudinem notata.

In summitate erigitur juba dodrantalis pu-
gni crassitudine, multis paniculis strictius
invicem junctis coacervata, flores lanu-
gineos pendulos Milii instar flavescentes
proferens, quibus defluentibus succedunt
grana copiosa rotunda nitida dura pallida
farinacea magnitudine Orobi, singula infi-
dent caliculis bifidis, parvis nigris splen-
dentibus. Consulatur Casparus Bauhinus,
qui hoc in *Theatro Botanico* 488. ex Hi-
storiâ Indiæ Orientalis, nomine Frumenti.

Indici, quod Milium Indicum vocant, videtur proposuisse.

Milium Indicum, Arundinaceo caule, granis nigris. ANN.

Hoc cum priori convenit crescendi modo & formâ, ita tamen, ut grana ferat nigra lucida, in summo non nihil tomentosa. Utrumquè Milium, quanquam in Vtraquè India omnium frugum fertilissimum sit, factum tamen in hortis nostris difficulter ad frugem perducitur.

Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgho nominatum C. B. P. 2. Sorghi I. B. tom. 2. l. 18. 447. ANN.

Milium Arundinaceum, plano alboquè semine C. B. P. 26. Sorghi album, Milium Indicum. Dora I. B. tom. 2. l. 18. 448. ANN.

Milium Arundinaceum, semine Lithospermi facie maximo durissimo. Lithospermum Arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii C. B. P. 258. Lachryma Iobi multis sive Milium Arundinaceum I. B. tom. 2. l. 18. 449. ANN.

MILLEFOLIUM maximum, umbellâ albâ C. B. P. 140.

* Millefolium vulgare album C. B. P. 140. Millefolium Stratiotes pennatum terrestre I. B. tom. 3. l. 26. 136.

* Millefolium purpureum majus C. B. P. 140. Mil-

- * Millefolium purpureum minus C. B. T. 140.
- Millefolium Alpinum incanum, carneo flore.
C. B. P. 140.
- Millefolium tomentosum luteum C. B. P. 140.
I. B. tom. 3. l. 26. 131.
- Millefolium incanum Creticum C. B. P. 140.
- Millefolium Creticum I. B. tom. 3. l. 26. 139.
- Millefolium odoratum minus, Monspeliensium Cat. Hort. Reg. Paris. 122.
- Millefolium majus album, odore Camphoræ.
Tanacetum minus album odore Camphoræ,
sive Achyllæa Diosc. C. B. P. 132. Achillæa
Millefolia odorata I. B. tom. 3. l. 26. 140.

- * **M**ILLEFOLIUM aquaticum umbellatum, cappillaceo breviquè folio C. B. P. 141. Millefolium aquaticum, Fœniculo simile, umbelliferum I. B. tom. 3. l. 27. 8.
- * Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos C. B. P. 141. Millefolium aquaticum minus I. B. tom. 3. l. 38. 783.
- * Millefolium aquaticum, sive Viola aquatica, caule nudo C. B. P. 141. Millefolium aquaticum dicta Viola aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 782.
- * Millefolium aquaticum, Equiseti folio, caule nudo C. B. P. 141. Millefolium aquaticum, dictum Viola aquatica, secundum, I. B. tom. 3. l. 38. 783.

* Mil-

- * *Millefolium aquaticum pennatum spicatum*
C. B. P. 141. *Millefolium pennatum aqua-*
ticum I. B. tom. 3. l. 38. 783.
- * *Millefolium aquaticum cornutum* C. B. P. 141.
I. B. tom. 3. l. 38. 784.
- Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ra-*
nu. culi flore & capitulo C. B. P. v. *Ranun-*
culus.
- Millefolium aquaticum, foliis Fœniculi flore &*
capitulo C. B. P. v. *Ranunculus.*
- Millegrana major Moris.* v. *Polygonum.*
- Mimosa ejusque species.* v. *Herba viva.*
- Mimosa non spinosa major Zeylanica Breyn.*
v. *Onobrychis.*

MIRABILIS Peruviana, purpureo flo-
re. *Solanum Mexiocanum*, flore magno
C. B. P. 168. *Jesminum Mexicanum*, sive
Flos Mexicanus multis I. B. tom. 2. l. 20.
814. *Atzoyatl* vel *Mirabilis Mexicana* *Her-*
nand. p. 176. ANN.

Eadem flore flavo C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex albedo C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex rubro luteo & albo tam virga-
tim quàm punctatim mixto C. B. P. *Var.*
168. ANN.

Mirabilis Peruviana, flore parvo. *Solanum*
Mexiocanum, flore parvo C. B. P. 168. *Mi-*
rabilis Peruviana minor *Muntingh.* 213.
ANN.

Molle

Molle I. B. v. *Lentiscus*.

Mollugo montana latifolia ramosa C. B. P. v. *Gallium*.

Mollugo montana angustifolia C. B. P. v. *Gallium*.

Molon Plinii C. B. P. v. *Filipendula*.

MOLUCA I. B. tom. 3. l. 28. 234. *Melissa*
Moluccana odorata C. B. P. 228 ANN.

Moluca asperior foetida I. B. tom. 3. l. 28. 235.

Melissa Moluccana foetida C. B. P. 229. ANN.

MOLY *Hispanicum purpureum* *Morif.*
Hist. 2. 392. *Moly latifolium Hispani-*
cum C. B. P. 75.

Moly latifolium luteum, odore *Allii primum*
C. B. P. 75. *Morif. Hist.* 2. 393. *Moly luteum*
Botanicorum latifolium, *Allii odore* I. B. tom.
2. l. 19. 562.

Moly angustifolium umbellatum C. B. P. 75.
Morif. Hist. 2. 393. *Moly Dioscoridis par-*
vum quibusdam I. B. tom. 2. l. 19. 568.

Idem flore carneo.

Moly album angustifolium Pesarense parvum,
caule triangulo *Morif. Hist.* 2. 394. *Moly*
parvum, caule triangulo C. B. P. 75.

Moly Virginianum C. B. P. v. *Ephemerm.*

Moly latifolium Liliflorum C. B. P. v. *Ornitho-*
galum.

Momordica vulgò. v. *Cucumis*.

Monarakudimbija Zeylonensibus. v. *Crista Pa-*
vonis.

Mor-

Morsus Diaboli I. B. v. Scabiosa.

Morsus gallinæ I. B. v. Alsine.

Morsus ranæ I. B. v. Nymphæa.

MORUS fructu nigro C. B. P. 459. Morus nigra I. B. tom. I. l. I. 118.

Morus fructu albo C. B. P. 459. Morus alba I. B. tom. I. l. I. 118. descr.

Muralis minor repens I. B. v. Draba.

Muraria similis I. B. v. Draba.

Murucuja Marcgr. v. Cucumis.

Musa I. B. v. Ficoides.

Muscari I. B. v. Hyacinthus.

Muscipula major, calyce turgido ventricoso I. B. v. Lychnis.

Muscipula muscosa flore I. B. v. Lychnis.

* **M**USCUS vulgatissimus C. B. P. 360. Muscus terrestris & hortensis I. B. tom. 3. l. 38. 764.

* Muscus Filicinus major C. B. P. 360. Muscus Filicinus I. B. tom. 3. l. 37. 764.

* Muscus Abietis facie C. B. P. 360. I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus major C. B. P. 360. Muscus pulcher parvus repens I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus minor C. B. P. 360. Muscus terrestris Lusitanicus I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus terrestris clavatus C. B. P. 360. Muscus

- scus terrestris repens, à Trago pictus *B. I. tom. 3. l. 37. 766.*
- * Muscus pyxioides terrestris *C. B. P. 361.* Muscus pyxidatus *I. B. tom. 3. l. 37. 767.*
- * Muscus terrestris capillaris, capsulâ longâ *Com-melyn. Catal. 75.*
- * Muscus saxatilis Sericoides *Commel. Cat. 75.*
- * Muscus Coralloides, sive cornutus montanus *C. B. P. 361.*
- * Muscus Coralloides saxatilis, cervi cornu re-ferens *C. B. P. 361.*
- * Muscus Arboreus, Usnea Officinarum *C. B. P. 361.* Muscus arboreus villosus *I. B. tom. 3. l. 37. 763.*
- * Muscus Arboreus Coralloides *C. B. P. 361.*
- * Muscus Arboreus cum orbiculis *C. B. P. 361.* Muscus arboreus peltatus & scutellatis *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*
- * Muscus pulmonarius *C. B. P. 361.* Lichen Ar-boreus, sive Pulmonaria arborea. *I. B. tom. 3. l. 37. 759.*
- * Muscus crustæ modo Arboribus adnascens *C. B. P. 361.*
- * Muscus amarus, Absinthii folio *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*
- * Muscus ex cranio *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*
- * Muscus aureus capillaris medius. Polytrychon-aureum majus *C. B. P. 356.* Polytrichum Apuleji majus quibusdam *I. B. tom. 3. l. 37. 760.*

* *Muscus aureus capillaris minor*. *Polytrichon aureum minus* C. B. P. 357. *Polytrichon Apuleji minus* quorundam I. B. tom. 3. l. 37. 760.

* *Muscus aureus capillaris minimus*, capitulo longo subflavo. *Polytrichon aureum minimum*, capitulo longo, subflavi coloris *Commeleyn. Cat.* 89.

* *Muscus aureus capillaris minimus*, capitulo oblongo rotundo subviridi. *Polytrichon aureum minimum capitulatum oblongo rotundum*, colore subviridi *Commel. Cat.* 89.

MYAGRUM majus, seu fativum *Morif. Hist.* 2. 315. *Myagrum fativum* C. B. P. 109. *Myagrum dictum Camelina* I. B. tom. 2. l. 21. 892. ANN.

Myagrum siliquâ longâ C. B. P. v. *Eruca*.

Myagrum monospermum latifolium C. B. P. v. *Raphanistrum*.

Myagro similis siliquâ rotundâ C. B. P. v. *Raphanistrum*

Myosuros I. B. v. *Holosteo affinis*.

Myrica vulgò. v. *Tamariscus*.

MYRRHIS annua, semine rostrato striato aspero oblongo, nodosa. *Morif. Umbell.* 44. & 67. ANN.

* *Myrrhis annua*, semine striato aspero brevi *Morif. Hist.* 44. *Myrrhis sylvestris seminibus asperis* C. B. P. 160. ANN.

Myr-

* Myrrhis annua, semine striato lævi *Morif. Umbell. 44. & 67.* Chærophyllum sylvestre *C. B. P. 152.* Antriscus Plinii quibusdam, semine longo Cicutariæ vel Chærephylli. *I. B. tom. 3. l. 27. 71. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato lævi, tuberosa, nodosa, coniophyllon. *Morif. Umbell. 44. & 67.* Cicutaria bulbosa *C. B. P. 161.* Cicutaria odorata bulbosa *I. B. tom. 3. l. 27. 183. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato villosò incano *Morif. Umbell. 44. & 67.* Daucus Alpinus multifido longoquè folio, sive montanus umbellâ candidâ *C. B. P. 150.* Daucus Creticus semine hirsuto *I. B. tom. 3. l. 27. 57. ANN.*

Myrrhis perennis, semine striato, alba major odorata. *Morif. Umbell. 44.* Myrrhis major vel Cicutaria odorata *C. B. P. 160.* Myrrhis magno semine longo fulcato *I. B. tom. 3. l. 27. 77.*

Myrrhis perennis, alba minor foliis hirsutis, semine striato aureo. *Morif. Umb. 44. & 66.*

Eadem foliis hirsutissimis *Morif. Umb. 44. & 66.*

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus C. B. P. v. Chærophyllum.

MYRTUS communis Italica *C. B. P. 468.*

Myrtus latifolia Romana *C. B. P. 468.*

Myrtus latifolia Belgica, fortè Romana *I. B. tom. 1. l. 5. 512.*

Myrtus latifolia Boetica t. vel foliis Laurinis

Ee

C. B. P.

C.B.P. 469. *Myrtus Boetica latifolia domestica* *I. B. tom. 1. l. 5. 511.*

Myrtus latifolia Belgica C. B. P. 469. *Myrtus vulgaris* *I. B. tom. 1. l. 5. 510.*

Eadem foliis in acumen luteum desinentibus.

Myrtus foliis odore Nucis moschatae, cauliculis rubentibus, vulgò odore Citri *Schuyl. Cat. 49.*

Myrtus flore pleno *Corn. 203.*

Myrtus folio Buxi. *Schuyl. Cat. 49.*

Myrtus balsamica, folio mali Granatae.

Tres perpulchras Myrti varietates nuper in Angliâ detectae sunt curâ Dni Watſii: *Myrtus* foliis Buxi contortis, minima foliis splendentibus, & balsamica foliis mali Granatae, quae à congeneribus distinguitur foliis, facie mali Granatae, crassiusculis, pinguibus, lucidis.

Myrtus foliis minimis & mucronatis. C. B. P. 469. vulgò Rorismarini foliis *Schuyl. Cat.*

49. *Myrtus angustifolia minor.* *I. B. tom. 2. l. 5. 513.*

Myrtus minor vulgaris. C. B. P. 469. *Myrtus Tarentina* *I. B. tom. 1. l. 5. 512.*

Eadem foliis ex luteo variegatis.

Myrthus Africana humilis, foliis Myrtilli cre-natis, cauliculis nigricantibus. Frutex Aethiopicus baccifer, foliis Myrtilli *Breyn. Cent. 1. 9.*

Myrtus Zeylanica odoratissima, baccis niveis monococcis. *Maranda Zeylanensibus*

MYRTUS ZEILANICA ODORATISSIMA, BACCIS
NIVEIS MONOCOCCIS.



Locis glareosis & sabulosis Insulæ Zeylan frequens est hoc speciosissimum Myrtigenus, quod fragranti suo Citrato odore prætereuntibus sese commendat. Toto, verò habitu Myrtum pleno flore Canadensem Cornuti æmulatur; Ligno est candidissimo nitido Eboris instar, solido ponderoso; Cortice scabro tenui; Ramis numerosis, fornicato ambitu perpulchrè orbiculatis; Foliis rigidis mucronatis digitum longis, jucundo viridi levore nitentibus, odore Citri fragrante, sapore aromatico leviter adstringente. Ad summos ramos prodeunt urceoli candidi diaphani globosi, florum Unedonis instar, è quorum umbilico profluunt innumera apiculata concoloria stamina. His emarcidis urceoli transeunt in baccas Pisi majoris magnitudine, molleculas, niveas, dulcis aromatici saporis, includentes acinum unicum fuscum angulosum. Baccas pueruli esitant. Foliorum decoctum, observatâ tenui diætâ, Luem Gallicam vigorosè expugnat. Lignum ad capsas scrinia aliaquè utensilia expetitur.

Myxa domestica I. B. v. Sebestena.

N.



apellus ejusquè species C. B. P. v. Aconitum.

NA.

NAPUS sativa C. B. P. 95. Napus sativus
 Bunias *Morif. Hist.* 2. 114. Napus I. B. *tom.*
 2. l. 21. 842. ANN.

* Napus sylvestris. C. B. P. 95. *Morif. Hist.* 2.
 114. I. B. *tom.* 2. l. 21. 843. ANN.

Napobrassica C. B. P. v. Brassica.

NARCISSUS albus, magno odorato flore,
 circulo pallido C. B. P. 48. Narcissus
 medio-purpureus, magno flore: folio latio-
 re I. B. *tom.* 2. l. 19. 601.

Narcissus niveus odoratus, circulo rubello C. B.
 P. 48. Narcissus medio-purpureus minor I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus albus, circulo purpureo C. B. P. 48.

Narcissus flore simplici uno, medio purpu-
 reo *Morif. Hist.* 2. 361. Narcissus medio-pur-
 pureus. I. B. *tom.* 2. l. 19. 600.

Narcissus albus, circulo croceo vel luteo C. B.
 P. 49. Narcissus medio croceus tenuifolius
 I. B. *tom.* 2. l. 19. 602.

Narcissus albus circulo croceo minor C. B. P.
 49. Narcissus medio-purpureus minor. I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus Orientalis major polyanthos totus
 albus *Eyst. Morif. Hist.* 2. 362. Narcissus
 Orientalis major albus C. B. P. 49.

Idem medius. Narcissus Orientalis medius al-
 bus. C. B. P. 49.

Narcissus Orientalis albus, calice stellato c. B. P. 49.

Narcissus totus albus major C. B. P. 49. Narcissus cum pluribus floribus totus albus, major. I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Idem minor C. B. P. 49. Narcissus foliis candidantibus cum pluribus floribus totus albus, minor I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Narcissus albus flore minore, jasmini odore C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo, campanulæ simili maximus C. B. P. 50. Narcissus campanularis vulgò.

Narcissus Orientalis albus calice luteo medius C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo minor C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis calice aureo, pluribus foliolis pleno, seu pluribus foliolis tortilibus pleno C. B. P. 50.

Narcissus pallidus medio-croceus C. B. P. 50.

Narcissus medio-luteus Pisanus, plures flores ferens. I. B. tom. 2. l. 19. 608.

Narcissus pallidus medio-aureus C. B. P. 50.

Narcissus albus, circulo croceo polyanthos C. B. P. 50. Narcissus medio-croceus serotinus cum aliquot floribus I. B. tom. 2. l. 19. 604.

Narcissus pallidus, circulo luteo C. B. P. 50.

Narcissus albidus medio-luteus cum aliquot flori-

- floribus *I. B. tom. 2. l. 19. 504.*
- Narcissus pallidus, circulo aureo alter *C. B. P. 50.* Narcissus pallido flore medio-aureus *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*
- Narcissus serotinus montanus Musart dictus *Fer. Fl. Cult. 113.* Flore niveo, calice croceo fimbriato.
- Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi *C. B. P. 50.* Narcissus Constantinopolitanus minor, calyce fimbriato medio-croceus *Eyst. Moris. Hist. 2. 392.* Narcissus multos ferens flores, medio-luteus Narbonensis *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus medio-luteus, majoribus floribus *C. B. P. 50.* Narcissus plures ferens flores majores præcior, medio-luteus *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus niveus, calyce flavo, odoris fragrantissimi *C. B. P. 50.*
- Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus *C. B. P. 50.* Narcissus de Argiers polyanthos totus luteus *Eyst. Moris. Hist. 2. 362.*
- Narcissus angustifolius flavus, magno calice *C. B. P. 51.* Narcissus juncifolius flavus amplo calice *I. B. tom. 2. l. 19. 608.*
- Narcissus juncifolius oblongo calice luteus major *C. B. P. 55.* Narcissus major juncifolius *Eyst. Moris. Hist. 2. 362.* Narcissus juncifolius, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*

Narcissus juncifolius luteus minor C. B. P. 51.

Morif. Hist. 2. 362. l. B. tom. 2. l. 19. 607. Ic.

Narcissus juncifolius, flore pallidiore calice flavo C. B. P. 51. Narcissus angustifolius minor, flore pallido *L. B. tom. 2. l. 19. 609.*

Narcissus juncifolius, flore rotundo Roseo C. B. P. 51.

Narcissus juncifolius totus albus C. B. P. 51.

Narcissus juncifolius omnino albus, calice oblongo *I. B. tom. 2. l. 19. 598.*

Narcissus latifolius maximus albus, calice brevi luteo C. B. P. 51. *Hist. Morif. 2. 362.*

Narcissus latifolius, pallidus calice amplo & aureo, caule striato C. B. P. 51.

Idem calice amplo alter C. B. P. 52.

Narcissus latifolius sulphureus vel albus, brevi calice C. B. P. 52.

Narcissus maximus pallidè luteus C. B. P. 52.

Narcissus subflavus, tubo sexangulo C. B. P. 52. *Morif. Hist. 2. 362.*

Narcissus flavus, tubo rotundo C. B. P. 52.

Narcissus albus, tubo luteo C. B. P. 52.

Narcissus latifolius pallidus, calice longo aureo creanto *Morif. Hist. 2. 362.* Narcissus albus, calice flavo Moscati odore C. B. P. 52.

Idem alter C. B. P. 52. *Præcocior.*

Narcissus sylvestris pallidus, calice luteo C. B. P. 52. *Morif. Hist. Ic.* Bulbocodium vulga-

tius

tius *I. B. tom. 2. l. 19. 593.*

Narcissus major totus luteus, calice prælongo
C. B. P. 52. Bulbocodium Hispanicum *I. B. tom. 2. l. 19. 594.*

Narcissus totus luteus, foliis florum reflexis
C. B. P. 53.

Narcissus parvus totus luteus C. B. P. 53. Bulbocodium minus *I. B. tom. 2. l. 19. 59.* Calice simplici.

Idem calice pleno. Narcissus minor luteus, calice oblongo pleno *Cat. Hort. Reg. Paris. 127.* Pseudonarcissus pleno flore *Fer. Flor. Cult. 110.*

Narcissus albus, oblongo calice C. B. P. 53. Pseudonarcissus albo flore Clusii *I. B. tom. 2. l. 19. 597.* Altior flore longiore & tubo angustiore C. B. P. Var. 53.

Idem humilior, flore brevior & tubâ laxiore C. B. P. Var. 53.

Narcissus albus, foliis reflexis, calice brevior auro *Cat. Hort. Reg. Paris. 127.*

Narcissus totus albus petalis reflexis *Moris. Hist. 2. 263.* Narcissus angustifolius albus, calice oblongo florequè reflexo C. B. P. 53. Narcissus foliis floris albis, oblongo calice luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 597.*

Narcissus minimus, calice amplo plano *Moris. Hist. 2. 422.* Narcissus montanus juncifolius, calice flavo C. B. P. 53. Bulbocodium tenuifolium, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 596.*

Narcissus montanus alter, flore fimbriato C.
B. P. 53. Bulbocodium tenuifolium aliud,
flore luteo fimbriato I. B. tom. 2. l. 19. 597.

Narcissus juncifolius omnium minimus, flore
omnino albo, calice fimbriato Moris. Hist. 2.
421. Narcissus montanus albus minimus C.
B. P. 53. Bulbocodium minimum tenuifo-
lium album I. B. tom. 2. l. 19. 598.

Narcissus montanus juncifolius, calice aureo
C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus minimus, calice pleno, petalis sex
reflexis luteis Moris. Hist. 2. 422. Narcissus
montanus coronatus C. B. P. 53. Bulboco-
dium minimum coronatum I. B. tom. 2. l.
19. 596.

Narcissus Orientalis flore multiplici & pleno
albo luteo C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus Constantinopolitanus polyanthos
major, melius pleno flore Cat. Hort. Reg.
Par. 128.

Narcissus latifolius albus medio-luteus C. B. P.
53. Narcissus cum pluribus floribus plenis,
corollâ luteâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus albus coronâ multiplici luteâ C. B. P.
53. Narcissus amplo flore, coronâ aureâ
plenâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus bulbo anguloso C. B. P. 54. Narcissus
Constantinopolitanus, quem Ziden Sari vo-
cant I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Nar-

Narcissus multiplex totus flavus C. B. P. 54.

Morif. Hist. 2. 363.

Narcissus incomparabilis flore pleno, partim flavo, partim croceo *Cat. Hort. Reg. Par.*

127.

Narcissus totus niveus multiplex C. B. P. 54.

Morif. Hist. 2. 363. Narcissus flore singulari albo pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 602.

Narcissus sylvestris multiplex, calice carens C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363. Bulbocodium flore pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 594.

Idem involucro inclusus permanens C. B. P. Var. 54. Seu flore clauso virescente *Schuyt. Cat. Lugd.* 49.

Narcissus flore pleno variegato C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363.

Narcissus luteus sylvestris duplici & triplici, tubo aureo C. B. P. 54. *Morif. Hist.* 2. 363.

Narcissus luteus, tubo diviso C. B. P. 54. Bulbocodii pleno flore speciosum genus Venerii *I. B. tom.* 2. l. 19. 595.

Narcissus latifolius luteus multiplex C. B. P. 54.

Narcissus juncifolius aureus multiplex, Anemones formâ C. B. P. 54. Narcissus juncifolius luteus, flore pleno *Eyst. Morif. Hist.* 2. 363. Narcissus Cyprius luteus polyanthes, flore pleno *I. B. tom.* 2. l. 19. 595.

Narcissus maritimus C. B. P. 54. Lilionarcissus albus maritimus minor *Morif. Hist.* 2. 365.

Pancratium Monspeulanum multis Scylla alba

alba parva *I. B. tom. 2. l. 19. 611.*

Narcissus Illyricus Liliaceus C. B. P. 55. Lilio-narcissus albus maritimus major Moris. Hist. 2. 366. Pancratii Monspeliani, vel Hemerocallidis Valentinæ facie Lilio-narcissus, vel Narcissus tertius Matth. I. B. tom. 2. l. 19. 613.

Narcissus Indicus Liliaceus, saturo colore purpurascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus Liliaceus, diluto colore purpurascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus, flore Liliaceo Sphoericus Fer. v. Lilium.

Narcissus bifolius Promontorii Bonæ Spei. v. Hæmanthus.

Narcissus Jacobeus latifolius Indicus. v. Lilium.

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. v. Lilium.

Narcissus ex albo rubescens C. B. P. v. Lilium.

Narcisso-colchicum. v. Colchicum.

Nardus Celtica Dioscoridis C. B. R. v. Valeriana.

Narthecium Theophrasti I. B. v. Ferula.

NASTURTIIUM minimum annum, flore albo *Moris. Hist. 2. 221. Sium minimum Prosp. Alpin. Exot. 321. An Sisymbrii Cardamines species quædam insipida I. B. tom. 2. l. 21. 886. ANN.*

* *Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum seu Nastur-*

- Nasturtium *μυελόφυλλον*, flore luteo minimo
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum C. B. P. 105. Seriphium Germanicum, Sophia quibusdam I. B. tom. 2. l. 21. 886. Foliis angustioribus C. B. P. Var. 105. ANN.
- Idem foliis latioribus C. B. P. Var. 105. ANN.
- * Nasturtium pumilum Belgicum. ANN.
- * Nasturtium pratense, magno flore simplici
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium pratense, magno flore C. B. P. 104. Iberis Fuchsi, sive Nasturtium pratense I. B. tom. 2. l. 21. 889.
- * Idem flore prorsus albo C. B. P. Var. 104.
- Nasturtium pratense, flore pleno C. B. P. 104.
Morif. Hist. 2. 223. *Descr.* Iberis Fuchsi, sive Nasturtium pratense, flore pleno I. B. tom. 2. l. 21. 889.
- * Nasturtium aquaticum supinum, flore albo
Morif. Hist. 2. 223. Nasturtium aquaticum supinum C. B. P. 104. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum I. B. tom. 2. l. 21. 884.
- * Nasturtium aquaticum majus & amarum C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum I. B. tom. 2. l. 21. 884.
- * Nasturtium aquaticum majus & amarum C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum, flore majore elatius I. B. tom. 2. l. 22. 885.

* *Nasturtium aquaticum minus* C. B. P. 104. *Morif. Hist.* 2. 224. *Sisymbrium Cardamine hirsutum minus*, flore purpureo *I. B. tom.* 2. l. 21. 888.

Nasturtium Alpinum trifoliatum *Morif. Hist.* 2. 224. *Nasturtium Alpinum trifolium* C. B. P. 104. *Iberidi Fuchsi affinis trifolia Cardamine* *I. B. tom.* 2. l. 21. 800.

NASTURTIIUM vulgare, sive hortense tenuiter divisum *Morif. Hist.* 2. 300. *Nasturtium hortense vulgatum* C. B. P. 102. *Nasturtium vulgare* *I. B. tom.* 2. l. 22. 912. ANN. *Nasturtium hortense latifolium* C. B. P. 103. *Morif. Hist.* 2. 301. ANN.

Nasturtium hortense crispum latifolium *Morif. Hist.* 2. 301. C. B. P. & *Var.* 104. *Nasturtium crispum* *I. B. tom.* 2. l. 22. 913. ANN.

Idem angustifolium C. B. P. *Var.* 104. ANN.

* *Nasturtium pumilum vernal* C. B. P. 105. *Morif. Hist.* 2. 301. ANN.

* *Nasturtium sylvestre*, *Osyridis folio*, capsulis minimis *Morif. Hist.* 2. 301. *Nasturtium sylvestre*, *Osyridis folio* C. B. P. 105. *Thlaspi angustifolium Fuchsi*, *Nasturtium sylvestre* *I. B. tom.* 2. l. 22. 914. ANN.

Nasturtium sylvestre, *Erucae affine* *Morif. Hist.* 2. 301. C. B. P. 105. *Nasturtium sylvestre*, *Valentinum Clusio* *I. B. tom.* 2. l. 22. 920. ANN.

Nasturtium verrucosum, capsulâ bivalvia asperâ seu hirsutâ *Morif. Hist.* 2. 302. Ambrosia campestris repens *C. B. P.* 138. *Coronopus Ruellii*, sive *Nasturtium verrucosum* *I. B. tom.* 2. *l.* 22. 919. ANN.

Nasturtium Indicum majus *C. B. P.* v. *Viola Indica*.

Nejemelimsalib *I. B.* v. *Gramen*.

Nepa quibusdam *I. B.* v. *Genista*.

Nepeta ejusquè species *C. B. P.* v. *Calamintha*.

NERION floribus rubescentibus *C. B. P.* 464. *Nerium*, sive *Rhododendron*, flore rubro *I. B. tom.* 2. *l.* 15. 140. *Oleander* vulgò.

Nerion floribus albis *C. B. P.* 464. *Nerion* sive *Rhododendron* flore albo *I. B. tom.* 2. *l.* 15. 140.

Nerion Indicum angustifolium, floribus odoratis simplicibus.

Huic sunt folia angusta, flores incarnati, nonnunquam rubentes, odoris grati, cœtera vulgari *Nerio* omnino paria. In Belgiam advexit Vir Nobilissimus Dns de Reede cui ob publica in Rem Botanicam merita immensum debet noster orbis.

Nerion Indicum latifolium, floribus odoratis plenis.

Vulgare *Nerium* per omnia æmulatur,
nisi

NERIUM INDICUM ANGUSTIFOLIUM FLORIBUS
ODORATIS SIMPLICIBUS.



NERIUM INDICUM LATIFOLIUM, FLORIBUS PLE-
NIS ODORATIS.



nisi quod flores multiplici petalorum serie sint constructi, ad amplitudinem Rosæ Moschatae, coloris incarnati, propitiove cælo, dilutè rubelli, odoris suavissimi, ob quem de collo gestantur ab Indis. Colitur in hortis Zeylonensium aliorumquè Orientalium, ex quibus hùc transferri curavit Illustrissimus Beverningius, in cujus nitidissimo viridario inter cœtera ornamenta luxuriat.

Nerium Alpinum ejusquè species I. B. v. Cistus.

NICOTIANA major latifolia C. B. P. 169. *Morif. Hist. 2. 492.* Nicotiana major sive Tabacum majus I. B. tom. 3. l. 34. 629. ANN.

Nicotiana major lato & rotundofolio. Pyciet seu Tabacum *Hernand. 173.* ANN.

Nicotiana major angustifolia C. B. P. 170. *Morif. Hist. 2. 492.* Nicotiana sive Tabacum, folio angustiore I. B. tom. 3. l. 34. 630. ANN.

Nicotiana minor C. B. P. 170. *Morif. Hist. 2. 493.*

Nicotiana latifolia, seu folio subrotundo minor, capsulâ rotundâ Priapi formâ, floribus luteis, minoribus, foliis rotundis, obscure virentibus, glutinosis *Morif. Hist. 2. 492.* Priapeja quibusdam Nicotiana minor I. B. tom. 3. l. 34. 630. ANN.

NIGELLA *arvensis cornuta* C. B. P. 145.
Melanthium sylvestre, sive arvense I. B.
tom. 3. l. 26. 205. ANN.

Nigella latifolia, flore majore simplici cœruleo C. B. P. 145. ANN.

Nigella angustifolia, flore majore simplici cœruleo C. B. P. 145. *Melanthium capite & flore majore* I. B. *tom. 3. l. 26. 207. ANN.*

Nigella flore majore pleno cœruleo C. B. P. 145. *Melanthium capite vel calice & flore majore pleno* I. B. *tom. 3. l. 26. 209. ANN.*

Nigella flore minore simplici candido C. B. P. 145. *Melanthium calice & flore minore semine nigro & luteo* I. B. *tom. 3. l. 26. 208. ANN.*

Nigella flore minore pleno & albo C. B. P. 146. *Melanthium capite minore, flore multiplicato* I. B. *tom. 3. l. 26. 209. ANN.*

Nigellastrum vulgò. v. Lychnis.

Nil Arabum I. B. v. *Convolvulus.*

Nocheznopalli Hernand. v. Ficus.

Noli me tangere vulgò. v. Balsamine.

NUMMULARIA *lutea major* C. B. P. 309.
Nummularia major, flore luteo Morisf.
Hist. 2. 567. Nummularia sive Centimorbia
I. B. tom. 3. l. 129. 370.

*Nummularia minor, flore purpurascente C. B. P. 309. *Morif. Hist.* 2. 567. Nummularia rubra I. B. tom. 3. l. 29. 371.

Nux Avellana vulgò. v. Corylus.

NUX JUGLANS, five Regia vulgaris C. B. P. 417. *Nux juglans I. B. tom. 1. l. 3. 241.*

Nux juglans, fructu maximo C. B. P. 417.

Nux juglans, fructu tenero, fragili putamine C. B. P. 417.

Nux juglans, fructu serotino C. B. P. 417.

Nux juglans Virginiana nigra.

Caudice vasto, cortice per senium hiulco, lignoque nitido & crispatis undulato Nuci juglandi Europææ haud absimilis est; Foliis autem angustioribus brevioribus per ambitum leviter crenatis, superficie non nihil rugosa, odoreque debiliori. Flores quoque & julos, quos quidem hætenus nondum licuit conspicerè, nec quicquam à vulgari discrepare accepi. Nuces à Reverendissimo Episcopo Londinensi nobis transmissæ, Nucem juglandem communem adæquant, duplici tectæ munito, exteriori crasso fungoso viridi, interiori ligneo nonnihil depresso, durissimo, crassissimo, nigricante, crebribus profundisque sulcis seu scrobiculis per

LUGDUNO-BATAVUS.

453

NUX JUGLANS VIRGINIANA NIGRA.



per longitudinem inscripto, & ex duabus carinis pressissimè junctis, nullâ apparente commissurâ, compacto. Nucleus includitur dulcis, edulis, quadripartitus, juglandi nuci per omnia similis, intercussante tamen membranâ lignosâ, durâ, crassâ. Patriam agnoscit Virginiam, ex quâ in Angliam indequè in Belgiam est advecta.

* **N**YMPHÆA alba major C. B. P. 193. Nymphæa alba I. B. tom. 3. l. 28. 771.

* Nymphæa alba minor C. B. P. 193. I. B. tom. 3. l. 38. 773.

* Nymphæa alba minima C. B. P. 193. Nymphæa minor, sive Morsus ranæ I. B. tom. 3. l. 38. 773.

* Nymphæa lutea major C. B. P. 193. Nymphæa lutea I. B. tom. 3. l. 38. 771.

* Nymphæa lutea minor, parvo flore C. B. P. 193. Nymphæa minor lutea I. B. tom. 3. l. 38. 773.

O.



chrus folio integro, capreolos emittente C. B. P. v. Lathyrus.

- O**CIMUM latifolium maculatum, vel crispum *C.B.P.* 225. Ocimum Sancto, Mauritanum, latum, crispum, maximum *I.B. tom. 3. l. 28. 249.* Basilicum vulgò. *ANN.*
- Ocimum viride, foliis bullatis *C. B. P.* 225. *ANN.*
- Ocimum foliis fimbriatis viridibus *C.B.P.* 225. *ANN.*
- Idem foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus maximum. *ANN.*
- Ocimum Caryophyllatum maximum *C. B. P.* 225. Ocimum Ægyptium, longioribus foliis, Rihau dictum *I. B. tom. 3. l. 28. 250.* *ANN.*
- Ocimum Caryophyllatum majus *C. B. P.* 226. Ocimum odoratum, sive Basilicum *I. B. tom. 3. l. 28. 245.* *ANN.*
- Ocimum Citri odore *C. B. P.* 226. Ocimum magnum *I. B. tom. 3. l. 28. 246.* *ANN.*
- Ocimum vulgatius *C. B. P.* 226. *I. B. tom. 3. l. 28. 247.* *ANN.*
- Ocimum foliis ex nigro virescentibus, flore albo *Cat. Hort. Reg. Par. 131.* *ANN.*
- Idem violaceo flore *Cat. Hort. Reg. Par. 131.* *ANN.*
- Ocimum nigrum majus, acuto Rutæ odore *ANN.*
- Ocimum medium crispum, conglomeratâ brevique spicâ *Cat. Hort. Reg. Paris. 131.* *ANN.*

Idem bullatis foliis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
131. ANN.

Ocimum tricolor Cat. Hort. Reg. Par. 131.
ANN.

Ocimum angustifolium, foliis serratis. ANN.

Ocimum minimum C. B. P. 226. I. B. tom. 3. l.
28. 247. ANN.

Idem crispum Brunsf. ANN.

Oculus Christi I. B. v. Aster.

Ocymastrum vulgò. v. Lychnis.

Ocymastrum verrucarium I. B. v. Circæa.

Ocymastrum Valentinum Clusii vulgò, v. Mar-
rubium.

Ocymoides ejusquè species C. B. P. & I. B. v. Ly-
chnis.

Ocymoides repens montanum C. B. P. v. Ly-
chnis.

Odontis quibusdam I. B. v. Lychnis.

OENANTHE Apii folio maxima, succo, vi-
roso, Cicutæ facie *Moris. Umbell.* 16. 19.

20. Oenanthe Cherephylli foliis C. B. P. 162.

Eadem latiori folio Cretica prolifera. Oenan-
the prolifera Apula C. B. P. 163.

Oenanthe Apii folio, caule firmiori *Moris.*
Umbell. 16. Oenanthe Apii folio C. B. P.

162. Oenanthe sive Filipendula Monspe-
sulana, folio Apii I. B. tom. 3. l. 27. 190.

Eadem caule flexuoso & fistuloso *Moris. Um-
bell.* 16.

* Oenq.

* *Oenanthe aquatica* C. B. P. 162. *Oenanthe*, si-
ve *Filipendula aquatica* I. B. tom. 3. l. 27. 191.
Radice bulbillis donatâ.

* Eadem radice bulbillis carente C. B. P. Var.
162. An *Oenanthe* siue *Filipendula folio*
Rutæ I. B. tom. 3. l. 27. 192.

Oenanthe Millefolii aquatici foliis Moris. Hist.
16. *Daucus pratensis*, *Millefolii palustris*
folio C. B. P. 150.

Oenanthe Hederæ foliis C. B. P. v. *Ranun-*
culus.

Oenanthe Myconii I. B. v. *Ranunculus*.

OLEA sativa C. B. P. 472. I. B. tom. 1.
l. 6. 1.

Olea maxima Hispanica C. B. P. 472.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano C. B. P.
472. *Oleaster*, siue *Olea sylvestris* I. B. tom.
2. l. 6. 21.

Olea sylvestris, folio molli incano C. B. P. 472.
Zizyphus Cappadocia, quibusdam *Olea Bq-*
hæmica I. B. tom. 1. l. 6. 27.

Oleander ejusque species vulgò. v. *Nerium*.

ONOBRYCHIS major perennis, siliculis ar-
ticulatis asperis clypeatis rectâ junctis,
flore ruberrimo *Moris. Hist.* 2. 129. *Onobry-*
chis semine clypeato aspero major C. B. P.
350. *Astragalus Romanus*, siue *Hedysa-*
rum clypeatum siliquâ asperâ I. B. tom. 3. l.
17. 315.

Eadem flore albo *Moris. Hist. 2. 129. Boccon. Epist.*

Onobrychis major annua, filiculis articulatis asperis clypeatis undulatim, id est, antrorsum & retrorsum junctis flore purpureo rubente *Moris. Hist. 2. 130. ANN.*

Onobrychis annua Zeylanica, Mimosæ foliis, filiquis articulatis asperis major. Mimosa non spinosa major Zeylanica *Breyn. Cent. 51. ANN.*

Eadem minor. *ANN.*

Onobrychis major perennis Canadensis triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus *Moris. Hist. 2. 130. Hedyfarum triphyllum Canadense Corn. 44*

Onobrychis major, filiculis echinatis cristatis in spicâ digestis *Moris. Hist. 2. 131. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major C. B. P. 350. Polygonon Gesneri I. B. tom. 2. l. 17. 315,*

Onobrychis minor, filiculis echinatis, cristatis, majoribus & crassioribus aculeis præditis, donata *Moris. Hist. 2. 131. Onobrychis fructu echinato minor C. B. P. 350.*

Onobrychis flore cœruleo, filiculis hirsutis seu asperis, ad imum Platani pilulæ modo junctis *Moris. Hist. 2. 133. Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. 352. Glyzyrrhiza Dioscoridis echinata, non repens I. B. tom. 2. l. 17. 327.*

Ono-

Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radiis notatis C. B. P. v. Astragalus.

Onobrychis arvensis C. B. P. v. Campanula.

Onobrychis pentagonia peregrina perfoliata, folio rotundiori Hort. Reg. Par. v. Campanula.

Ononis, v. Anonis.

Onopordum I. B. v. Carduus.

* **O**PHIOGLOSSUM vulgatum C. B. P. 187.
Ophioglosson I. B. tom. 3. l. 35. 708.

Ophioscorodon quibusdam I. B. v. Allium.

Ophris bifolia C. B. P. v. Orchis.

Ophris minima C. B. P. v. Orchis.

Opuntia, ejusque species. v. Ficus.

Oquichtli Cocaxochitl Hern. v. Tagetes.

* **O**RCHIS seu Cynosorchis latifolia, hiantе cucullo major C. B. P. 80. Cynosorchis galea & alis ferè cinereis I. B. tom. 2. l. 19. 735.

* Orchis seu Cynosorchis latifolia, hiantе cucullo altera C. B. P. 81. Cynosorchis prior Dodonæi I. B. tom. 2. l. 19. 759.

* Orchis morio Mas, foliis maculatis C. B. P. 81. Orchis major tota purpurea, maculoso folio I. B. tom. 2. l. 19. 763.

* Orchis morio Fœmina C. B. P. 82. Orchis minor purpurea cum alis virentibus I. B. tom. 2. l. 19. 761.

* Ea-

- * Eadem flore niveo *Cat. Hort. Reg. Par.* 133.
- * Eadem flore roseo *Cat. Hort. Reg. Par.* 132.
- Eadem flore versicolore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 132. Ex albo & rubro variegato.
- Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, Mas C. B. P. 82. Orchis antropophora, Oreades altera *Column. Ecphr.* 316.
- Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, Fœmina C. B. P. 82. Orchis antropophora, Oreades *Column. Ecphr.* 318.
- Orchis barbata, odore hirci, breviorē latiorē quē folio C. B. P. 82. Orchis barbata foetida *I. B. tom. 2. l. 19.* 754.
- * Orchis alba bifolia minor, calcare oblongo C. B. P. 83. Orchis alba, calcari longo *I. B. tom. 2. l. 19.* 771.
- Orchis muscæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis C. B. P. 83. Orchis myodes, galeâ & alis herbidis *I. B. tom. 2. l. 19.* 757.
- Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis, & purpurascentibus C. B. P. 83. Orchis fuciflora, galeâ & alis purpurascentibus *I. B. tom. 2. l. 19.* 756.
- Orchis muscam referens lutea C. B. P. 82. Orchis myodes lutea *I. B. tom. 2. l. 19.* 768.
- Orchis apem referens Lusitânica *Breyn. Cent.* 1. 98.
- Orchis muscam majorem cœruleam repræsentans *Breyn. Cent.* 1. 100.

- Orchis scarabæum* exprimens *Breyn. Cent. 1. Breyn. Cent. Ic. 45.*
- Orchis spiralis alba odorata* *I. B. tom. 2. l. 19. 769.* *Triorchis alba odorata* *C. B. P. 84.*
- * *Orchis Lilifolia minor Zabuletorum Zelandiæ & Bataviæ* *I. B. tom. 2. l. 19. 770.*
- * *Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus* *C. B. P. 85.* *Palmata non maculata* *I. B. tom. 2. l. 19. 774.*
- * *Orchis palmata pratensis maculata* *C. B. P. 85.* *Palmata maculata* *I. B. tom. 2. l. 19. 775.*
- * *Orchis palmata palustris latifolia* *C. B. P. 86.* *Palmata sive Serapias palustris latifolia, flore albo subpurpurascente* *I. B. tom. 2. l. 19. 775.*
- * *Orchis bifolia, herbaceo flore major.* *Ophris bifolia* *C. B. P. 87.* *Bifolium majus, sive Orchis major quibusdam* *I. B. tom. 2. l. 31. 533.*
- * *Eadem minima.* *Ophris minima* *C. B. P. 87.* *Bifolium minimum* *I. B. tom. 2. l. 31. 534.*

OREOSELINUM *Morif. Umb. 41.* *Apium montanum, folio ampliore* *C. B. P. 153.* *Apium montanum Dalechampii* *I. B. tom. 3. l. 27. 103.*

ORIGANUM sylvestre: *Cunila bubula* *Plinii* *C. B. P. 223.* *Origanum vulgare spontaneum* *I. B. tom. 3. l. 28. 236.*

Origanum sylvestre album *C. B. P. 223.*

Ori-

Origanum sylvestre, foliis variegatis *Sutherl. Cat.* 253.

Origanum Heracleoticum: *Cunila gallinacea* Plinii *C. B. P.* 223. *Origanum Heracleoticum* Matthioli, aliis fortè *Creticum* *I. B. tom.* 3. l. 28. 257.

Origanum Onites *C. B. P.* 223. *Origanum Monspeliensium pulchrum* Camerarii *I. B. tom.* 3. l. 68. 238.

Origanum montis Sipyli.

Perpulchrum hoc *Origanum*, *Sipyli* montis incola, nunc quoquè sedem fixit in nostro Horto. Hujus radícula, numerosis fibrata capillamentis, emittit cauliculos ramosos dodrantaes nonnunquam altiores, quadrangulos infrà subhirsutos & purpurascens, suprà glabros, in glauco viridantes. Hos vestiunt foliola, bina ex adverso, Origano vulgari minora, graciliora glauca, glabra, penes radicem nonnihil hirsuta, odoris jucundi languidi. Ramorum summitates gracilescunt in capitula squamosa ex parvis foliolis, pressius invicem junctis, & *Dictamni Cretici* acetabula mentientibus, compacta, è quibus exeunt flosculi purpurei quinquifidi Origano ampliores cum prominentibus staminibus longulis concoloribus. Semina sequuntur quaterna fusca in utriculis exiguis quinquifidis apertis more congenitorum.



rum. Quamvis tenella hæc planta per abscissos ramulos de facili propagetur, attamen imbribus & cœlestibus injuriis minus oportuna diligentem exposcit culturam.

Origano cognata C. B. P. v. Majorana.

Origanum fistulosum Canadense Corn. v. Clinopodium.

ORLEANA seu Orellana folliculis lappa-
ceis. Urucu *Pison. l. 4. 133.* Achiotl,
seu Medicina tingendo apta. *Hern. 74.*

ORNITHOGALUM umbellatum maximum
Arabicum, umbilico interiore nigro *Morif. Hist. 2. 378.* Ornithogalum umbellatum
maximum *C. B. P. 69.* Liliū Alexandri-
num, sive Ornithogalum magnum Syriacum
I. B. tom. 2. l. 19. 629.

*Ornithogalum umbellatum minus candidum
vulgare *Morif. Hist. 2. 378.* Ornithogalum
umbellatum medium angustifolium *C. B. P. 70.*
Ornithogalum pallido flore *I. B. tom. 2. l. 19. 625.*

Ornithogalum spicatum maximum, floribus
albis innumerabilibus *Morif. Hist. 2. 378.* Or-
nithogalum latifolium & maximum *C. B. P. 70.*
Ornithogalum maximum, floribus prorsus
niveis *I. B. tom. 2. l. 19. 628.*

Ornithogalum spicatum majus angustifolium,
flo-

floribus ex albo virescentibus *Morif. Hist. 2.*
 379. Ornithogalum angustifolium majus,
 floribus ex albo virescentibus *C. B. P. 70.*
 Asphodelus bulbosus Dodon, sive Ornitho-
 galum flore virente *I. B. tom. 2. l. 19. 627.*

Ornithogalum spicatum majus, lacteo flore
Morif. Hist. 2. 379. Ornithogalum majus spi-
 catum, flore albo *C. B. P. 70.* Ornithogalum
 spicatum, albo flore Monspeffulanum *I. B.*
tom. 2. l. 19. 628.

Ornithogalum spicatum majus Pannonicum,
 flore albo, lineâ viridi in dorso prædita
Morif. Hist. 2. 379. Ornithogalum spicatum,
 flore viridi lactescente *C. B. P. 70.*

Ornithogalum exoticum, seu Neapolitanum
 flore minore, majori innato *Morif. Hist. 2.*
 379. Ornithogalum exoticum, magno flore,
 minore innato *C. B. P. 70.* Ornithogalum
 Neapolitanum *I. B. tom. 2. l. 19. 631.*

Ornithogalum Neapolitanum, flore pendente,
 priori valde affine *Morif. Hist. 2. 380.* Hya-
 cinthus arborum, Ornithogali flore *Column.*

Ornithogalum Indicum latifolium florife-
 rum Sphæricum, colore colossino aut albo
Morif. Hist. 2. 380. Moly Latifolium Lili-
 florum *C. B. P. 75.* Moly Theophrasti ma-
 gnum *I. B. tom. 2. l. 19. 569.*

Ornithogalum spicatum album Æthiopicum
 seu Promontorii Bonæ Spei. Ornithoga-
 lum latifolium alterum *C. B. P. 70.*

Ornithogalum Africanum luteum odoratum,
foliis Cepaceis, radice tuberosâ.

Huic subest radix ampla, tuberosa,
nonnihil depressa, sessilis, pugni magnitu-
dine, coloris flavescentis, Folia promens
longa, fistulosa, Cepacea, flores in spicam
congestos, hexapetalos, luteos, odoratos,
à quibus profluunt stamina concoloria la-
nuginoso tomento, obsita. Sequuntur se-
mina more congenerum in vasculis tri-
capsularibus. Transluli in Hortum ex ari-
dis petrosis Promontorii Bonæ Spei.

* Ornithogalum luteum majus floriferum *Morif. Hist. 2. 381.* Ornithogalum luteum *C. B. P. 91.* Bulbus sylvestris Fuchsi, flore lu-
teo, sive Ornithogalum luteum *I. B. tom. 2. l. 19. 623.*

Ornithogalum luteum minus *C. B. P. 71. I. B. tom. 2. l. 19. 624.*

* **O**RNITHOPODIUM majus *C. B. P. 350. Morif. Hist. 2. 124.* Ornithopodium flore fla-
vescente *I. B. tom. 2. l. 17. 350. ANN.*

* Idem minus *C. B. P. 350. ANN.*

Ornithopodium *αιχονίερατον Morif. Hist. 2. 125.* Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioides *C. B. P. 350.* Scorpioides leguminosa
I. B. tom. 2. l. 17. 349. ANN.

Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato
C. B. P. v. Stella leguminosa.

Or-

ORNITHOGALUM AFRICANUM LUTEUM ODORATUM, FOL. CEPACEIS, RADICE TUBEROSA.



Ornithopodio affinis I. B. v. Ferrum equinum.

* **O**ROBANCHE major, Caryophyllum olens
C. B. P. 87. Orobanche flore majore *I. B.*
tom. 2. l. 13. 780.

* Orobanche ramosa C. B. P. 88. Orobanche mi-
nor, purpureis floribus, sive ramosa *I. B.*
tom. 2. l. 19. 781.

OROBUS sativus, sive Ervum semine an-
gulofo, filiquis inter grana & grana jun-
ctis *Morif. Hist. 2. 74.* Orobus filiquis arti-
culatis, semine majore C. B. P. 346. Orobus
sive Ervum multis *I. B. tom. 2. l. 17. 321.*

Orobus Creticus, semine minore *Morif. Hist. 2.*
74. Orobus semine minore C. B. P. 346.

Orobus sylvaticus latifolius, filiquis propen-
dentibus, parvo flore purpureo *Morif. Hist.*
2. 77. Orobus latifolius, parvo flore purpu-
reo 351. Galegæ nemorensi vernæ similis
multiflora, flore purpureo *I. B. tom. 2. l. 17.*
345.

Orobus sylvaticus, Viciæ foliis, filiquis pro-
pendentibus, floribus purpurascens
Morif. Hist. 2. 78. Orobus sylvaticus Viciæ
foliis C. B. P. 352. Astragalus major Fuchsi
I. B. tom. 2. l. 17. 334.

Idem cauliculis rubentibus.

Orobus sylvaticus perennis vernus, filiquis
erectis, flore purpureo *Morif. Hist. 2. 93.*

Oro-

Orobis sylvaticus purpureus vernus C. B. P. 351. Galega nemorensis verna I. B. tom. 2. l. 7. 343.

Orobis sylvaticus annuus, filiquis erectis, flore pallido Moris. Hist. 2. 93. Orobis sylvaticus, pallido flore C. B. P. 351. Galegæ nemorensi vernæ similis, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 344.

Orobis sylvaticus & Boeticus lanuginosus, radice amplissimâ Moris. Hist. 2. 96. Astragalus Boeticus lanuginosus, radice amplissimâ C. P. B. 351.

ORYZA Italica C. B. P. 24. Oryza I. B. tom. 2. l. 18. 451.

Osmunda vulgò. v. Filix.

Ostria Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. v. Carpinus.

Ostrys Theophrasti I. B. v. Carpinus.

Otites vulgò. v. Lychnis.

Oxalis ejusque species I. B. v. Acetosa.

* OXYS, sive Trifolium acetosum vulgare Moris. Hist. 2. 183. C. B. P. 330. Oxis, sive Trifolium acidum, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 387. Acetofella vulgò.

* Eadem flore purpurascente I. B. tom. 2. l. 387. C. B. P. Var. 330.

Oxys Africana, flore purpureo magno, radice bulbosâ. Oxys affinis planta bulbosa Afri-

cana, flore purpureo magno *Breyn. Cent.*
102. Trifolium bulbosum, flore albo Pro-
montorii Bonæ Spei. *Stapel. in Theoph.*
336.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
luteum minus repens & etiam procumbens
Morif. Hist. 2. 183. Oxis lutea *I. B. tom.* 2.
l. 17. 387. Trifolium acetosum cornicula-
tum *C. B. P.* 330.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
majus rectum, seu Virginianum *Morif. Hist.* 2.
184.

Oxya Græcorum I. B. v. Fagus,

Oxyacantha Dioscoridis C. B. P. v. Mespilus,

Oxyacantha vulgaris I. B. v. Mespilus.

Oxyacantha Virginiana. v. Mespilus.

Oxycedrus I. B. v. Juniperus.

P,



adus I. B. v. Cerasus,

POEONIA folio nigricante splendido,
quæ *Mas C. B. P.* 323. *Pœonia Mas* proce-
rior *I. B. tom.* 3. *l.* 30. 492.

Eadem foliis in latiora segmenta divisus *C. B. P.*
323.

Eadem flore incarnato *C. B. P. Var.* 323.

Pœonia communis vel Fœmina C. B. P. 323.

Pœo-

Pœonia Fœmina vulgatio I. B. tom. 3. l. 30. 492.

Pœonia Fœmina altera C. B. P. 323. *Pœonia promiscua strictiore folio* I. B. tom. 3. l. 30. 493.

Pœonia tenuius laciniata subtus pubescens, flore purpureo C. B. P. 323.

Pœonia folio subtus incano, flore albo C. B. P. 323.

Pœonia peregrina, flore saturatè rubente C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.

Eadem flore dilutè rubente C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.

Pœonia Fœmina, flore pleno rubro majore C. B. P. 324. *Pœonia flore pleno rubro* I. B. tom. 3. l. 30. 493.

Pœonia flore pleno rubro minore C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494.

Pœonia flore exalbido pleno major C. B. P. 324. *Pœonia albo flore pleno, sive Polyanthos alba Fœmina* I. B. tom. 3. l. 30. 494.

Eadem minor C. B. P. 324.

Pajomarioba ejusque species Pison. v. Senna.

PALIURUS Dodonæi. *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso* C. B. P. 477. *Rhamnus sive Paliurus, folio Jujubino* I. B. tom. 1. l. 6. 35.

PALMA major C. B. P. 506. Palma l. B. tom. 1. l. 3. 351. Palma Dactylifera seu Dactylus vulgò.

PALMA prunifera Japponica. Todda pan-
na Hort. Mal. tom. 3. 9.

PALMA Indica Coccifera angulosa C. B. P. 508. Palma Indica nucifera l. B. tom. 1. l. 3. 375. Tenga Hort. Mal. tom. 1. 1.

Palma minor C. B. P. Chamæriphes seu Palma humilis Hispanica spinosa l. B. tom. 1. l. 3. 370. Palma humilis longis latisque foliis C. B. P. v. Musa.

Palmata ejusque species l. B. v. Orchis.

Paludapium. v. Apium,

Panaces καρμιν Corn. v. Christophoriana.

PANAX Pastinacæ folio, an Syriacum Theophr. C. B. P. 156. Panax seu Panaces peregrinum Moris. Umbell. 40. Sphondyli-
lio vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis, Panax seu Pseudocostus flore luteo l. B. tom. 3. l. 27. 156.

Panax Sphondylii folio, sive Heracleum C. B. P. 157. Sphondylium majus sive Panax Heracleum quibusdam l. B. tom. 3. l. 27. 161.

Panax Asclepium Moris. v. Ferula.

Pancratium Monspelianum l. B. v. Narcissus.

Pancratii Monspeliani facie l. B. v. Narcissus.

Panja Hort. Mal. v. Gossampinus.

PANICUM Germanicum, sive paniculâ minore C. B. P. 27. Panicum vulgare I. B. tom. 2. l. 18. 440.

Panicum Italicum sive paniculâ majore C. B. P. 27. Panicum spicâ divulsâ I. B. tom. 2. l. 18. 440

Panicum sylvestre, spicâ divulsâ I. B. v. Gramen.

Papas Americanum I. B. v. Solanum.

PAPAYER corniculatum luteum, C. B. P. 171. *Morif. Hist. 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 398.*

Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum C. B. P. 171. *Morif. Hist. 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 399*

Papaver cornutum violaceum C. B. P. 172. *Morif. Hist. 2. 274. I. B. tom. 3. 30. 399.*

PAPAYER capitatum vulgare, seu spontaneum simplex, semine incano, vicens in segetibus *Morif. Hist. 2. 274.* Papaver vulgare, cujus capitula foraminibus hiant, semine incano ἀργυράνεον Dioscoridi C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine albo *Morif. Hist. 2. 275.* Papaver hortense semine albo C. B. P. 170. Papaver album I. B. tom. 3. l. 30. 390.

Papaver hortense flore cinereo, ungue purpureo C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine nigro *Morif. Hist. 2. 275.* Papaver hortense, nigro semine C. B. P. 170.

Papaver flore pleno albo *Morif. Hist.* 275. C. B. P. 171.

Papaver flore pleno nigro *Hist. Morif.* 275. C. B. P. 171.

Papaver hortense, flore pleno violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 136.

Papaver flore dilutè violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 136.

Papaver cristatum, flore & semine album *Morif. Hist.* 2. 275. C. B. P. 171. Papaver fimbriatum, flore albo I. B. tom. 3. l. 30. 391.

Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro *Morif. Hist.* 275. C. B. P. 171. Papaver fimbriatum, flore purpureo I. B. tom. 3. l. 30. 391.

Idem floribus ex albo & rubeo mixtis C. B. P. Var.

Idem flore simplici purpurascēte, unguibus plumbeis *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Idem flore multiplici incarnato C. B. P. Var. 171.

Idem flore multiplici purpurascēte C. B. P. Var. 171.

Idem flore miniato pleno C. B. P. Var. 171.

Idem flore argentei coloris C. B. P. Var. 171.

Idem multiplex album, oris rubicundis C. B. P. Var. 171.

Papaver laciniatis floribus C. B. P. 171.

Papaver flore pleno laciniato eleganter striato *Sutherl. Cat. Edenburg.* 260.

Papa-

Papaver spinosum luteum, foliis albis vènis notatis *Hist. Morisf. 2. 277.* **Papaver spinosum** C. B. P. 171. I. B. tom. 3. l. 30. 397. **Chicallotl** seu **Papaver spinosum** *Hernand. 215.*

PAPAVER erraticum, majus five *poias Morisf. Hist. 2. 277.* C. B. P. 171. **Papaver erraticum rubrum** campestre I. B. tom. 3. l. 30. 395.

Idem florum unguibus albis *Sutherl. Cat. Edinburg. 260.*

Idem flore carneo *Sutherl. Cat. Edinb. 260.*

Papaver erraticum, pleno flore *Morisf. Hist. 2. 277.* C. B. P. 171.

Papaver erraticum, flore phœniceo pleno, unguibus albis *Cat. Hort. Reg. Paris. 137.*

Idem flore miniato *Cat. Hort. Reg. Paris. 137.*

Idem flore igneo *Cat. Hort. Reg. Par. 137.*

Idem flore igneo marginibus candidis.

Idem flore purpurascente *Cat. Hort. Reg. Paris. 137.*

Papaver erraticum minus *Morisf. Hist. 2. 277.* C. B. P. 171.

PAPAVER erraticum Pyrenaicum, flore flavo C. B. P. 171.

Papaver erraticum majus, capitulis oblongis hirsutis.

Papaver Argemone dictum, capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato *Morisf. Hist. 2. 278.* **Argemone** capitulo brevior C. B. P. 171.

172. *Argemone capitulo breviorē hispido*
I. B. tom. 3. l. 3. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo tenuiore longiore hirsuto Moris. Hist. 2. 278. Argemone capitulo longiore C. B. P. 172. Argemone capitulo longiore spinoso I. B. tom. 3. l. 30. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo longiore glabro Moris. Hist. 2. 279.

Papaver Argemone dictum Cambrobritannicum luteum, capite longiore glabro, paucis spinulis ad loculamentorum juncturas ornato Moris. Hist. 2. 279.

PAPAVERI affinis montana *Aconitifolia*, *Ranunculi nemorensis radice. Aconitum humile bifolium, sive Aconitifolia flore albo unico Leucoji campanulato, fructu Cynosbati Menz. pugil.*

Papaver spumeum, vulgò ejusquē species. v. Lychnis.

Papaya Hernand. v. Pepo arborescens.

PARIETARIA *Dioscoridis & Officinarum C. B. P. 121. Moris. Hist. 2. 600. Parietaria I. B. tom. 2. l. 23. 976.*

Parietaria minor Ocymi folio C. B. P. 121. Parietaria Sicula, Alfines folio Boccon. 47. Moris. Hist. 2. 600.

Parietaria cærulea quorundam I. B. v. Melampyrum.

Paro-

Parietaria Lipsiensium vulgò. v. *Melampyrum*
Paronychia Hispanica Clusii I. B. v. *Polygonum*.

Paronychia Alsinifolia incana I. B. v. *Polygonum*.

Parthenium I. B. v. *Matricaria*.

PASTINACA tenuifolia fativa seu hortensis,
 radice albâ *Morif. Umbell.* 31. C. B. P. 151.
Pastinaca fativa, sive *Carota alba* I. B. tom. 3.
 l. 27. 64. *Daucus* vulgò.

Eadem radice luteâ *Morif. Umb.* 31. C. B. P.
 151. *Pastinaca fativa*, sive *Carota lutea*
 I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Eadem radice rubrâ *Morif. Umbell.* 31. *Pasti-*
naca tenuifolia fativa, radice atrorubente
 C. B. P. 151. *Pastinaca fativa*, sive *Carota ru-*
bra I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Pastinaca tenuifolia sylvestris genuina *Diosco-*
ridis vel, *Daucus Officinarum* *Morif. Umb.*
 31. C. B. P. 151. *Pastinaca sylvestris*, sive *Sta-*
phylinus Græcorum I. B. tom. 3. l. 27. 62.

Pastinaca tenuifolia sylvestris lucida *Morif.*
Umbell. 31. & 56.

Pastinaca tenuifolia sylvestris, radice & um-
 bellâ luteâ *Morif. Umb.* 31. & 56. *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 137.

Pastinaca tenuifolia Cretica, capitulis globo-
 sis *Morif. Umb.* 31. 32. *Cuminum sylvestre*,
 capitulis globosis C. B. P. 146. *Cuminum*
 syl-

sylvestre primum, valdè odoratum globulosum *I. B. tom. 3. l. 27. 23.*

PASTINACA latifolia sativa *Morif. Umbell.* 38. *C. B. P. 155.* Pastinaca sativa latifolia Germanica, luteo flore *I. B. tom. 3. l. 27. 151.*

* Pastinaca latifolia sylvestris *Morif. Umbell.* 39. *C. B. P. 155.* Pastinaca Germanica sylvestris, quibusdam Elaphoboscum *I. B. tom. 3. l. 27. 149.*

Pecten Veneris I. B. v. Scandix.

* **P**EDICULARIS pratensis purpurea *C. B. P.* 163. Pedicularis quibusdam, Crista galli, flore rubro & albo *I. B. tom. 3. l. 30. 437.* ANN.

* Pedicularis pratensis lutea, vel Crista Galli *C. B. P. 193.* Crista Galli Fœmina *I. B. tom. 3. l. 30. 436.* ANN.

Pedicularis palustris rubra elatior *I. Raj. Cat.* 226. ANN.

Pedicularis bulbosa *I. B. tom. 3. l. 30. 438.* Filipendula montana, flore Pediculariæ *C. B. P.* 163.

PENTAPHYLLOIDES majus erectum, flore albo, foliis alatis & hirsutis ternis *Morif. Hist. 2. 192.* Pentaphylloides erectum *I. B. tom. 2. l. 17. 398.* Quinquefolium Fragiferum *C. B. P. 326.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo, ternis foliis Fragariæ instar hirsutis *Morif. Hist.*

Hist. 2. 193. Pentaphylloides *Fragariæ* folio *Morif. Hort. Bles.* 292. *Fragaria* Pentaphylli fructu *Morif. Hort. Bles.* 265.

Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis *Geranii* supini instar *Morif.*

Hist. 2. 193. Quinquefolio *Fragifero* affinis *C. B. P.* 326. Pentaphylloides supinum *I. B. tom.* 2. l. 17. 398.

* Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis argenteis & serratis, flore luteo *Morif. Hist.* 2. 193. *Potentilla C. B. P.* 321. *Potentilla* sive *Argentina I. B. tom.* 2. l. 17. 398. *Anserina* vulgò.

Pentaphylloides rectum fruticosum *Éboracense Morif. Hist.* 2. 193. Pentaphylloides fruticosum *Raji Cat.* 228.

PENTAPHYLLUM, seu potius Heptaphyllum majus luteum montanum, flore majore *Morif. Hist.* 2. 188. Pentaphyllum rectum majus *I. B. tom.* 2. l. 17. Quinquefolium rectum luteum *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum, seu Heptaphyllum albo-pallidum, seu flore ochroleuco, petalis singulis cordatis *Morif. Hist.* 2. 188. Quinquefolium rectum subluteum *C. B. P. Var.* 325.

* Pentaphyllum, seu Heptaphyllum majus erectum rubrum palustre *Morif. Hist.* 2. 189. Quinquefolium palustre rubrum *C. B. P.* 326. Pentaphyllum vel potius Heptaphyllum

- lum flore rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*
- Pentaphyllum minus rectum subtus incanum;
flore albo *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefo-
lium album majus alterum *C. B. P. 325.* Pen-
taphyllon album *I. B. tom. 2. l. 19. 398.*
- Pentaphyllum minus erectum hirsutum, flore
albo *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefolium al-
bum minus alterum *C. B. P. 325.*
- *Pentaphyllum minus procumbens, flore lu-
teo, vulgare, radículas emittens ex genicu-
lis *Morif. Hist. 2. 189.* Quinquefolium ma-
jus repens *C. B. P. 325.* Pentaphyllum, sive
Quinquefolium vulgare repens *I. B. tom. 2.
l. 17. 397.*
- Pentaphyllum foliis profundè sectis subtus
argenteis, flore luteo *Morif. Hist. 2. 190.*
Pentaphyllum rectum, foliis profundè se-
ctis, subtus argenteis, flore luteo *I. B. tom.
2. l. 17. 398.* Quinquefolium folio argenteo
C. B. P. 325.
- *Pentaphyllum aut potiùs Heptaphyllon, flo-
re aureo tetrapetalo Tormentilla dictum
Morif. Hist. 2. 190. Tormentilla sylvestris
C. B. P. 236. Tormentilla *I. B. tom. 2. l. 17.
598.*
- *Idem minus, flore pentapetalo.
- Peplios Lutetianorum I. B. v. Capparis.*
Peplus C. B. P. v. Tithymalus.

Pepo Indicus compressus maximus *Morif. Hist.* 2. 25. Pepo compressus major C. B. P.

311. Cucurbita aspera folio non fisso, fructu albo maximo sessili *I. B. tom.* 2. l. 16.

221. ANN.

Pepo compressus minor *Morif. Hist.* 2. 25. C. B. P. 311. ANN.

Pepo oblongus *Morif. Hist.* 311. ANN.

Pepo major rotundus, flore luteo, folio aspero. Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero C. B. P. 312. Cucurbita foliis asperis, sive Zucha flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 16. 218. ANN.

Pepo minor verrucosus *Morif. Hist.* 2. 26. Cucurbita verrucosa C. B. P. 313. *I. B. tom.* 2. l. 16. 222. ANN.

Pepo seu Melopepo latus clypeiformis absque capreolis *Morif. Hist.* 2. 39. Melopepo clypeiformis C. B. P. 312. Cucurbita clypeiformis sive Siciliana, Melopepo latus à nonnullis vocata *I. B. tom.* 2. l. 16. 224. ANN.

Pepo clypeatus minor *Morif. Hist.* 2. 26. C. B. P. 310. Cucurbita capitata Tabernæmontani, sive clypeiformis *I. B. tom.* 2. l. 16. 225. ANN.

Pepo Pyriformis *Morif. Hist.* 2. 26. An Cucurbita aspera Pyriformis parva alba *I. B. tom.* 2. l. 16. 223? ANN.

Pepo Pomiformis *Morif. Hist.* 2. 26. Pepo rotundus Arantii formâ C. B. P. 311. Cucurbita aspera, cortice molli, alba, magnitudine

Arantii I. B. tom. 2. l. 16. 226. ANN.

Pepo Indicus minor angulosus Tabernæmontani I. B. tom. 2. l. 16. 226. Morisf. Hist. 2. 39.

Pepo minor angulosus C. B. P. 311. ANN.

Pepo Indicus reticulatus, seminibus albis major. Cucumis Ægyptius reticulatus, sive Luffa Arabum Vesling. in Alpin. 48. Morisf. Hist. 2. 35. Wæthakolu Zeylonensibus.

Idem minor Tittawætha Zeylonensibus. ANN.

Idem seminibus nigris, minor. ANN.

Reticulati Peponis, feminibus rhomboideis depressis, in ambitu membranaceâ alâ fimbriatis, species tres ex Oriente advexi, quæ flores & fructus perfecerunt in Horto. Prima à Veslingio in observationibus ad Alpinum eleganter est expressa. Secunda & tertia priori accedunt, sed folia ferunt integra & fructus triplo minores; Illi sunt semina alba; Huic nigra. Licet verò Veslingius Peponem suum cibus inutilem pronunciaverit, tamen prioris utriusque fructus, antequam ad maturitatem pervenerunt, adsumuntur in India ad rem culinariam. Dempto enim cortice, coquitur interior tenella pulpa in aquâ, exempta vel in butyro seu oleo frigitur, vel cum lacte aliisque jusculis paratur. Hunc in usum conferuntur in hortis. Posterior seminibus nigris sylvestris est, in declivibus humidis pro-

provenit & ob intensam suam amaritatem è
culinis proscribitur.

PEPO arborescens *Column. in Hernand. 870.*
Arbor Platani folio, fructu Peponis magni-
tudine eduli *C. B. P. 431.* Ficum specie
fructus Peruanus *C. B. P. 457.* Papaye Peru-
vianis *I. B. tom. 1. l. 1. 147.* Mamæra Fœmi-
na *Clus. Cur. post. 79.* Papaya *Hernand. 99.*
Papayamaram *Hort. Mal. tom. 1. 23.* Pino-
guacu Fœmina *Pis. 159.* Fanyaycu *Boym.*
Flor. Sinens. Ionslon. Mantif. de Arbor
474.

Perchepier Anglorum I. B. v. Alchimilla.

PERFOLIATA vulgatissima, sive arvensis
C. B. P. 277. Morif. Umb. 26. Perfoliata sim-
pliciter dicta vulgaris annua *I. B. tom. 3. l.*
27. 298. ANN.

Perfoliata annua longioribus foliis *Morif.*
Umb. 26. I. B. tom. 3. l. 27. 298. Perfoliata
montana latifolia *C. B. P. 277. ANN.*

Perfoliata minima, Bupleuri folio *Mo-
rif. Umb. 26.* Perfoliata minor angustifolia,
Bupleuri folio *C. B. P. 277.*

PERICLYMENUM non perfoliatum Germa-
nicum *C. B. P. 322.* Periclymenum, sive Ca-
prifolium non perfoliatum *I. B. tom. 2. l. 15.*
104.

Periclymenum perfoliatum C. B. P. 302. I. B.
tom. 2. l. 15. 104.

Periclymenum perfoliatum Virginianum
semper virens & florens.

Frutex hic Virginianus eleganti perpetuâ
comâ viget & floret. Periclymeno perfolia-
to præcedenti videtur conformis, sed om-
nibus partibus minor & gracilior. Folia
sunt paulo rotundiora, lucida, infernâ par-
te magis incana. Flores ad summos viti-
culos ordine quasi verticillato prodeuntes,
odore equidem nullo evidenti sunt; ast co-
lore amœnissimo, fulgenti cocco splenden-
te, effigiequè tubum venatorium perbelle
exprimunt, orificio in quinque æquales
crenas laciniato. E medio profluunt stamina
lutea apiculata cum stylo pallido longiori.
Singulis floribus subjicitur capitulum par-
vum herbaceum lucidum, fructus inchoa-
mentum, quod in baccam abit more con-
generum.

Periclymenum rectum Alpinum, fructu rubro
geminò duobus punctis notato. Chamæ-
cerasus Alpina, fructu rubrogeminò, duo-
bus punctis notato C. B. P. 451. Chamæ-
cerasus Gesneri, vel Chamæpericlymenon
quoddam Alpinum I. B. tom. 2. l. 15. 107.

Periclymenum rectum, fructu cœruleo I. B.
tom. 2. l. 15. 106. Chamæcerasus montana,
fructu singulari cœruleo C. B. P. 451.

Peri-

LUGDUNO-BATAVUS. 485

PERICLYMENUM PERFOLIATUM VIRGINIANUM
SEMPER VIRENS ET FLORENS.



Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. tom.
2. l. 15. 107. Chamæcerasus dumetorum,
fructu gemino rubro C. B. P. 451.

PERSICA malus I. B. tom. 1. l. 2. 157. Per-
sica molli carne & vulgaris & alba C. B. P.
440.

Persica malus vulgaris, flore pleno *Cat. Hort.
Reg. Paris.* 117.

Persica malus, fructu succo quasi sanguineo
turgente. Persica fructu quasi sanguineo
C. B. P. 440.

Persica malus Duracina Ruell. *Cat. Hort. Reg.
Paris.* 117.

Persica malus odore fructu, sanguineo succo
turgente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Persica malus, Amygdalo insita *Cat. Hort.
Reg. Paris.* 117. Persica Amygdaloides.

Persica malus juglandi insita *Cat. Hort. Reg.
Paris.* 117. Nuci-Persica *Matth.*

Persica malus, Pruno insita, Pruno-persica
vulgò.

Persica malus fructu rubro & viridi eleganter
variegato *Munting. prax. l. 1.* 43.

Persica malus fructu ex viridi luteo *Munting.
Prax. l. 1.* 43.

Persica malus fructu toto luteo *Munting. Prax.
l. 1.* 43. Persica Hispanica, Melacotonea
quorundam I. B. tom. 1. l. 2. 162.

Persica malus montana *Munting. Prax. l. 1.* 43.
Per-

Perfica malus Swollana *Munting. Prax. l.*

I. 43.

Perfica malus nana, fructu præcoci odorato
Munting. Prax. l. 1. 43. An malus Perfica
præcoci fructu, præcoqua dicta *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117.

Perfica malus Africana nana, flore incarnato
simplici. Amygdalus Africana vulgò,
Eadem flore incarnato pleno.

Complures emittit virgulas lignosas flexiles rubentes, quibus alternatim hærent folia semidigitalia in obtusum tendentia mucronem, Malo Persicâ angustiora, pallidè virentia per ambirum leviter serrata, crebrioribus venis & rugis inscripta, prodeuntibus ad singulorum exortum binis ex adverso tenuissimis corniculatis villis, velut in communi Persicâ. Ad summitates virgularum oriuntur flores parvi incarnati rosei coloris, insidentes quinque radiatis calicibus modo multiplici, aliquando simplici petalorum serie referti, coloris incarnati rosei jucundissimi, odoris languidi. Hos excipiunt fructus rotundi subhirsuti Persicæ quidem haud absimiles, sed triplo minores, saporis non adeò grati. Reperi hoc Arbutum sponte luxurians ad Promontorium Bonæ Spei; Inde vero in Europam redux, offendi in Anglorum hortis frequens, ex quibus in Belgium adferri curavi. Virgulis

junioribus solo submersis, de facili propagatur.

PERSICARIA mitis non maculosa *Morif. Hist.* 2. 588. C. B. P. 101.

Eadem maculosa *Morif. Hist.* 2. 588. C. B. P. Persicaria mitis.

Persicaria frutescens maculosa Virginiana, flore albo & carneo, Parkinsonii *Morif. Hist.* 2. 589.

Persicaria Salicis folio perennis.

Persicaria acris sive Hydro-piper *Morif. Hist.* 2. 588. I. B. tom. 3. l. 38. 580. Persicaria urens, sive Hydropiper C. B. P. 101.

Pes anserinus I. B. v. Atriplex.

PETASITES major & vulgaris C. B. P. 197.

Petasites vulgaris rubens, rotundiori folio I. B. tom. 3. l. 31. 566.

Petasites minor C. B. P. 197. Petasites albus anguloso folio I. B. tom. 3. l. 31. 568.

Petasites minor alter, Tussilaginis folio *Cat. Hort. Reg. Paris* 132.

Petasites Africanus, Calthæ palustris folio.

Novum hoc Petasitidis, genus ex palustribus Bonæ Spei in hortum translatum, foliis est rotundis, rigidis, crenatis, Calthæ palustris facie, radice flavescente crassâ, cetera vulgari simile.

Petro-

PERSICA MALUS AFRICANA NANA, FLORE INCARNATO PLENO.



Petromarula Cretica Belli. v. *Rapunculus*,
Petroselinum vulgò C. B. P. v. *Apium*.

PEUCEDANUM majus Italicum C. B. P. 149.
Morif. Umbell. 36. I. B. tom. 3. l. 27. 36

Peucedanum Germanicum C. B. P. 149. *Peu-*
cedanum Germanicum Morif. Umbell. 36.
 I. B. tom. 3. l. 27. 36.

PHALANGIUM parvo flore non ramosum
 C. B. P. 29. *Morif. Hist.* 2. 333. *Phalangium*
pulchrius non ramosum I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum C. B. P. 29.
Morif. Hist. 2. 333. *Phalangium parvo flo-*
re, quibusdam ramosius I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum, foliis fistu-
losis, annuum. Asphodelus folio fistuloso
plano minor ramosus, flore albo *Morif. Hist.*
 2. 331. *Asphodelus foliis fistulosis* C. B. P. 29.
Asphodelus minor, folio fistuloso I. B. tom. 2.
 l. 19. 631. ANN.

Phalangium magno flore C. B. P. v. *Asphode-*
lus.

Phalangium Allobrochicum, magnoflore Lilii
 I. B. *Morif.* v. *Asphodelus*.

Phalangium Virginianum ejusque species. v.
Ephemerum.

PHALARIS major, semine albo C. B. P. 28.
Phalaris *I. B. tom. 2. l. 18. 442.*

Phalaris major, semine nigro C. B. P. 28. *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*

PHASEOLUS major, sive Smilax hortensis
Morif. Hist. 2. 68. C. B. P. 339. Smilax horten-
tensis I. B. tom. 2. l. 17. 253. Fructu albo. ANN.

Idem fructu nigro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu flavo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu livido. ANN.

Idem fructu pallido. ANN.

Idem fructu violaceo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. descr. ANN.*

Idem fructu ex rubro & nigro variegato. ANN.

Idem fructu albo, nigris venis & lituris distincto *I. B. tom. 2. l. 17. 253. ANN.*

Idem fructu purpurascente, orbibus albis variegato. ANN.

Ejusdem alia species, floris & fructus colore & magnitudine differentes.

Phaseolus hortensis, fructu albo minore ovi-formi Venerous dictus *Hoffm. Cat. Alt. ANN.*

Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo
Hist. Morif. 2. 69. Phaseolus puniceo flore
Corn. 185. ANN.

Phaseolus Æthiopicus lobis flavescentibus
fructu nigro C. B. P. 341. ANN.

Pha-

Phaseolus peregrinus hortensi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato C. B. P.

340. *Phaseolus lato striato, sive radiato semine: alter punctatus cupulâ atrovirente I. B. tom. 2. l. 17. 267. ANN.*

Phaseolus Ægyptius nigro semine C. B. P. 341.

Phaseolus Lablab Alpini I. B. tom. 2. l. 17. 26.

Idem spadiceus, hilo albo C. B. P. Var. 341.

Phaseolus Leblab spadiceus, hilo longo albo I. B. tom. 2. l. 17. 27.

Phaseolus Surattensis siliquâ hirsutâ pungente Morif. Hist. 2. 69.

Phaseolus Africanus hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo.

Hujus semina ex declivibus irriguis montis Mensalis seu Tabulati Promontorii Bonæ Spei hûc advexi. Proferebant autem plantam sarmentosam circiter trium ulnarum longitudine more Phaseoli hortensis, emittentem ex radice lignosâ albâ fibrosâ sarmenta tenuia terna quaternave valde ramosâ, folia subrotunda obtusè mucronata, subhirsuta, glutinosa bitumen quadantenus redolentia, flores papilionaceos flavos aliquando lineolis purpureis inscriptos, semina rotunda nigra parva hilo albo exiguo, in siliquis parvis tumidis villosis. Diligenter custoditâ viget totâ hyeme multosque annos durat.

Pha-

PHASEOLUS AFRICANUS HIRSUTUS BITUMINO-
SUS, SILIQUIS BULLATIS, FLORE FLAVO.



Phaseolus minor, fructu albo, umbilico maculâ nigrâ notato, vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum maculâ nigrâ insignito *Morif. Hist.* 2. 69. *Phaseolus peregrinus*, minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito *C. B. P.* 340. *Phaseolus niveus minor*, circa hilum nigrâ maculâ insignitus *I. B. tom.* 2. *l.* 17. 260. ANN.

Phaseolus minimus, fructu rubro, siliquis longissimis erectis *Morif. Hist.* 2. 69. ANN.

Phaseolus minimus, fructu viridi exiguo ovato, siliquis longis rotundis rectis *Hist. Morif.* 2. 70. ANN.

Phaseolus orthocaulis, Mungo dictus *Fab. Column. in Hernand.* 887. ANN.

Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato, seminibus fuscis orbiculatis, Caracalla dictus. *Phaseolus Indicus*, cochleato flore *Triumfetti Observ.* 92.

PHASEOLUS alatus, sive *Abrus minor*, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato *Morif. Hist.* 2. 67. & 71. *Pisum Indicum minus coccineum* *C. B. P.* 343. *Pisum Americanum coccineum*, aliis *Abrus* *I. B. tom.* 2. *l.* 17. 263. *Abrus Alpin. de Plant. Egypt.* 76. *Glyzyrrhiza Indica* vulgò.

Phaseolus alatus Indicus, fructu fusco orbiculato maximo, lobis latissimis & longissimis.

Pus-

Puswæl Zeylonensibus Mus. Zeyl.

Phaseolus alatus arboreus, fructu orbiculato compresso coccineo. Mandhathija seu Mara Mus. Zeylan. . . .

Phellandrium I. B. v. *Cicutaria*.

PHILLYREA latifolia lævis C. B. P. 476.

Phillyrea arbor Lobelio I. B. tom. I. l. 5. 531.

Phillyrea latifolia spinosa C. B. P. 476. *Phillyrea folio Ilicis* I. B. tom. I. l. 5. 532. Folio ampliori.

Eadem folio angustiori.

Phillyrea folio leviter serrato C. B. P. 476. An *Phillyrea folio Alaterni* I. B. tom. I. l. 5. 532?

Phillyrea folio Ligustri C. B. P. 476. *Phillyrea latiusculo folio* I. B. tom. I. l. 5. 539.

Phillyrea angustifolia prima C. B. P. 476. *Phillyrea angustifolia* I. B. tom. I. l. 5. 538.

Phœnix Lolio similis I. B. v. *Gramen*.

Phyllica ejusque species C. B. P. v. *Alaternus*.

Phyllitis ejusque species I. B. v. *Lingua cervina*.

Phyllum testiculatum C. B. P. v. *Mercurialis*.

Phyllum arrhenogonon, folio incano Monspessulanum I. B. v. *Mercurialis*.

Phyteuma I. B. v. *Reseda*.

Picea major prima C. B. P. v. *Abies*.

Picea Latinorum, sive Mas Theophrasti I. B. v. *Abies*.

PILOSELLA major repens hirsuta C.B.P. 262.
 Pilosella majori flore, sive vulgaris I. B.
tom. 2. l. 24. 1039.

Eadem minus hirsuta C.B.P. 262. Pilosella
 minor, folio angustiore, minus piloso re-
 pens I. B. *tom. 2. l. 24. 1040.*

Pilosella incanaramosa Ragusina. v. Hieracium.

Pilosella Indica Cornuti. v. Hieracium in App.

Pilosella siliquosa I. B. v. Draba.

PIMPINELLA maxima Canadensis alba spi-
 cata *Corn. 175. Moris. Umb. 57.*

Pimpinella spicâ brevi rubrâ *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Sanguisorba major C.B.P. 160.

Sanguisorba major, flore spadiceo I. B. *tom.*
3. l. 27. 120.

Pimpinella spicâ brevi minor, lævis non pi-
 losa *Moris. Umb. 57.* Pimpinella Sanguisor-
 ba minor lævis C.B.P. 160. Sanguisorba mi-
 nor I. B. *tom. 3. l. 27. 113.*

Eadem hirsuta. Pimpinella Sanguisorba mi-
 nor hirsuta C. B. P. 160.

Pimpinella spinosa, seu sempervirens *Moris.*
Umbell. 57. Poterio affinis, foliis Pimpinel-
 læ, spinosa C. B. P. 388.

Pimpinella Agrimonoides *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Saxifraga ejusque species C. B. P.
v. Saxifraga.

Pinoguaçu Pison. v. Pepo arborescens.

PINUS sativa C. B. P. 491. Pinus ossiculis duris, foliis longis *I. B. tom. 1. l. 9. 248.*

Pinus maritima major C. B. P. 492. Pinus sylvestris maritima, conis firmiter ramis adherentibus *I. B. tom. 1. l. 9. 245.*

Pinus maritima minor C. B. P. 492. Pinafter tertius Hispanicus pumilus *I. B. tom. 1. l. 9. 246.*

Piper Indicum ejusque species. v. Solanum.

PISTACIA peregrina, fructu racemoso, sive Therebinthus Indica Theoph. C. B. P. 401. Pistacia *I. B. tom. 1. l. 3. 275.*

Pistacia sylvestris C. B. P. v. Staphylodendron.

Pistacia sylvestris trifolia Virginienfis Cat. Hort. Reg. Paris. v. Staphylodendron.

Pistolochia. v. Aristolochia.

PISUM majus, flore albo *Morif. Hist. 2. 46.*

Pisum majus quadratum C. B. P. 342. An

Pisa rubra variegata *I. B. tom. 2. l. 17. 298?*

Idem fructu candido C. B. P. Var. 342. Pisa majora alba *I. B. tom. 2. l. 17. 299.*

Pisum umbellatum C. B. P. 342. *Morif. Hist. 2.*

46. Pisum erectius comosum *I. B. tom. 2. l. 15. 299.*

Pisum ramulare, hilo nigro *Morif. Hist. 2. 47.*

Pisum hortense majus C. B. P. 342.

Pisum leptolobum, sive sine cortice duriore
Camer. *Morif. Hist.* 2. 47. C. B. P. 343. Pifa
sine tunicis durioribus, in filiquâ magnâ albâ
I. B. tom. 2. l. 17. 300.

Idem minus.

Pisum spontaneum petenne repens humile
Morif. Hist. 2. 47.

Pisum spontaneum nanum inter Triticum *Mo-
rif. Hist.* 2. 47. Pisum arvense C. B. P. 342.

Pisa arvensia I. B. tom. 2. l. 17. 267. Fructu ro-
tundo albo C. B. P. *Var.* 343.

Idem fructu viridi C. B. P. *Var.* 343. Pisa par-
va viridia I. B. tom. 2. l. 17. 298.

Idem fructu ex luteo virente C. B. P. *Var.* 343.

Pisa hana rotunda, sine adminiculis, recta *Cat.
Hort. Reg. Paris.* 143.

Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ
notato C. B. P. v. Cor Indum.

Pisum Indicum minus coccineum C. B. P. v.
Phascolus.

Pitine Anguillare I. B. v. Lathyrus.

P L A N T A G O latifolia sinuata C. B. P. 189.
Plantago major, folio glabro non lacinia-
to, ut plurimum I. B. tom. 3. l. 31. 503.

* Plantago latifolia incana C. B. P. 189. Plantago
major hirsuta, media à nonnullis cognomi-
nata I. B. tom. 3. l. 31. 504.

Plantago latifolia Rosea, flore expanso C. B. P.

189. I. B. tom. 3. l. 31. 703.

Plantago latifolia Rosea, floribus quasi in spicâ dispositis C. B. P. 189. *Plantago* Rosea I. B. tom. 3. l. 31. 503.

* *Plantago latifolia hirsuta minor* C. B. P. 189.

Plantago latifolia minor I. B. tom. 3. l. 31. 505.

* *Plantago angustifolia major* C. B. P. 189. *Plantago lanceolata* I. B. tom. 3. l. 31. 505.

Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C. B. P. 189. *Plantago quinquenervia*, cum globulis albis pilosis I. B. tom. 3. l. 31. 504.

* *Plantago trinervia*, folio angustissimo C. B. P. 189.

* *PLANTAGO aquatica latifolia* C. B. P. 190. *Plantago aquatica* I. B. tom. 3. l. 38. 787.

Plantago aquatica angustifolia C. B. P. 190.

Plantago aquatica humilis angustifolia I. B. tom. 3. l. 38. 788.

Plantaginella palustris C. B. P. v. *Ranunculus*.

PLATANUS Matth. C. B. P. 431. I. B. tom. 1.

l. 8. 170. *Platanus Orientalis* verus *Parkins Theatr.* 1427. Pilulis majoribus.

Platanus Occidentalis aut *Virginienfis* *Parkins. Theatr.* 1427. Pilulis minoribus.

Platanus falsò multis I. B. v. *Acer*.

Polemonium Gesneri. v. *Lychnis sylvestris*.

Polemonium flore luteo I. B. v. *Jasminum*.

Posit Germanis I. B. v. Fungus.

POLIUM Lavendulæ folio C. B. P. 120.

Polium montanum luteum C. B. P. 120.

Polium montanum album C. B. P. 221. An Polium Monspeffulanum I. B. tom. 3. l. 28. 299?

Polium maritimum supinum Venetum C. B. P. 221. Polium Venetum I. B. tom. 3. l. 28. 300.

* **P**OLYGALA vulgaris C. B. P. 215. Polygala tetrapetala, filiculosa bicapsularis, longo & angusto folio, minor Moris. Hist. 2. 326. Polyganon multis I. B. tom. 386. Flos Ambervalis vulgò. ANN.

* Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist. 2. 326. ANN.

* Eadem flore violaceo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist. 2. 326. ANN.

* Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist. 2. 326. ANN.

Polygala frutescens Capitis Bonæ Spei Breyn. Cent. 1.

Polygala altera fruticosior, foliis latioribus v. Colutea.

Polygala major Massiliotica C. B. P. v. Colutea.

Polygala altera C. B. P. v. Colutea.

Polygala Valentina Clusii. v. Colutea.

Polygala dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis, Moris. v. Colutea.

Poly-

Polygala enneaphyllos I. B. v. Colutea.

Polygalæ similis Cortusi I. B. v. Colutea.

* **P**OLYGONATUM latifolium vulgare C. B. P. 303. Polygonatum, vulgò Sigillum Salomonis I. B. tom. 3. l. 31. 529. Cauliculis viridantibus.

* Idem cauliculis rubentibus.

Polygonatum latifolium, flore duplici odore Cat. Hort. Reg. Paris. 144. Sigillum Salomonis flore pleno, Dod. Mem. 115.

* Polygonatum latifolium maximum C. B. P. 303. Polygonatum majus, vulgari simile I. B. tom. 3. l. 31. 529.

Polygonatum latifolium, Ellebori albi foliis C. B. P. 303.

Polygonatum latifolium, flore majore odore C. B. P. 303. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis I. B. tom. 3. l. 31. 529.

* Polygonatum latifolium minus, flore majore C. B. P. 303.

Polygonatum angustifolium non ramosum C. B. P. 303. Polygonatum angustifolium I. B. tom. 3. l. 31. 531.

POLYGONATUM ramosum, flore luteo majus, Cornuti 38. Sigillum Indicum, flore luteo Stapelii 1067.

Polygonatum racemosum Corn. v. Liliū convallium.

Polygonon multis I. B. v. *Polygala*.

- * **P**OLYGONUM latifolium C. B. P. 281. *Morif. Hist.* 2. 591. Polygonum, sive Centinoda I. B. tom. 3. l. 29. 375. ANN.
- * Idem angustifolium, folio oblongo *Morif. Hist.* 2. 51. C. B. P. 281. Polygonum angustifolium I. B. tom. 3. l. 375. ANN.

POLYGONUM montanum minimum niveum & sericeum *Morif. Hist.* 2. 592. Polygonum minus candicans C. B. P. 281. Paronychia Hispanica Clusii, sive Anthyllis nivea I. B. tom. 3. l. 19. 374. ANN.

- * Polygonum litoreum minus, flosculis spadiceo albicantibus *Morif. Hist.* 2. 593. C. B. P. 281. ANN.

- * Polygonum minus, sive Millegrana major C. B. P. 281. Herniaria glabra *Morif. Hist.* 2. 593. Herniaria I. B. tom. 3. l. 19. 378. ANN.

- * Polygonum minimum, seu Millegrana minima *Morif. Hist.* 2. 593. C. B. P. 282. An Polygonum vel Linifolia per terram sparsa, flore Scorpioidis I. B. tom. 3. l. 29. 379. ANN.

- * Polygonum parvum, flore albo verticillato I. B. tom. 3. l. 29. 378. *Morif. Hist.* 2. 594. ANN.

- * Polygonum angustifolium, vel Gramineo folio minus repens C. B. P. 281. Polygonum Germanis Knawel Tragi *Morif. Hist.* 2. 591. poly-

- Polygonum tertium Dodonæi, sive tenuifolium* I. B. tom. 3. l. 29. 377. ANN.
- * *Polygonum maritimum, folio Alfinis Moris. Hist. 2. 594. Anthyllis maritima, Alfine foliis* C. B. P. 282. *Paronychia Alsinifolia incana* I. B. tom. 3. l. 29. 367. ANN.
- Polygonum perenne procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congestis Moris. v. Pyrolæ affinis.*
- Polygonum Gesneri* I. B. v. *Onobrychis.*
- Polygonum multis* I. B. v. *Polygala.*
- * **P**OLYPODIUM vulgare C. B. P. 359. *Polypodium* I. B. tom. 3. l. 37. 746.
- Polytrichon aureum ejusque species* C. B. P. & *Comel. v. Muscus capillaris.*
- Poma Adami* I. B. v. *Malus Limonia.*
- Ponnam Tangera Hort. Mal. v. Senna.*
- * **P**OPULUS alba C. B. P. 429. *Populus alba, λεύκη* I. B. tom. 1. l. 8. 160.
- * *Populus nigra* C. B. P. 429. *Populus nigra, sive αἰγίλη* I. B. tom. 1. l. 8. 159.
- * *Populus tremula* C. B. P. 429. *Populus Lybica, κίρκις* Theoph. I. B. tom. 1. l. 8. 163.
- P**ORRUM commune capitatum C. B. P. 72. *Moris. Hist. 2. 393. Porrum* I. B. tom. 2. l. 19. 551.
- Porrum sectivum latifolium* C. B. P. 72. *Moris. Hist. 2. 390.*

Porrum vitigineum, caule folia perforante
Morif. Hist. 2. 391.

Porrum sectivum juncifolium C. B. P. v. Ceba.

PORTULACA latifolia sativa C. B. P. 288. *Morif. Hist. 2. 570.* Portulaca hortensis latifolia
I. B. tom. 3. l. 35. 678. ANN.

Eadem foliis flavis *Morif. Hist. 2. 570.* Flave-
 scens seu foliis aureis *Cat. Hort. Reg. Par. 146. ANN.*

* Portulaca angustifolia, sive sylvestris C. B. P. 288. *Morif. Hist. 2. 571.* Portulaca sylvestris minor, sive spontanea *I. B. tom. 3. l. 35. 678. ANN.*

* **P**OTAMOGETON rotundifolium C. B. P. 193. *Morif. Hist. 2. 586.* Potamogeton rotundiori folio *I. B. tom. 3. l. 38. 776.*

* Potamogeton Salicis folio C. B. P. 193. *Morif. Hist. 2. 587.* Potamogeton sive Fontalis Persicariæ folio *I. B. tom. 3. l. 38. 777.*

* Potamogeton foliis latis splendentibus C. B. P. 193. *Hist. Morif. 2. 587.* Potamogeton altera Dodonæi *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

* Idem foliis angustis splendentibus C. B. P. 193. *Morif. Hist. 2. 587.* Fontinalis major lucens *I. B. tom. 3. l. 38. 777.*

* Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum C. B. P. 193. *Morif. Hist. 2. 587.* Fontinalis crispa *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

Poten.

Potentilla C. B. P. v. *Pentaphylloides*.

Potero affinis, foliis Pimpinellæ spinosæ C. B. P.
v. *Pimpinella*.

Pavist 1. B. v. *Fungus*.

Priapeja quibusdam 1. B. v. *Nicotiana*.

PPRIMULA veris, sive *Verbasculum pratense* odoratum C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 554. *Primula veris* odorata, flore luteo simplici 1. B. tom. 3. l. 30. 495.

**Primula veris*, seu *Verbasculum pratense*, vel *sylvaticum inodorum* C. B. P. 241. *Morif. Hist.* 2. 554. *Primula veris caulifera*, pallido flore inodoro aut vix odoro 1. B. tom. 3. l. 30. 496.

Eadem flore niveo C. B. P. *Var.* 241.

Primula veris hortensis, seu *Verbasculum Alpinum umbellatum majus* C. B. P. 242. *Morif. Hist.* 2. 555.

Ejusdem varietates plurimæ, variis è vario fatu coloribus descriptæ

Primula veris hortensis umbellata, caule & flore foliosa major coccinea.

Eadem flore foliosa minor lutea.

Prior videtur varietas *Primulæ veris* vulgaris hortensis umbellatæ, ex cujus seminibus in Angliâ natam referebat Dns Bobartus Horti Oxoniensis Præfectus, a qua ante aliquot annos hæc planta mihi est transmissa. Producit autem in superiori caulis par-

te, quâ florum pediculi exeunt, folia omnino similia iis, quæ radici proxima sunt, ast angustiora & breviora, ut plurimum quina, aliquando septena; Paria quoque foliola ungue vix ampliora subjiciuntur singulis floribus coccineis amplis, loco calicis. Cœtera omnia vulgari respondent.

Posterior à supra laudato Petro de Wolff nobis concessa, floribus est minoribus luteis, quibus singulis subsident folia oblonga angusta; Cœtera cum vulgari conveniunt.

Primula veris, seu Verbasculum Alpinum umbellatum minus *C. B. P.* 242. Primula veris minor rubra Eboracensis, foliis parvis glabris Auriculæ ursi instar *Morif. Hist.* 2. 555. Primula veris minor purpurascens *I. B. tom.* 3. l. 30. 499.

Primula veris montana laciniata. Sanicula montana latifolia laciniata *C. B. P.* 243. Sanicula montana latifolia laciniata *Morif. Hist.* 2. 558. Cortusa *I. B. tom.* 3. l. 30. 499.

Eadem Americana flore squallidè purpureo.

Primula veris, seu Verbasculum hortense proliferum *C. B. P.* 242. *Morif. Hist.* 2. 555. Primula veris caulifera prolifera odorata *I. B. tom.* 3. l. 30. 496.

Ejusdem differentiarum variarum, floribus modò geminis, modò trigeminis, vel majoribus, vel minoribus diversorum colorum insignes.

Pri-

PRIMULA VERIS HORTENSIS UMBELLATA, CAU-
LE ET FLORE FOLIOSA, MAIOR.



Primula veris, seu **Verbasculum hortense**
 multiplex *C. B. P.* 242. **Primula veris** cauli-
 fera maxima, flore pleno *I. B. tom. 3. l. 30.*
 496.

Primula veris, seu **Verbasculum sylvaticum**
 majus, singularibus floribus, singularibus
 cauliculis insistentibus *Morif. Hist. 2. 555.*
Verbasculum sylvestre minus, singulari flore
C. B. P. 242. **Primula veris**, floribus singula-
 ribus pallidis majoribus simplicibus *I. B.*
tom. 3. l. 30. 497.

Eadem flore viridi. **Primula veris**, floribus ob-
 scurè virentibus fimbriatis *I. B. tom. 3. l. 20.*
 498.

Primula veris, seu **Verbasculum Turcicum**,
 seu **Carchichec Turcarum** *Morif. Hist. 2.*
 555. **Primula veris Constantinopolitana**
Corn. 55. Flore simplici.

Eadem flore pleno. **Verbasculum sylvestre**
 magno plenoquè flore *C. B. P.* 242. **Primula**
veris, floribus plenis ex singularibus pedicu-
 lis *I. B. tom. 3. l. 30.* 497.

Utriusque differentia plurimæ, florum um-
 bone, petalorum numero, magnitudine &
 colore variantes.

Prunella. v. **Brunella.**

PRUNUS *C. B. P.* 443. *I. B. tom. 1. l. 2.*
 184.

Eadem flore pleno *Cat. Hort. Reg. Par. 146.*

Pruna

Pruna magna dulcia atro-coerulea C. B. P. 443.

Pruna parva dulcia, atro-coerulea Damascena dicta C. B. P. 443.

Pruna magna crassa subacida C. B. P. 443.

Pruna oblonga coerulea C. B. P. 443.

Pruna nigra, carne durâ C. B. P. 443.

Pruna coloris ceræ, ex candido in luteum pallescente C. B. P. 443. Præcocia majora C. B. P. Var. 443.

Eadem serotina minora C. B. P. Var. 443.

Pruna rotunda flava dulcia, Mali amplitudine C. B. P. 443.

Pruna magna rubra rotunda C. B. P. 443.

Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci C. B. P. 444.

Ejusdem aliæ species fructu differentes, varia insitione ablactatione inoculatione aut satione productæ.

**Prunus sylvestris C. B. P. 444. I. B. tom. 1. l. 2. 193. Acacia Germanica vulgò.*

P*RU**NO sylvestri affinis Canadensis C. B. P. app. 517. Hypericum frutescens Americanum flore albo Park. Theatr. 575.*

Pseudocostus flore luteo I. B. v. Panax.

Pseudo-cyperus Lobelio I. B. v. Gramen.

Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus C. B. P. v. Dictamnus.

Pseudo-digitalis Persicæ folio Bocr. v. Gratiolæ affinis.

Pseudo-

Pseudo-narcissus. v. *Narcissus*.

Pseudo-nardus I. B. v. *Lavandula*.

PSYLLIUM Dioscoridis vel Indicum, crenatis foliis I. B. tom. 3. l. 31. 514.

Psyllium majus supinum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

Psyllium majus erectum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

***P**TARMICA vulgaris, folio longo ferrato, flore albo I. B. tom. 3. l. 26. 147. *Dracunculus pratensis*, ferrato folio C. B. P. 98. Major & elatior,

Eadem minor & humilior.

Ptarmica pratensis, ferrato folio, flore pleno.

Dracunculus pratensis, ferrato folio, flore pleno C. B. P. 98.

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis *Absinthii æmulis*. *Absinthium Alpinum umbeliferum latifolium* C. B. P. 134. *Absinthium albis floribus*, capitulis squarosis I. B. tom. 3. l. 26. 183.

Ptarmica Austriaca vulgò *ejusque species* v. *Xeranthemum*.

Pthora major Moris. v. *Ranunculus*.

PULEGIUM latifolium C. B. P. 222. *Pulegium* I. B. tom. 3. l. 28. 256.

Pulegium angustifolium C. B. P. 222. *Pulegium*
Cer-

Cervinum angustifolium I. B. tom. 3. l. 28.
257. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Pulmonaria arborea I. B. v. Muscus.

Pulmonaria flore luteo I. B. Hieracium.

Pulmonariae luteae species magis laciniata I. B.
v. Hieracium.

Pulmonaria latifolia C. B. P. & *Pulmonaria Ita-*
lorum I. B. v. Symphytum minus.

Pulsatilla folio crassiore, flore majore dilu-
tiore *Moris. Hist. 2. 428.* Pulsatilla folio
crassiore & majore C. B. P. 177. Pulsatilla
purpurea coeruleavè I. B. tom. 3. l. 30. 409.

Pulsatilla flore minore saturatiore, & quasi ni-
gricante, folio magis & tenuius inciso *Mo-*
ris. Hist. 2. 428. Pulsatilla flore minore ni-
gricante C. B. P. 177. Pulsatilla flore clauso
I. B. tom. 3. l. 30. 410.

Pulsatilla Apii folio vernalis, flore majore
C. B. P. 177.

Puvetti Horti Mal. v. Solanum.

Pyracantha quibusdam I. B. v. Mespilus.

Pyramidalis levis I. B. v. Campanula.

PYRETHRUM Bellidis flore C. B. P.
148.

***P**YROLA rotundifolia major C. B. P. 191.
Pyrola I. B. tom. 3. l. 31. 535.

Pyrola folio mucronato serrato C. B. P. 191.
I. B.

I. B. tom. 3. l. 31. 536.

Pyrola frutescens Arbutifolia C. B. P. 191.

PYRUS sativa C. B. P. 439. *Pyrus I. B. tom. 1. l. 1. 35.*

Eadem flore pleno Cat. Hort. Reg. Paris. 148.

Pyri sativæ variâ arte & mangonio productæ species multivarix.

* *Pyrus sylvestris C. B. P. 439. Pyrafter seu Pyrus sylvestris I. B. tom. 1. l. 1. 57.*

Pyzielt Hernand. v. Nicotiana.

Q.



uadrifolium hortense album C. B. P. v. Trifolium.

Quamoclit. I. B. v. Convolvulus.

* **Q**UERCUS latifolia Mas, quæ brevi pediculo est, C. B. P. 419. *Quercus vulgaris brevibus pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

* *Quercus cum longo pediculo C. B. P. 420. Quercus vulgaris longis pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

Quercus calice echinato, glande majore C. B. P. 420. Cerrus, Ægilops Aspris Theophrasti putatata I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quercus pedem vix superans C. B. P. 420. Robur VIII. Clusio I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quin-

*Quinquefolium ejusque species v. Pentaphyl-
lum.*

*Quinquefolium siliquosum Alpini v. Sinapi-
strum.*

*Quinquefolium Lupini folio C. B. P. v. Sinapi-
strum.*

10

R.

Radix ursina I. B. v. Meum.

Radix Rhodia C. B. P. & I. B. v. Te-
lephium.

* **R**ANUNCULUS nemorosus, flore majore
Morif. Hist. 2. 437. Anemone nemorosa,
flore majore C. B. P. 178. Ranunculus phra-
gmities albus vernus I. B. tom. 3. l. 30. 412:

* Idem flore ex purpurâ rubente. Anemone ne-
morosa, flore majore ex purpurâ rubente.
C. B. P. Var. 178. Ranunculus phragmites
purpureus vernus I. B. tom. 2. l. 30. 412.

* Ranunculus nemorosus, flore majore albo
pleno. Anemone nemorosa, flore pleno al-
bo C. B. P. 177.

* Idem flore pleno purpureo. Anemone ne-
morosa, flore pleno purpureo C. B. P.
Var. 177.

* Ranunculus nemorosus luteus C. B. P. 178. *Mo-
rif. Hist. 2. 437. Ranunculus phragmites lu-
teus nemorosus I. B. tom. 3. l. 30. 413. Fo-
liis latioribus & flore unico C. B. P. Var. 178.*

K k

Idem

Idem foliis angustioribus, floribus duobus
& tribus. C. B. P. *Var.* 178.

Ranunculus nemorosus trifolius. Anemo-
ne trifolia C. B. P. 317. *Morif. Hist.* 2. 424.

Anemone trifolia, flore albo I. B. *tom.* 3. l.
30. 412.

Ranunculus nemorosus, flore herbacei coloris
foliofo. Anemonæ nemorosæ affinis pere-
grina secunda, flore herbacei coloris C. B. P.
177.

Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice
Morif. Hist. 2. 438. Oenanthe Hederæ foliis
C. B. P. 163. Oenanthe Myconii I. B. *tom.* 3.
l. 27. 192.

Ranunculus nemorosus, Moschatellina dictus
C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Moschatellina
foliis Fumariæ bulbosæ, de quâ Cordus I. B.
tom. 3. l. 26. 207.

Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio
subrotundo C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Ra-
nunculus rotundifolius vernus sylvaticus
I. B. *tom.* 3. *App.* 841. An Ranunculus ro-
tundifolius vernus sylvaticus major, sive
Cassubicus, foliis Thoræ seu Calthæ *Breyn.*
Prodr. 45?

Idem Virginianus parvo flore, molliori folio.

Ranunculus hic Virginianus à superiore
haud abhorret; sed flosculis & seminibus val-
de exiguis est, cæterisque partibus omnibus
tenerior & gracilior. Nominè Ranunculi

auri.

auricomi Virginiani à Dno Bobarto accepimus.

Ranunculus pratensis erectus acris C. B. P. 178. *Morif. Hist. 2. 439.* Ranunculus rectus non repens, flore simplici luteo I. B. tom. 3. l. 30. 416.

Ranunculus hortensis, erectus flore pleno C. B. P. 179. An Ranunculus pratensis erectus acris, flore pleno. *Sutherl. Catal. Edinb. 284.*

Ranunculus pratensis erectus dulcis C. B. P. 129. *Morif. Hist. 2. 439.*

Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. P. 139. Ranunculus rectus non repens, pleno flore I. B. tom. 3. l. 30. 416.

Ranunculus pratensis procumbens aut inclinans hirsutus *Morif. Hist. 2. 439.* Ranunculus pratensis repens hirsutus C. B. P. 129. Ranunculus repens, flore luteo simplici I. B. tom. 3. l. 30. 419.

Ranunculus hortensis inclinans C. B. P. 179. Ranunculus repens, flore pleno I. B. tom. 3. l. 30. 420. Ranunculus magnus hirsutus repens, flore pleno I. B. tom. 3. app. 857.

Ranunculus magnus valdè hirsutus, flore luteo I. B. tom. 3. l. 30. 417.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ C. B. P. 179. *Morif. Hist. 2. 439.* Ranunculus tuberosus major I. B. tom. 3. l. 30. 417.

Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. P. 179.

Ranunculus radice tuberosâ, flore pleno & prolifero C. B. P. Ranunculus maximo tubere, flore magno pleno I. B. tom. 3. l. 30. 418.

*Ranunculus echinatus arvensis C. B. P. 179. Morisf. Hist. 2. 440. I. B. tom. 3. App. 859.

Ranunculus echinatus stellatus Creticus C. B. P. 280. Morisf. Hist. 2. 440. Ranunculus stellatus palustris echinatus I. B. tom. 3. App. 858.

*Ranunculus palustris, Apii folio, lævis C. B. P. 180. Morisf. Hist. 2. 341. Ranunculus palustris, flore minimo I. B. tom. 3. App. 858.

*Ranunculus aquaticus Hederaceus Morisf. Hist. 2. 441. Ranunculus aquaticus Hederaceus luteus C. B. P. 180. Ranunculus Hederaceus rivulorum, sed extendens, atrâ maculâ notatus I. B. tom. 3. l. 38. 782.

*Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio C. B. P. 180. Morisf. Hist. 2. 442. Cotyledon aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 781.

*Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo C. B. P. 180. Morisf. Hist. 2. 442. Ranunculus aquatilis albus I. B. tom. 3. l. 38. 781.

*Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. P. 180. Morisf. Hist. 2. 442. & Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo C. B. P. 141. Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius I. B. tom. 3. l. 38.

Ranunculus aquatilis albus fluitans, Peuced-

- cedani foliis. Ranunculus, five Polyanthemum aquatili albo affine, five Millefolium maratraphyllum fluitans *I. B. tom. 3. l. 38. 782.* Millefolium foliis Fœniculi, Ranunculi flore & capitulo *C. B. P. 141.*
- * Ranunculus longifolius palustris major *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 443.* Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii *I. B. tom. 3. App. 865.*
- * Ranunculus longifolius palustris minor *C. B. P. 180. Morif. Hist. 443.* Ranunculus longifolius, aliis Flammula *I. B. tom. 3. App. 865.*
- * Ranunculus palustris longifolius minor serratus *Morif. Hist. 2. 443.* Ranunculus palustris serratus *C. B. P. 180.*
- * Ranunculus palustris minimus, Plantaginis folio. Plantaginella palustris *C. B. P. 190.*
- Ranunculus montanus, Plantaginis folio *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 444.* Ranunculus Pyrenæus foliis sublongis non laciniatis, albo flore *I. B. tom. 3. App. 864.*
- Ranunculus montanus, Gramineo folio *C. B. P. 180. Morif. Hist. 2. 444.* Ranunculus pumilus Gramineis foliis *I. B. tom. 3. App. 566.*
- Ranunculus montanus, Gramineo folio, multiplex *C. B. P. 181.* Ranunculus Gramineus, pleno flore *I. B. tom. 3. App. 265.*
- Ranunculus lanuginosus, grumosa radice minor *C. B. P. 181. Morif. Hist. 2. 446.* Ranunculus Illirycus, radicibus bulbosis, foliis

longis *I. B. tom. 3. App. 863.*

Ranunculus lanuginosus, grumosa radice major *C. B. P. Moris. Hist. 2. 446.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, parvo flore *C. B. P. Var. 181. Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus autumnalis*, folio rotundo serrato *I. B. tom. 3. App. 866.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, *A-sphodeli* radice *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus Lusitanicus bullatus*, *I. B. tom. 3. App. 867.* Magno flore *C. B. P. Var. 181.*

Idem flore pleno & prolifero *Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus latifolius multiplex serotinus* *Corn. 95.*

Ranunculus Rutaceo folio, flore suavè rubente *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 448.* *Ranunculus Rutaceo folio* *I. B. tom. 3. l. 30. 414.*

Idem flore pleno. *Ranunculus Rutæ folio serotinus*, flore aureo pleno *Catal. Hort. Reg. Par. 152.* *Ranunculus flavus multiplex*, folio *Rutæ* *Ferr. Fl. Cult. 340.*

Idem flore sanguineo *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.* *Ranunculus Constantinopolitanus*, flore sanguineo pleno *I. B. tom. 3. App. 864.*

Idem flore pleno flavescente & rubris lineis elegantissimè variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 152.*

Idem prolifer miniatus *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.*

Idem

Idem Constantinopolitanus Gigas, flore coccineo *Cat. Hort. Reg. Paris*, 152.

Ranuncolorum Asphodeli radice, flore simplici & pleno multę species alię petalorum numero magnitudine figurę & colorum pulcherrimorum concursu discrepantes,

Ranunculus præcox rotundifolius, radice granulata *Moris*, v. *Chelidonia*.

Ranunculus montanus, *Aconiti folio*, flore globoso C. B. P. v. *Helleborus*.

Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici C. B. P. v. *Helleborus*.

Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa I. B. v. *Helleborus*.

RAPHANISTRUM siliquā articulata glabrā majore & minore *Moris*. *Hist.* 2. 265. Rapistrum luteum, siliquā glabrā articulata *Raj* 251. ANN.

* Raphanistrum flore albo striato, siliquā articulata striatā minore *Moris*. *Hist.* 2. 266. Rapistrum flore albo, siliquā articulata C. B. P. 95. Rapistrum flore albo striato. *Sinapi agreste album* *Trago* I. B. tom. 2. l. 21. 851. ANN.

RAPHANISTRUM maximum monospermum rotundifolium, capsulā glabrā *Moris* *Hist.* 2. 265. Rapistrum maximum monospermum rotundifolium *Corn.* 147. ANN. Raphanistrum monospermum latifolium, sili-

quis fungosis glabris articulatis *Morif. Hist.* 2. 267. Myagrū monospermum latifolium *C. B. P.* 109. Myagrū monospermum *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 894. ANN.

Raphanistrum siliculā minore rotundā rugosā asperā *Morif. Hist.* 2. 267. Myagro similis, siliquā rotundā *C. B. P.* 267. Myagro affinis herba, capitulis rotundis *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 895. ANN.

***R**APHANISTRUM siliquosum monospermum maritimum Anglicum, foliis crassis latioribus. Eruca maritima Anglica, siliquā fungosā, torosā, rotundā, foliis crassis latioribus *Morif. Hist.* 2. 231. Cakile sive Eruca marina latifolia *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 868. ANN.

*Idem dispermum maritimum Italicum, siliquā hastæ cuspidi simili. Eruca maritima Italica, siliquā hastæ cuspidi simili *C. B. P.* 99. *Morif. Hist.* 2. 231. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, & Raphanus marinus *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 868. ANN.

Raphanistrum dispermon Monspeliacum, siliculā quadrangulā echinatā. Eruca Monspeliaca, siliquā quadrangulā echinatā *C. B. P.* 99. *Morif. Hist.* 2. 232. Sinapi echinatum *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 858. ANN.

RAPHANUS niger major rotundus *Morif. Hist.* 2. 265. Raphanus niger *C. B. P.* 96. ANN.
Idem

Idem radice longâ pyramidali *Morif. Hist. 2.*
265. ANN.

Raphanus magnus sativus C. B. P. 96. *Morif.*
Hist. 2. 265. ANN.

Raphanus minor oblongus C. B. P. *Morif. Hist.*
2. 69. Raphanus I. B. tom. 2. l. 21. 846. ANN.

RAPHANUS rusticanus C. B. P. 96. *Morif.*
Hist. 2. 237. Raphanus sylvestris, sive Ar-
moracia multis I. B. tom. 2. l. 21. 851.

* Raphanus aquaticus, foliis in profundas laci-
nias divisus C. B. P. 97. *Morif. Hist. 2. 237.* Ra-
phanus aquaticus Tabernæmontani I. B.
tom. 2. l. 21. 867.

* Raphanus aquaticus alter, foliis serratis *Morif.*
Hist. 2. 237. Raphanus aquaticus, Rapistri fo-
lio C. B. P. 97. Radicula sylvestris, sive pa-
lustris I. B. tom. 2. l. 21. 867.

Rapistrum flore luteo C. B. P. v. Sinapi.

Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ C. B. P.
v. Raphanistrum.

Rapistrum maximum monospermum rotundi-
folium Corn. v. Raphanistrum.

Rapistrum Italicum, siliquis longissimis. v.
Erysimum.

Rapistrum flore albo striato I. B. v. Sinapi.

RAPUM sativum rotundum I. B. tom. 2. l.
21. 838. Rapa sativa rotunda C. B. P. 89.
Morif. Hist. 2. 213. ANN.

Idem radice obsoletè nigricante *Var. C. B. P.*
909. ANN.

Rapum sativum oblongum *I. B. tom. 2. l. 21.*
838. ANN.

Rapa sativa oblonga, seu Fœmina *C. B. T. 90.*
Morif. Hist. 2. 213. ANN.

Idem radice ad nigrum inclinante *Cat. Hort.*
Reg. Par. 153. ANN.

Rapum sylvestre, Rapa sylvestris *C. B. P. 90.*

Rapum sylvestre Matthioli *I. B. tom. 2. l.*
21. 841. ANN.

RAPUNCULUS corniculatus spicatus, seu Alopecuroides *Morif. Hist. 2. 463.* Rapunculus spicatus *C. B. P. 92.* Rapunculus spicatus, sive comosus coeruleus *I. B. tom. 2. l.*
20. 809.

Idem spicâ albâ *C. B. P. Var. 92.* Rapunculus spicatus, sive comosus albus *I. B. tom. 2. l.*
20. 809.

* Rapunculus ramosus corniculatus, Scabiosæ capitulo coeruleo *Morif. Hist. 2. 464.* Rapunculus Scabiosæ capitulo *C. B. P. 92.* Scabiosa globularis, quam Ovinam vocant *I. B. tom. 3. l. 25. 12.*

Rapunculus, seu Rapuntium Virginianum seu Americanum, coccineo flore majore *Morif. Hist. 2. 466.* Flos cardinalis Barberini *Column. in not ad Hernand. 880.*

Rapunculus galeatus Virginianus, flore violaceo

laceo majore *Morif. Hist.* 2. 466. Rapuntium Americanum, flore dilutè coeruleo *Dod. mem.* 105.

Rapunculus galeatus Creticus, seu Petromarula Cretica Parkinsonii. *Morif. Hist.* 2. 467. Rapunculus Creticus, seu Pyramidalis altera C. B. P. 93. Rapunculus Creticus, Petromarula I. B. tom. 2. l. 20. 811.

Rapunculus seu Rapuntium Æthiopicum, coeruleo, galeato flore, foliis dentatis *Breyn. Cent.* 175.

Rapunculus hortensis, latiori folio, seu Pyramidalis C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus Persicifolius, magno flore C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus esculentus C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus minor, foliis incisus C. B. P. v. Campanula.

RESEDA maxima C. B. P. 100. ANN.

Reseda vulgaris C. B. P. 100. Reseda lutea I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

Reseda alba I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

* Reseda Tinctorum, Salicis folio, Luteola dicta. Luteola herba Salicis folia C. B. P. 100. Luteola Plinii quibusdam I. B. tom. 3. l. 30. 466. ANN.

Reseda maxima Cretica. Luteola Cretica C. B. P.

C. B. P. 100. Luteola maxima Cretica Honorii Bellii *I. B. tom. 3. l. 30. 466.*

Reseda Phyteuma dicta. Resedæ affinis phyteuma dicta C. B. P. 100. Phyteuma *I. B. tom. 3. l. 29. 386. ANN.*

Rha C. B. P. & *I. B. v. Lapathum.*

Rhabarbarum Officinarum C. B. P. & *Morif. v. Lapathum.*

RHAMNUS spinis oblongis, flore candicante C. B. P. 477. Rhamnus cortice albo Monspeliensium *I. B. tom. 1. l. 6. 31.*

*Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavesciente C. B. P. 477. Rhamnus vel Oleaster Germanicus *I. B. tom. 1. l. 6. 33.*

Rhamnus catharticus C. B. P. 478. *I. B. tom. 1. l. 6. 55.*

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. v. *Paliurus.*

Rheum Diosc. C. B. P. v. *Lapathum.*

Rhodia radix C. B. P. & *I. B. v. Telephium.*

Rhododendron ejusque species *I. B. v. Nerion.*

RHUS folio Ulmi C. B. P. 414. Rhus, sive Sumach *I. B. tom. 1. l. 5. 555.*

Rhus Virginianum C. B. P. 517.

Rhus Virginianum humile.

Rhus Myrtifolia Monspeliaca C. B. P. 414.

Rhus Plinio putata *I. B. tom. 1. l. 5. 559.*

RHUS

* **R**HUS Myrtifolia Belgica C. B. P. 414. Gale,
frutex odoratus Septentrionalium, Elæ-
agnus Cordo, Chamæleagnus Dod. 1. B.
tom. 1. l. 8. 225.

Ribes ejusque species 1. B. v. Grossularia.

RICINUS Africanus maximus caule genicu-
lato rutilante *Cat. Hort. Reg. Par.* 156. ANN.
Idem totus ruber Indicus. ANN.

Ricinus Americanus major, caule virescente
Cat. Hort. Reg. Par. 156. ANN.

Ricinus vulgaris C. B. P. 432. 1. B. tom. 3. l.
34. 642. ANN.

Ricinus vulgaris minor C. B. P. 432. ANN.

Ricinus Americanus, tenuiter diviso folio
Breyn. Cent. 1. 116. ANN.

Ricinus Americanus major, semine nigro
C. B. P. 432. Ricinus Americanus, Curcas
dictus & Faba purgatrix Indiæ occidentæ
1. B. tom. 3. l. 34. 643. ANN.

Rihan 1. B. v. Ocymum.

Robur VII. Clus. 1. B. v. Quercus.

* **R**OSA rubra C. B. P. 481. Simplex C. B. P.
Var. 481. 1. B. tom. 2. l. 14. 34.

Eadem multiplex C. B. P. *Var.* 156. Rosa ru-
bra flore valde pleno 1. B. tom. 2. l. 14. 34.

Rosa rubra pallidior C. B. P. 481.

Eadem saturatius rubens C. B. P. 481.

Rosa purpurea C. B. P. 481. Rosa rubello flore
ma-

maiore multiplicato sive pleno, incarnata
vulgo *I. B. tom. 2. l. 14. 36.*

Eadem flore simplici *Cat. Hort. Reg. Par. 156.*

Rosa omnium Calendarum *Cat. Hort. Reg. Par. 156.* Rosa Italica, flore suaviter rubente, perpetua *Fer. Flor. Cult. 203.*

Rosa versicolor *C. B. P. 481.*

Rosa maxima multiplex *C. B. P. 482.* Rosa Hollandica rubella plena, quibusdam centifolia, spinoso frutice *I. B. tom. 3. l. 14. 37.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 482.*

Rosa multiplex media *C. B. P. 482.*

Rosa alba vulgaris major *C. B. P. 482.* Rosa candida semiplena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Eadem flore multiplici *C. B. P. Var. 482.* Rosa candida plena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Rosa alba minor *C. B. P. 282.* Rosa lacteola *I. B. tom. 2. l. 14. 45.*

Rosa moschata simplici, flore *C. B. P. 482.* Major *C. B. P. Var. 482.* Rosa moschata major *I. B. tom. 2. l. 14. 45.*

Eadem minor *C. B. P. Var. 482.* Rosa moschata minor *I. B. tom. 2. l. 14.*

Eadem flore pleno *C. B. P. 482.* Rosa moschata minor flore pleno *I. B. tom. 2. l. 14. 47.*

Rosa spinis carens, flore majore *C. B. P. 482.*

Rosa acanthos, flore pleno, coloris rubelli *I. B. tom. 2. l. 14. 35.*

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 482.*

Rosa

- Rosa spinis carens, flore minore C. B. P. 482.
- * Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato C. B. P. 483. Rosa sylvestris alba cum rubore glabro I. B. tom. 2. l. 14. 43.
- Rosa sylvestris, flore majore & rubente C. B. P. 483.
- Rosa sylvestris, flore pleno C. B. P. 483. Rosa Eglentina, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 43.
- * Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. P. 483. Rosa foliis odoratis, sive Eglentina dicta I. B. tom. 2. l. 14. 41.
- Rosa sylvestris odorata, albo flore C. B. P. 483.
- Rosa humilis, flore albo Clusii I. B. tom. 2. l. 14. 45.
- Rosa odore Cinamomi simplex C. B. P. 483.
- Rosa Cinamomea, floribus subrubentibus, spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
- Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense majo Majalis dicitur C. B. P. 483. Rosa rubello flore parvo simplici, non spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
- Rosa odore Cinamomi, flore pleno C. B. P. 383.
- Rosa minor rubello multiplicato flore, asperis spinis armata I. B. tom. 2. l. 14. 38.
- Rosa lutea simplex C. B. P. 483. Rosa lutea I. B. tom. 2. l. 14. 47.
- Rosa lutea multiplex C. B. P. 483. Rosa lutea, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 48.
- Rosa campestris spinosissima, flore albo odore C. B. P. 483. Rosa pumila spinosissima, foliis pim.

528 HORTUS ACADEMICUS

Pimpinellæ glabris, flore albo *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 183.* Rosa semper virens *Clusio I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera major *C. B. P. 848.*

Rosa Pomo spinoso, folio hirsuto *I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera minor *C. B. P. 484.*

Rosa sylvestris Pomifera Lobelio, flore rubello sine spinis, pumila *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa punicea *Cornuti 11.*

Rosa Sinensis *Ferrar. v. Althæa.*

ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *C. B. P. 217.* Rosmarinus coronarius fruticosus *I. B. tom. 2. l. 13. 25.*

Rosmarinum striatum sive aureum *Parkinsf. Theatr. 74.*

Rosmarinus hortensis, angustiore folio, argenteus *Cat. Hort. Reg. Par. 158.*

Rosmarinus spontaneus, latiore folio *C. B. P. 217.*

Rosmarinus sylvestris quorundam *I. B. v. Cistus.*

Rosmarinus sylvestris αόρυς *Clus. I. B. v. Cistus.*

***R**os solis, folio rotundo *C. B. P. 357.* Ros solis *I. B. tom. 3. l. 37. 761.*

*Ros solis, folio oblongo *C. B. P. 357.*

Ru-

Rubeola montana odorata C. B. P. v. Rubia;

RUBIA tinctorum sativa C. B. P. 333. Rubia sativa I. B. tom. 2. l. 36. 715.

* Rubia sylvestris lævis C. B. P. 333. Rubia angulosa, aspera & parva Genuensis I. B. tom. 2. l. 36 715.

Rubia quadrifolia asperrima lucida peregrina. Folia ex nigro virore lucent, flores albicant, quos singulos excipiunt baccæ gemellæ nigræ. Cætera non differunt à vulgari.

Rubia quadrifolia, semine duplici hispido I. B. tom. 2. l. 36. 718. Rubia semine duplici hispido, latis & hirsutis foliis Boccon. II.

* Rubia montana odora. Asperula sive Rubeola montana odora C. B. P. 334. Rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris I. B. tom. 3. l. 36. 719.

Rubia procumbens hexaphyllos purpurea. Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. 334. I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Rubia cœrulea erectior elatiorvè I. B. tom. 3. l. 36. 719. Asperula cœrulea arvensis C. B. P. 334.

Rubia Cynanchica C. B. P. 333. I. B. tom. 3. l. 36. 723.

Rubia pratensis lævis, acuto folio C. B. P. 333.

* Rubia cruciata hirsuta dicta C. B. P. 334. Galium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo I. B. tom. 3. l. 36. 717.

Rubia latifolia spicata C. B. B. 334. Rubia spicata I. B. tom. 3. l. 36. 721.

Eadem angustifolia Cat. Hort. Reg. Par. 158.

Rubiæ affinis maritima, Portulacæ foliis. Al. sine littoralis, foliis Portulacæ C. B. P. 251.

* RUBUS vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. P. 479. Rubus major, fructu nigro I. B. tom. 2. l. 14. 57.

Rubus repens, fructu cæsius C. B. P. 479. Rubus minor, fructu cæruleo I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Rubus monococcus.

Baccis est solitariis; Cœtera vulgari similis.

Rubus Idæus spinosus C. B. P. 479. Fructu rubro I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Idem fructu albo I. B. tom. 2. l. 14. 59. C. B. P. 479.

Rubus Idæus lævis C. B. P. 479. Rubus Idæus, non spinosus I. B. tom. 2. l. 14. 60.

Rubus odoratus Cornuti 149.

RUSCUS C. B. P. 470. I. B. tom. 1. l. 5. 579.

RUTA hortensis major latifolia Moris. Hist. 2. 507. C. B. P. 336. Ruta sativa, vel hortensis I. B. tom. 3. l. 26. 197.

Ruta hortensis minor tenuifolia Moris. Hist. 1. 507.

507. *Ruta hortensis altera* C. B. P. 336.
Ruta sylvestris major C. B. P. 336. *Morif. Hist. 2.*
507. I. B. tom. 2. l. 26. 199.
Ruta sylvestris minor C. B. P. 336. *Morif. Hist. 2.*
508. I. B. tom. 3. l. 26. 200.
Ruta Chalepensis latifolia, florum petalis villis
 scatentibus.
Eadem angustifolia *Morif. Hist. 2. 508.*
Ruta sylvestris, flore magno albo C. B. P. 336;
Morif. Hist. 2. 508. *Ruta*, quæ dici solet *Har-*
mala I. B. tom. 2. l. 26. 200.
Ruta Hypericoides I. B. v. *Hypericum*,
Ruta muraria C. B. P. v. *Adiantum*,
Ruta canina I. B. C. B. P. & *Morif. v. Scro-*
phularia.

S.



abdariffa I. B. v. *Althæa*.

- S**ABINA folio Tamarisci Diosc. C. B. P. 487.
Sabina sterilis I. B. tom. 1. l. 9. 288.
Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. *Sabina bac-*
cifera I. B. tom. 1. l. 9. 288.
Sacharifera arundo v. *Arundo*.

- * **S**AGITTA aquatica major C. B. P. 194. *Sagit-*
ta major I. B. tom. 3. l. 38. 790.
 * *Sagitta aquatica minor latifolia* C. B. P. 194.
 L 1 2 *Sagit.*

Sagitta *I. B. tom. 3. l. 38. 789.*

* Sagitta aquatica minor angustifolia *C. B. P. 194.*

Sagitta minor angustifolia *I. B. tom. 3. l. 38. 789.*

Sagittaria cordialis Markgr. v. Crotalaria,

Salicornia I. B. v. Kali.

* **S**ALIX vulgaris alba arborescens *C. B. P. 473.*

Salix maxima fragilis, alba hirsuta *I. B. tom.*

1. l. 8. 213.

* Salix vulgaris rubens *C. B. P. 473.*

* Salix fativa lutea, folio crenato *C. B. P. 473.*

Salix lutea tenuior, fativa viminea *I. B. tom.*

1. l. 8. 215.

Salix fragilis *C. B. P. 474.* Salix spontanea fragilis, Amygdalino folio, auriculata & non auriculata *I. B. tom. 1. l. 8. 214.*

* Salix Perficæ folio non auriculato *Comelin. Catalog. 99.*

* Salix angustis & longissimis foliis crispis subtus albicantibus *I. B. tom. 1. l. 8. 212.*

* Salix tenuior, folio minore utrinquè glabro, fragilis. *I. B. tom. 1. l. 8. 213.*

* Salix latifolia rotunda *C. B. P. 474.* Salix latifolia infernè hirsuta *I. B. tom. 1. l. 8. 215.*

* Salix folio ex rotunditate acuminato *C. B. P. 474.*

Salix montana major, foliis Laurinis *Cat. Hort. Reg. Par. 160.* Salix folio laureo, sive lato glabro odorato *I. Raj. Catal. 261.*

* Salix

- * *Salix latifolia repens* C. B. P. 774. *Salix pumila latifolia* I. B. tom. 1. l. 8. 216.
- * *Salix pumila* foliis utrinquè candicantibus & lanuginosis C. B. P. 474.
- * *Salix pumila*, brevi angustoque folio incano C. B. P. 474.
- Salix humilis*, corticem abjiciens *Raj. Catal.* 261.

SALVIA maxima foliis & floribus amplissimis. *Salvia major peregrina*, amplissimis floribus *Breyn. Prodr.* 46.

Salvia major, an *Sphacelus Theophrasti* C. B. P. 237. *Salvia latifolia* I. B. tom. 3. l. 28. 305. Flore purpureo C. B. P. *Var.* 237.

Eadem floribus albidis C. B. P. *Var.* 237.

Eadem foliis ex purpureo & albo variis *Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Eadem foliis ex luteo & viridi variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 160.

Eadem perelegans tricolor argentea *Belgarum Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Salvia minor aurita & non aurita C. B. P. 237.

Salvia minor auriculata I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia minor altera, odore & sapore *Absinthii*, C. B. P. 237.

Salvia latifolia serrata C. B. P. 237. *Salvia serrata crispa* I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia baccifera C. B. P. 237. *Salvia gallifera*

Cretica *I. B. tom. 3. l. 28. 306.*

Salvia folio tenuiore *C. B. P. 237. Salvia tenui-*

folia *I. B. tom. 3. l. 28. 306.*

Salvia sylvestris C. B. P. v. Scordium.

SAMBUCUS fructu in umbellâ nigro *C. B. P. 456. Sambucus vulgaris I. B. tom. 1. l.*

5. 545.

Sambucus fructu in umbellâ viridi *C. B. P. 456.*

Sambucus racemosa rubra *C. B. P. 456. Sam-*

bucus racemosa, acinis rubris *I. B. tom. 1.*

l. 551.

Sambucus laciniato folio *C. B. P. 456. Sambu-*

cus laciniata *I. B. tom. 1. l. 5. 549.*

Sambucus humilis, sive Ebulus folio laciniato

C. B. P. 456. Ebulus sive Sambucus herba-

cea *I. B. tom. 1. l. 5. 549.*

Sambucus aquatica, flore simplici *C. B. P. 456.*

Sambucus aquatica *I. B. tom. 1. l. 5. 552.*

Sambucus aquatica, flore globoso pleno *C. B. P.*

456. Sambucus Rosea I. B. tom. 1. l. 5. 553.

Sampsuchus C. B. P. v. Clinopodium.

Sanguis Draconis Herba I. B. v. Lapathum.

Sanguisorba ejusquè species C. B. P. & I. B.

v. Pimpinella.

SANICULA montana rotundifolia major

C. B. P. 243. Sanicula Alpina guttata I. B.

tom. 3. l. 35. 707.

Sanicula montana crenata, umbilico rubro

Cat.

Cat. Hort. Reg. Paris. 161.

Eadem umbilico pallido *Cat. Hort. Reg. Par. 161. Moris. Hort. Bles. 303.*

Sanicula Alpina Rosea, oblongo rotundo crenato folio, umbilico rubente.

Eadem minima, umbilico pallido.

Sanicula radice granulosâ, flore albo. *Saxifraga rotundifolia alba* C. B. P. 309. *Saxifraga alba*, radice granulosâ I. B. tom. 3. l. 35. 707.

Eadem ad folia bulbos gerens. *Saxifraga ad folia bulbos gerens* C. B. P. 309.

Sanicula Aizoides, foliis ferratis multiflora. *Sedum ferratum*, flore albo, multiflorum. *Dodart. Mem. 113.*

Sanicula Aizoides, foliis longissimis ferratis candicantibus.

Sanicula Aizoides, foliis oblongis ferratis. *Cotyledon media*, foliis oblongis ferratis C. B. P. 285. *Sedum ferratum*. I. B. tom. 3. l. 35. 689.

Sanicula Aizoides, foliis subrotundis ferratis. *Cotyledon media*, foliis subrotundis C. B. P. 285. *Cotyledon altera olim Matthiolo*. I. B. tom. 3. l. 35. 685.

Sanicula Aizoides, subhirsuta, floribus punctatis. *Cotyledon media subhirsuta*, floribus punctatis. C. B. P. 285. Sedi species, sive *Cotyledon altera Etscheriana*, lanugine albâ, hirsutis foliis I. B. tom. 3. l. 35. 690.

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio. *Sedum* *Alpinum*, trifido folio C. B. P. 284. *Sed*is affinis *trifulca Alpina*, flore albo I. B. *tem.* 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio major alba. *Sedum* *tridactylites Alpinum* majus album C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina pallidè lutea. *Sedum* *tridactylites Alpinum* pallidè luteum C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina, angustissimo folio, *Saxifragiæ* albæ flore luteo. *Sedum* *Alpinum* *Saxifragiæ* albæ flore, vel grandiflorum C. B. P. 284. *Sedum* *minimum Syriacum*, luteolo flore, *Saxifragiæ* albæ I. B. *tem.* 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides, acuto angusto folio, *Ericæ* facie, flore albo.

Sanicula Officinarum C. B. P. v. *Diapensia*.

Sanicula Alpina ejusque species C. B. P. v. *Auricula urfi*.

Sanicula montana latifolia laciniata C. B. P. v. *Primula veris*.

Sanicula Alpina, foliis *Borraginis villosa*. C. B. P. v. *Verbascum*.

Santolina vulgò. v. *Abrotanum*.

SAPONARIA arbor Indica trifolia *Mus. Zeyl.*

Saponaria ejusque species C. B. P. v. *Lychnis*.

SAS-

SASSAFRAS *Hernand.* 61. Anhuiba *Pison*,
146. Sassafras sive Lignum Pavanum *I. B.*
tom. 1. *l.* 4. 483. Arbor ex Floridâ, Ficul-
neo folio *C. B. P.* 431.

SATUREJA hortensis, seu Cunila fativa *Pli-*
nii C. B. P. 218. Satureja fativa. *I. B. tom.* 3.
l. 28. 272.

Satureja montana *C. B. P.* 218. Satureja durior
I. B. tom. 3. *l.* 28. 272.

Satureja spicata *C. B. P.* 218. Satureja foliis te-
nuibus, sive tenuifolia seu Juliani quorun-
dam. *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 273.

Satureja floribus in summitate dispositis.

Hanc superiori Autumno ad nos tramisit
Dns Watfius.

Satyrium vulgò. v. *Orchis*.

SAXIFRAGIA major, umbellâ candidâ. *Pim-*
pinella Saxifragâ major, umbellâ candi-
dâ C. B. P. 159. *Pimpinella Saxifraga major*
Morif. Umbell. 12. *Saxifraga hircina major*
I. B. tom. 3. *l.* 27. 109.

Eadem umbellâ rubente. *Pimpinella Saxifraga*
major, umbellâ rubente C. B. P. 159.

Saxifraga minor, foliis Sanguisorbæ. Pimpi-
nella Saxifraga major altera C. B. P. 159.
Pimpinella Saxifraga minor Morif. Umbell.
12. *Saxifraga hircina minor, foliis Sangui-*
sorbæ I. B. tom. 3. *l.* 27.

Saxifragia minor crispa, umbellâ candidâ.

Pimpinella Saxifraga minor C. B. P. 160.

Morif. Umbell. 12. Saxifragia hircina minima, Pimpinella crispa Tragi I. B. tom. 3. l.

27. 113.

Saxifragia rotundifolia alba C. B. P. v. Sannicula.

Saxifragia ad folia bulbos gerens C. B. P. v. Sannicula.

Saxifraga rotundifolia aurea C. B. P. v. Alchimilla.

* **S**CABIOSA pratensis hirsuta, quæ Officinarum *C. B. P. 269.* Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato *I. B. tom. 3. l. 25. 2.*

* Eadem folio non laciniato *I. B. tom. 3. l. 25. 2.*

Scabiosa integrifolia glabra, radice præmorsa. Succisa glabra *C. B. P. 269.* Succisa sive Morsus Diaboli *I. B. tom. 3. l. 25. 11.* Flore cœruleo.

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 269.*

Scabiosa fruticans angustifolia alba *C. B. P. 270.*

Scabiosa montana calidarum regionum major Lobelii *I. B. tom. 3. l. 25. 8.*

Scabiosa prolifera, folio latiore *C. B. P. 270.*

Scabiosa prolifera *I. B. tom. 3. l. 25. 5.*

Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris *C. B. P. 270.* Scabiosa Centauroides *Alpin. Exot. 205.*

Sca-

LUGDUNO - BATAVUS.

Scabiosa altissima annua, foliis Agrimoniae nonnihil similibus. ANN.

Supra viri altitudinem assurgit hæc Scabiosa, caulibus rotundis cavis geniculatis pilosis ramosis, quibus ad singula genicula hærent folia bina ex adverso, pinnata crenata, instar foliorum Agrimoniae, nonnihil hirsuta. Summis ramis insident capitula ex multis flosculis pentapetaloidibus pallidis composita, singulis subjiciuntur semina oblonga parva, in summo umbilicata, seu stellata, ritu congenerum. Radix subest alba lignosa fibrosa annua. Hujus semina ad Clarissimum Antecessorem meum D^Nm Arnoldum Syenium transmisit quondam Jacobus Breynius Botanicorum hujus seculi facile Princeps.

Scabiosa Carduifolio, sphærocephala elatior, Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris C. B. P. 381. Echinopus major I. B. tom. 3. l. 26, 69.

Scabiosa Carduifolio sphærocephala humilior. Carduus sphærocephalus cœruleus minor C. B. P. 381. Echinopus minor I. B. tom. 3. l. 25, 72.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, purpurante ex nigro flore I. B. tom. 3. l. 25, 9.

Eadem secunda C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, rubro flore I. B. tom. 3. l. 25, 9.

Scab-

328 HORTUS ACADEMICUS

Scabiosa glabra, foliis rigidis virentibus *I. B. tom. 3. l. 25. 8.* An Scabiosa latifolia glabra alba *C. B. Phyt. 526?*

Scabiosa argentea angustifolia *C. B. P. 270.*
Scabiosa Graminea argentea *I. B. tom. 3. l. 25. 12.*

Scabiosa maritima parva *I. B. tom. 3. l. 25. 7.*

Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo *C. B. P. 270.* Scabiosa rubra peregrina, quibusdam Indica *I. B. tom. 3. l. 25. 6. ANN.*

Eadem flore carneo, atro-purpureo, variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 163. ANN.*

Eadem Indica prolifera *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*

Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore albo Promontorii Bonæ Spei *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*

Scabiosa stellata, folio laciniato major *C. B. P. 271.* Scabiosa major cum pulchro semine *I. B. tom. 3. l. 25. 9. ANN.*

Scabiosa stellata, folio non dissecto *C. B. P. 271.*
Scabiosa fruticosa, folio non dissecto *I. B. tom. 3. l. 25. 11.*

* Scabiosa montana, globoso flore, Gramineis foliis latioribus. Caryophyllus montanus major, flore globoso *C. B. P. 211.* Caryophylleus flos aphyllorcaulos vel Junceus major *I. B. tom. 3. l. 29. 336.*

* Eadem Gramineis foliis angustioribus. Caryophyllus montanus minor *C. B. P. 211.*
Ca-

LUGDUNO-BATAVUS. 542
SCABIOSA ALTISSIMA ANNUA, FOLIIS AGRIMO-
NIAE NONNIHIL SIMILIBUS.



* *Caryophylleus flos aphyllorcaulos vel Junceus minor* I. B. tom. 3. l. 29. 336. Floribus rubris.

Eadem floribus albis.

Eadem minima, floribus rubris, foliis angustissimis *Caryophyllus montanus minimus*, flore globofo *Cat. Hort. Reg. Par.* 42.

Scabiosa globularis, quam *ovinam* vocant I. B. v. *Rapunculus*.

Scammonia Syriaca C. B. P. & I. B. *Convolutus*.

Scammonia Monspeliaca, foliis rotundioribus C. B. P. v. *Apocynum*.

Scammonia Monspeliensi affinis, foliis acutioribus C. B. P. v. *Apocynum*.

Scammonea Monspeliaca, flore parvo I. B. v. *Apocynum*.

SCANDIX semine rostrato vulgaris C. B. P. 152. *Sandix Moris. Umb.* 48. *Pecten veneris*, folio tenuiori, paucioribus rostris I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

Scandix Cretica major C. B. P. 152. *Pecten veneris Creticum* I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

SCILLA vulgaris, radice rubra C. B. P. 73. *Moris. Hist.* 2. 395. *Scilla ruffa magna vulgaris* I. B. tom. 2. l. 19. 615.

Eadem radice alba C. B. P. 71. *Moris. Hist.* 2. 395.

395. Scilla magna alba I. B. tom. 2. l. 19.
619.

Scilla Africana, flore viridi parvo, bulbo amplissimo.

Scirpus ejusquè species C. B. P. v. Iuncus.

Sclarea C. B. P. v. Horminum.

Scolymus Chrysanthemus C. B. P. v. Eryngium.

Scolymus Chrysanthemus annuus Dodart.

Mem. v. Carduus.

Scolymus maximus non spinosus I. B. v. Cinara.

Scolymus sativus spinosus & non spinus I. B. v. Cinara.

Scoparia C. B. P. v. Genista.

* **S**CORDIUM C. B. P. 247. I. B. tom. 3. l. 28. 292.

* Scordium folio Salviæ, five Scorodotis I. B. tom. 3. l. 28. 292. Scordium alterum, five Salvia sylvestris C. B. P. 247.

Scorodoprasum I. B. v. Allium.

SCORPIOIDES Bupleuri folio, corniculis asperis, hirsutis, minùs contortis *Morif. Hist.*

2. 172. Scorpioides Bupleuri folio C. B. P.

287. Scorpioides siliquâ campoide hispida

I. B. tom. 2. l. 21 899. ANN.

Eadem corniculis asperis, magis in se contortis & convolutis *Morif. Hist.* 2. 127. ANN.

Eadem corniculis crassioribus & magis spinosis, litui instar contortis & in se con-

volutis *Morif. Hist. 2. 127. ANN.*

Scorpioides Portulacæ folio, corniculis longioribus tenuioribus ac articulatis *Morif. Hist. 2. 127. Scorpioides Portulacæ folio C. B. P. 287. Telephium Dioscordis, seu Scorpioides C. B. P. 217. Telephium Scorpioides I. B. tom. 2. l. 21. 889. ANN.*

SCORZONERA latifolia sinuata *C. B. P. 275. Tragopogon Hispanicum, five Escorzonera, aut Scorzonera I. B. tom. 2. l. 24. 1060.*

Scorzonera foliis nervosis *C. B. P. 275.*

Scorzonera folio laciniato. Tragopogon laciniatum luteum *C. B. P. 278. Tragopogon folio lacinato Monspeliense, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1059. ANN.*

SCROPHULARIA annua, folio Urticæ *Morif. Hist. 2. 481. C. B. P. 236. Scrophularia flore rubro Camerarii I. B. tom. 3. l. 30. 422. ANN.*

Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Morif. Hist. 2. 482. Scrophularia flore luteo C. B. P. 236. Scrophularia lutea magna, amplis foliis I. B. ANN. I. B. tom. 3. l. 30 422.*

Scrophularia radice nodosâ fœtidâ *C. B. P. 235. Morif. Hist. 2. 482. Scrophularia vulgaris & major I. B. tom. 3. l. 421.*

Scrophularia radice fibrosâ *Morif. Hist. 2. 482.*
Scro-

Scrophularia aquatica major C. B. P. 235.

Scrophularia maxima, radice fibrosâ L. B.

tom. 3. l. 30. 421.

Scrophularia scorodoniæ foliis Moris. Hist.

2. 482.

Scrophularia peregrina frutescens, foliis Teucri crassiusculis Breyn. Prodr. 46.

Hęc ob elegantiam & perpetuò virentem comam cœteras omnes *Scrophulariæ* species antecellit, ideoque inter amœniores plantas à Floræ cultoribus reponi meretur. Erigit namquē ex radice pallidâ, in contortas fibrillas abeunte, caules rectos firmos, frutescentes, altitudinis sesquicubitalis, quadrangulos virides striatos geniculatos, frequentes in ramos divisos, quos ad singula genicula cingunt folia crassiuscula subrotunda crenata, unguem vix excedentia, vulgaris Teucrii facie, parte inferiori binâ adversa, superiori verò solitaria. Flosculi insident exiguis quinquifidis caliculis *Scrophulariæ*, *Ruta canina* dictæ, simillimi, monopetali subrotundi, in quinque lacinias quasi totidem petala dissecti, petalo superiori purpurascente bifido galeæ instar, binis lateralibus auriculatis pallidis, imò labiato exiguo purpurascentē, profluentibus è medio rictu staminibus candidis, apiculis purpurascentibus donatis. Flores excipit vasculum subrotundum acuminatum.

M m

tum

tum bicapsulare, in duas carinulas dehiscens, continens semina exigua fusca. Propagatur felicius ramulis quam seminibus.

Scrophularia major, *Ruta canina* vulgò dicta *Morif. Hist.* 2. 483. *Scrophularia*, *Ruta canina* dicta, vulgaris *C. B. P.* 236. *Scrophularia* tertia *Dodonæo tenuifolia*, *Ruta canina* quibusdam vocata *I. B. tom.* 3. l. 30. 423.

Scrophularia minor *L. B. v.* *Chelidonia*.

* *SCUTELLARIA* aquatica, vulgo *Tertianaria* dicta. *Lyfimachia* cœrulea galericulata, vel *Gratiola* cœrulea *C. B. P.* *Tertianaria*, aliis *Lyfimachia* galericulata *I. B. tom.* 3. l. 30. 435.

Scutellaria aquatica major Americana.

Novo Plantarum generi Scutellato annumeratur & hæc Americana Planta, *Scutellariæ* aquaticæ vulgari, *Tertianaria* dictæ, facie & sapore haud absimilis, cui radices sunt fibrosæ albæ repentes, cauliculi cubitum alti quadrati geniculati, emittentes ad singula genicula folia gemina adversa, semidigitum longa, *Tertianariâ* vulgari ampliora, per ambitum profundius crenata & longioribus petiolis fulcita? ex iisdem geniculis emicant flores bini tubulosi galericulati violacei velut, in *Tertianariâ* vulgari, cui quoque respondent capsulæ seminales

in

LUGDUNO-BATAVUS. 947
SCROPHULARIA PEREGRINA FRUTESCENS, FO-
LIIS TEUCRII CRASSIUSCULIS BREYNII.



inferius talum, qui mulierum calceis sub-
pingitur, superius galeam cassidam seu scu-
tellam adumbrantes, in quarum alveolo
continentur semina parva rotunda fusca.
Hanc cum multis aliis rarioribus concessit
nobis Botanicorum Dux & Oculus Rober-
tus Morisonius.

Scutellaria peregrina, folio Lamii. Lamium
peregrinum, sive Scutellaria C. B. P. 231.
Cassida *Fab.¹ Column. Ecphr. part. 1. 187.*
Lamium Astragaloides *Corn. 129.*

SEBESTENA domestica C. B. P. 446. Myxa
domestica, sive Sebesten *I. B. tom. 1. l. 2. 197.*

SECALE hybernum vel majus C. B. P. 23. Se-
cale *I. B. tom. 2. l. 18. 416.*

Secale vernum vel minus C. B. P. 23.

Secacul *I. B. v. Crithmum.*

SECURIDACA vera plurimis flosculis luteis
corymbi modo dispositis, filiquis latis com-
pressis inter granum & granum junctis, se-
minibus quadratis *Morif. Hist. 2. 80.* Se-
curidaca lutea major C. B. P. 348. Securida-
ca flore luteo, filiquâ latâ oblongâ *I. B. tom.*
2. l. 17. 346.

SECURIDACA Indica angustissimis & longif-
simis filiquis. Galega Ægyptiaca, filiquis
arti-

articulatis C. B. P. 452. Sesban Ægyptiacum seu Securidaca Ægyptiaca articulata Park.

Morif. Hist. 2. 79. Sesban foliis Hedyfari I. B. tom. 1. l. 11. 386.

Securidaca Ægyptia Park. Morif. v. Senna.

Securidaca filiquis planis utrinque dentatis C. B. P. v. Altragalus.

Securidaca dumetorum major, flore vario, filiquis articulatis C. B. P. v. Colutea.

SEDUM Africanum frutescens incanum, foliis orbiculatis. Sedum arborescens Promontorii Bonæ Spei Stapel. 335. Breyn. Prodr. 47. Item Sedum majus Arborescens Africanum alterum, foliis rotundioribus, glaucis, limbo purpureo cinctis Breyn. Prodr. 47.

Locis maritimis aridis glareosis ad Promontorium Bonæ Spei fruticis altitudine assurgit: radice succosâ longâ brachiata robustâ rufescente nonnunquam albidâ, frequentes fibras emittente: caudice pollicem crasso ramoso in viridi canescente, qui parte infernâ cingitur foliis, densissimo stipatu absque petiolis congestis, orbiculatis, crassis, succulentis, aliquando volæ manus amplitudine, glaucis, ambitu nunc rubente, nunc pallescente, parte verò superiori conspicitur nudus, in tenue geniculum protuberans, quo mediante divaricatur in aliquot

ramulos digitales & palmares , quibus ex calice quinquefoliato dependent flores oblongi pentanguli, quinque rubentibus seu incarnatis petalis, oris fursùm reflexis , cum totidem è medio sese exerentibus staminibus apiculatis flavescentibus , constructi. His evanidis succedunt more congenerum quinque siliculæ corniculatæ , oblongæ , pressius invicem junctæ, includentes semina exigua ruffa. Tota Planta aquoso viscidoque gaudet succo, consimilique virtute , quâ cœteræ Sedi species. De facili vero propagatur ramulis abscissis & aridiori solo impactis.

Sedum Africanum umbellatum album.

Exilem fibrosam albam habet radicem: caules complures, ramosos succosos sphithamo altiores: Folia viridia angusta mucronata, caulem ab imo ad summum usque cruciato positu, velut in *Gentiana*, ambientia: Flores albos pentapetalos quasi in muscario seu umbellâ dispositos: Semina exigua in siliculis quinque invicem junctis.

Sedum Africanum annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo. ANN.

Altitudinem palmæ vix attingit hæc Planta, figens radiculam tenuem fibrosam albam, ex quâ assurgit cauliculus simplex, rotundus, pallidè virescens, ad summitates

ramo-

LUGDUNO-BATAVUS. 551
SEDUM AFRICANUM FRUTESCENS INCANUM
ORBICULATIS FOLIIS.



552 HORTUS ACADEMICUS
SEDUM AFRICANUM UMBELLATUM ALBUM.



LUGDUNO-BATAVUS. 553
**SEDUM AFRICANUM ANNUUM, CENTAURII MI-
NORIS FACIE, FLORE AUREO.**



ramosus, cui per intervalla adstant folia crassiuscula succulenta, bina ex adverso, Centaurio minori non nihil similia: Ramorum summitates sustinent perianthium quinquefolium, quod dehiscens excludit florem pentapetalum, stellæ instar expansum, foris purpurascentem, intus aureum staminulis in medio apiculatis flavescentibus, singulisque petalis ad fundum maculâ cordiformi sanguineâ inscriptis.

Sedum majus arborescens *I. B. tom. 3. l. 35. 686.*
flosculis ex flavo pallescentibus. An *Sedum majus arborescens*, flosculis candidis *C. B. P. 282?*

**Sedum vulgare maximum.*

Sedum majus vulgare *C. B. P. 283. I. B. tom. 3. l. 35. 687.* *Sempervivum* seu *Aizoon vulgò.*

Sedum vulgari magno simile *I. B. tom. 3. l. 35. 688.*

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *C. B. P. 283.* *Sedum montanum latifolium*, flore purpureo *I. B. tom. 3. l. 35. 688.*

Sedum montanum tomentosum *C. B. P. 284.*
Sempervivum rubrum montanum *ναφα-
λωδες* *Fab. Column. Ecph. p. 1. 292.*

Sedum echinatum vel stellatum, flore albo
I. B. tom. 3. 35. 680.

Se-

Sedum Alpinum roseum luteum, cauliculis
rubentibus *Cat. Hort. Reg. Par.* 165.

Sedum minus teretifolium album C. B. P. 283.

Sedum minus, folio longiusculo tereti, flore
candido *I. B. tom.* 3. l. 35. 690.

* *Sedum minus teretifolium alterum* C. B. P. 283.
I. B. tom. 3. l. 35. 691.

Sedum minus, folio circinnato C. B. P. 283.

Sedum parvum, folio circinnato, flore albo
I. B. tom. 3. l. 35. 691.

Sedum minus luteum, folio acuto C. B. P. 283.

Sedum minus, flore luteo *I. B. tom.* 3. l. 35.
692.

Sedum minus à rupe S. Vincentii Razi Ca-
talog. 270.

Sedum minus vermiculatum acre C. B. P. 283.

Sedum parvum acre, flore luteo *I. B. tom.* 3.
l. 35. 694. 270.

Sedum minus vermiculatum insipidum C. B.

P. 284. *Sedum minimum luteum non acre*
I. B. tom. 3. l. 35. 695.

Sedum Alpinum luteum minus Razi Cat. 269.

Sedum Alpinum Ericoides cœruleum C. B. P.

284. *I. B. tom.* 3. l. 35. 694.

Sedum minus, lato & crasso caule, *Portlandi-*
cum Belgarum Cat. Hort. Reg. Par. 166.

Sedum Cepæa dictum. Cepæa C. B. P. 288.

I. B. tom. 3. l. 35. 679.

Sedum serratum, flore albo multiflorum *Dodart.*
v. *Sanicula*.

Sedum serratum *L. B.* v. *Sanicula*.

Sedum minus fruticosum *C. B. P.* v. *Kali*.

Sedum Alpinum, trifido folio ejusque species.
v. *Sanicula*.

Sedum tridactylites tectorum *C. B. P.* v. *Alfinc*.

Seleri Moris. v. *Apium*.

Sempervivum ejusque species. v. *Sedum*.

SENECIO incanus pinguis *C. B. P.* 131. *Senecio* hirsutus viscidus, major odoratus *L. B.*
tom. 2. l. 24. 1042. ANN.

**Senecio Jacobææ folio Moris. Hort. Bles.*
309. *ANN.*

**Senecio minor vulgaris C. B. P.* 131. *Senecio*
vulgaris, sive *Erigeron L. B. tom. 2. l. 24.*
1041. *ANN.*

Senecio, Africanus perennis. v. *Conyza* in
App.

SENNA Italica, sive foliis obtusis *C. B. P.* 397.
Sena Florentina, foliis per extremum pene
cordatis *L. B. tom. 1. l. 11. 377. descr. ANN.*

Senna Occidentalis, odore *Opii viroso*, *Oro-*
bi Pannonici foliis mucronatis, glabra. Pa-
jomirioba & Herva do Bidscho Lusitanis
Pison. 185.

Eadem hirsuta.

Senna Occidentalis, odore *Opii*, minus viro-
so,

fo, foliis glabris obtusis. Pajomirioba 11.
Pison. 184. ANN.

Senna Orientalis fruticosa, Sophera dicta:
 Galegæ affinis Sophera dicta *C. B. P.* 352.
 Securidaca Ægyptia *Park. Moris. Hist.* 2. 78.
 Sophera Indiæ Orientalis *Breyn. Prod.* 51.
 Ponnam Tangera *Hort. Mal. tom.* 2. 101.
 Ecapatli altera *Hernand.* 376.

Senna Orientalis hexaphylla. Tala Zeylonen-
 sibus ANN.

Octo plantas ex utroque Indiâ delatas
 aluit hæctenus noster hortus, quas tum ob
 stamina falcata, quæ ex flore exeruntur, tum
 etiam ob semina in siliquis bivalvibus uni-
 capsularibus quasi per articulos junctis Sen-
 næ subjungi, similique nomine nominari de-
 bere autumavi. Quam verò hexaphyllam
 vocavi, radicem fert albam tenuem fibro-
 sam annuam: cauliculos dodrantaes herba-
 ceos, primùm erectos, postmodum reclina-
 tos: Folia in qualibet costâ sex, bina sibi
 opposita, subrotunda unguem lata, pingua,
 saporis subacris ingrati, cocta verò oleracei
 haud ingrati: Flores congeneribus simi-
 les, ast minores, aureos pentapetolos sta-
 minibus in medio concoloribus & stylo fal-
 cato longiori: Siliquas compressas angustas
 recurvas unicapculares bivalves quasi arti-
 culatas seu isthmis interceptras, in quibus
 semina oblonga teretia lucida fusca.

Sen-

Senna Orientalis tetraphylla , Absus dicta.
 Loto affinis *Ægyptia C. B. P. 332.* Absus fo-
 liis Trifolii , foliis Orobi glabris *l. B. tom.*
2. l. 17. 361. ANN.

Senna Occidentalis , siliquâ multiplici , foliis
 Herbæ mimosæ. Chamæcrista Pavonis A-
 mericana , siliquâ multiplici *Breyn, Cent. 1.*
66. ANN.

Eadem siliquâ singulari. Chamæcrista Pavo-
 nis Brasiliiana , siliquâ singulari *Breyn. Cent.*
1. 64. ANN.

Seriphium l. B. v. Absinthium.

Seriphium Germanicum l. B. v. Nasturtium.

Serpentaria triphylla Brasiliiana Dodart. v.
Arum.

SERPILLUM vulgare majus *C. B. P.*
220.

*Serpillum vulgare minus *C. B. P. 220.* Serpil-
 lum vulgare *l. B. tom. 3. l. 28. 269.* Flore
 purpureo,

Serpillum minus flore albo *C. B. P. Var. 220.*

Idem folio ex albo & viridi vario.

Serpillum angustifolium hirsutum *C. B. P. 220.*

Serpillum angusto lanuginosoque folio *l. B.*
tom. 2. l. 28. 270.

Serpillum foliis Citri odore *C. B. P. 220.* Ser-
 pillum Citri odore *l. B. tom. 2. l. 28. 270.*

Serpillum folio Thymi *C. B. P. 202.* Serpillum
 sylvestre, Zygis Clusio, Thymo vulgari rigi-
 diori

diori simile *I. B. tom. 2 l. 28. 271.*

SERRATULA *C. B. P. 235. I. B. tom. 3. l. 25.*
23. Flore purpureo.

Eadem flore candido *C. B. P. Var. 235.*

Sesamoides parvum Matth. v. Cichorium.

SESAMUM *C. B. P. 27. I. B. tom. 2. l. 21. 896.*
Semine fusco.

Idem semine albo.

*Sesamum perenne Indicum Zanoni. v. Gramen
dactylon.*

*Sesban Ægyptiacum Alpini Park. Moris.
v. Galega.*

SESELI *Æthiopicum Salicis folio C. B. P.*
161. *Seseli frutex Æthiopicum Moris.*
Umbell. 17. Seseli Æthiopicum fruticosum,
folio Periclymeni I. B. tom. 3. l. 27. 197.

Seseli pratense, Silaus fortè l'linii C. B. P. 162.

Seseli pratense Moris. Umb. 17. Silaum qui-
busdam, flore luteolo I. B. tom. 3. l. 27. 170.

Seseli montanum, Cicutæ folio glabrum C. B.

P. 161. Seseli herba montanum Pannoni-
cum I. Clus. Moris. Umbell. 17. Seseli Alpi-

num, sive montanum primum Clusio, fo-
lio splendente, flosculis albis I. B. tom. 3.

l. 27. 168.

Seseli pratense lactescens C. B. P. v. Thys-
selinum.

Seseli palustre lactescens acre, foliis Ferulaceis
flore

- flore albo, semine lato* I. B. v. Tysselinum.
Seseli Ethiopicum Matthiolo I. B. v. Lafer-
 pitium.
Seseli Officinarum C. B. P. v. Siler.
Seseli Creticum majus C. B. P. v. Tordylium.
Seseli Peloponense Matthioli, sive Cicutaria
quorundam I. B. v. Cicuta.
Siciliana I. B. v. Hypericum.

SIDERITIS arvensis aculeata, foliis Cannabinis, floribus purpureis. Urtica aculeata, foliis serratis C. B. P. 232. Cannabis sylvestris quorundam, Urticæ inertis affinis I. B. tom. 3. app. 855.

Eadem floribus candidis C. B. P. Var. 232.

Sideritis arvensis angustifolia rubra C. B. P. 233.
 Ladanum Segetum, flore rubro quorundam I. B. tom. 3. app. 855.

Sideritis Scordioides tomentosa alba. An Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis C. B. P. 213. Et Sideritis Montepessulana I. B. tom. 3. l. 30. 426? ANN.

Caulis huic est dodrante longior quadrangulus tomentosus incanus, quem ambiunt conjugatâ serie folia parva incana mollia graveolentia, rugis & marginalibus crenis ad Scordii folia quadantenus accedentia, hinc Scorodotis appellata. Ad horum sinus exeunt flosculi galeati & labiati, pusilli pallidi, caulem per intervalla verticillatim



latim cingentes, quibus succedunt utriculi quinquefariam denticulati, nullis aut perquam exiguis pedicellis fulciti, claudentes femina quaterna rotunda fusca. Renovatur singulis annis ex seminibus deciduis. An hæc planta sit eadem vel diversa à Sideritide Monspeßulana I. B. judicet lector ex nostra descriptione quam una cum accuratâ iconè ad vivum expressâ hic proponere non abs re fore existimavi.

* Sideritis hirsuta procumbens C. B. P. 233.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta C. B. P. 233.

• Sideritis vulgaris hirsuta I. B. tom. 3. l. 30. 425.

Sideritis Alpina, Hyssopifolia C. B. P. 233. Sideritis Valerandi Dourez, brevi spicâ I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis arvensis latifolia glabra C. B. P. 233.

Sideritis glabra arvensis I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis foliis oblongis glabris C. B. Prodr. 111. Sideritis glabra, oblongo splendente folio C. B. P. 233.

Sideritis Romana, utriculis spinosis. Sideritidis genus, spinosis verticillis I. B. tom. 3. l. 30. 428.

Sideritis spinosa I. B. tom. 3. l. 30. 428. Sideritis Cretica viscosa, odore Bituminis Zan. Hist. Bot. 186. Stachys spinosa Cretica C. B. P. 236.

Side-

Sideritis altissima, flore albo I. B. v. Calamintha Cattaria.

Sigillum Salomonis. v. Polygonatum.

Sigillum Indicum, flore luteo Stapel. v. Polygonatum.

SILER montanum majus *Morif. Umb.* 7. 8.
Ligusticum quod Seseli Officinarum *C.B.P.*
162. Siler montanum vulgare *I. B. tom.* 3.
l. 27. 168.

Siler Aquilegiæ foliis *Morif. Umb.* 7. 8. Liba-
notis latifolia, Aquilegiæ foliis *C. B. P.* 157.
Ligusticum Rauwolffi, foliis Aquilegiæ *I. B.*
tom. 3. *l.* 27. 148.

Siliqua edulis C. B. P. v. Ceratonia.

SILQUA sylvestris rotundifolia *C. B. P.* 402.
Judaica arbor *I. B. tom.* 1. *l.* 12. 433.

Eadem flore albo, & cortice candicante *C. B. P.*
Var. 402.

Siliqua sylvestris spinosa, arbor Indica C. B. P.
v. Coral.

Siliquastrum. v. Solanum.

* **S**INAPI Rapæ folio *C. B. P.* 99 *Morif. Hist.* 2.
215. Sinapi filiquâ latiusculâ glabrâ, semi-
ne ruffo, sive vulgare *I. B. tom.* 2. *l.* 21. 855.
ANN.

* Sinapi Apii folio, filiquâ hirsutâ, semine albo
aut ruffo *Morif. Hist.* 2. 216. Sinapi hortens-

se, semine albo C. B. P. 99. Sinapi album, filiquâ hirsutâ, semine albo & ruffo I. B. tom. 2. l. 21. 856. ANN.

* Sinapi Erucae folio C. B. P. 99. *Morif. Hist.* 2. 216. Sinapi Eryfimo Tragi cognatum, sive simile I. B. tom. 2. l. 21. 857. ANN.

Sinapi sylvestre Monspeffulanum, lato folio sinuato & laciniato, flosculo luteo minimo, filiquâ longissimâ I. B. tom. 2. l. 21. 858. *Morif. Hist.* 2. 216. ANN.

Sinapi arvense præcox, semine nigro *Morif. Hist.* 2. 216. Rapistrum flore luteo C. B. P. 95. Rapistrum flore albo striato. Sinapi agreste, album Tragi I. B. tom. 2. l. 21. 851. *Sinapi echinatum* I. B. v. Raphanistrum.

SINAPISTRUM Ægyptium heptaphyllum, flore carneo, majus spinosum. Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve majus *Morif. Hist.* 2. 288. Tareriaya Brasiliensibus *Markgr. l.* 33. Lupinus Ægyptius sylvestris *Veslingii Obs. in Alpin.* 69. ANN.

Sinapistrum Indicum pentaphyllum, flore carneo, minus non spinosum. Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve minus *Morif. Hist.* 2. 288. Quinquefolium Lupinifolio C. B. P. 326. Quinquefolium siliquosum Alpini *Exot.* 322. ANN.

Idem triphyllum.

Novæ Plantarum Familiæ, siliquis bival-

LUGDUNO-BATAVUS. 565

SINAPISTRUM INDICUM TRIPHYLLUM, FLORE
CARNEO, NON SPINOSUM.



valvibus unicapsularibus sine septo intermedio duplicem seminum seriem in se continentibus, floribus tetrapetalis longis staminulis donatis, Robertus Morisonius tres adscripsit plantas, quibus nunc quartam, Horti nostri incolam, adjungere, eamque cum ceteris congeneribus nomine Sinapistri indicare placuit. Namquæ harum semina sapore & virtute Sinapi non tantum æmulantur, ejusque loco substituuntur; verum etiam à Lusitanis, in Indiis degentibus, Mustardo demato hoc est Sinapi sylvestre appellantur. Erigit autem nova hæc species à radice tenui albente parvâ cauliculum cubitalem, in paucos divisum ramos, ad tactum glutinosum, cui adnectuntur folia terna, petiolo modo longiore, modo brevissimo ramis cauliculoque pressius juncto, suffulta. Flores modo albicant, modo ex flavo pallescunt. Cætera Sinapistro Indico pentaphyllo omnino paria, videantur ex apposita icone. Locis aridis siccis cultis & in cultis utriusque Indiæ mirabili fecunditate luxuriat.

Sinapistrum Lusitanicum triphyllum, flore rubro, siliquis corniculatis. Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro *Morif. Hist.* 2. 289. Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro *Park. Th.* 1103. & 1687.
ANN.

* **S**ION sive Apium palustre, foliis oblongis
C. B. P. 154. Sion umbelliferum I. B. tom. 3.
l. 27. 172. An Sion aquaticum angustifo-
lium Morisf. Umb. 12?

* Sion aquaticum latifolium Morisf. Umbell. 12.
Sion maximum latifolium I. B. tom. 3. l. 27.
175.

* Sion medium I. B. tom. 3. l. 27. 174. Sium la-
tifolium C. B. P. 154.

* Sion Erucæ folio C. B. P. 154. Sium aquati-
cum, rugosis foliis multifidis & dentatis
Morisf. Umb. 12. Cicuta aquatica Gesneri
I. B. tom. 3. l. 27. 175.

SISARUM Morisf. Umbell. 12. Sisarum Ger-
manorum C. B. P. 155. Sisarum multis I. B.
tom. 3. l. 27. 153.

SISON Morisf. Umb. 12. Sison, quod Amo-
mum Officinis nostris C. B. P. Sison sive
Officinarum Amomum I. B. tom. 3. l. 27.

ANN.

* *Sisymbrium ejusque species* I. B. v. Nasturtium.

* **S**ISYNRICHIMUM ex Phoeniceo suavè rubente
flore Æthiopicum Breyn. Cent. 1. 83.

* Idem flore albo.

Sisynrichium Æthiopicum, foliis Gladioli
parvis, pallescente flore.

Sisynrichium ramosum Æthiopicum, foliis

plicatis nervosis & incanis, radice tuberosâ
phoeniceâ *Breyn. Cent. 1. 85.*

Sisynrichium majus, flore luteâ maculâ notato C. B. P. 40. *Sisynrichium spurium majus*, flore luteâ maculâ notato, seu *Ἰριδοξίφιον* majus *Morif. Hist. 2. 346.* Iridi Bolbusæ affine, *Sisynrichium majus I. B. tom. 2. l. 19. 708.*

Sisynrichium minus angustifolium, flore majore variegato C. B. P. 41.

SMILAX aspera, fructu rubente C. B. P. 296. *Smilax aspera I. B. tom. 2. l. 15. 115.*

Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro C. B. P. 296. *I. B. tom. 2. l. 15. 116.* *Smilax levis vulgò.*

Smilax hortensis ejusquè species. v. Phascolus.

SMYRNIUM majus *Morif. Umbell. 11.* *Hipposelinum Theophrasti*, vel *Smyrnum Diosc. C. B. P. 154.* Macerone, quibus *Smyrnum* semine magno nigro *I. B. tom. 3. l. 17. 126. ANN.*

Smyrnum Creticum Morif. Umb. 12. *Smyrnum peregrinum*, rotundo folio C. B. P. *Smyrnum Creticum perfoliatum I. B. tom. 3. l. 27. 125. ANN.*

Solanifolia Circeæ dicta major & minor C. B. P. v. Circeæ.

SOLANUM vesicarium C. B. P. 166. Solanum Halicacabum vulgare I. B. tom. 3. 34. 609.

Solanum vesicarium Indicum C. B. P. 166. Solanum sive Halicacabum Indicum I. B. tom. 3. l. 34. 609. ANN.

Solanum vesicarium Americanum, caule quadrangulo, foliis Strammonia. Tomatl, seu Planta acinosa *Hernand.* 295. Camaru *Pison.* l. 4. 223. ANN.

Solanum vesicarium Indicum minimum. Halicacabum, seu Alkekengi Arabibus dictum *Bont.* l. 6. 149. ANN.

Quamquam nullus dubitem, quin hoc Solanum sit idem, quod Iacobus Bontius *Hist. Nat.* l. VI. cap. LIII. nomine Halicacabi seu Alkekengi Arabici proposuit; at tamen quoniam ejusdem descriptionem reperi nimis debilem & iconem minus accuratam, ideò in gratiam Botanophylorum paulo plenior descriptionem & iconem adungere decrevi. Namque inter cæteras hujus sortis species omnium minimum est hoc Solanum, facie quidem ad Indicum Camerarii & I. B. accedens; partibus tamen omnibus tenuius & gracilius. Radice nititur tenui albâ fibrosâ: Coliculis dodrantalibus rotundis tenuibus glabris, crebros in ramos diductis, mediâ sui parte humi procumbentibus: Foliis

Solano vulgari similibus, sed multò minoribus, atroviridibus acuminatis, in margine aliquando integris, nonnunquam leviter crenatis. Ad horum sinus prodeunt subinde in caliculis quinquifidis flores parvi, pallidè flavescentes, monopetali in quinque angulos acutos dissecti, & ad fundum fuscis maculis inscripti. Hos excipiunt vesiculæ herbaceæ angulosæ, Solano prædicto duplo minores, quibus includitur bacca concolor, referta seminibus de pressis pallidis, in pulpâ virenti acri & amarâ. Collectum ex incultis sordidis aridis Malabaræ & Zeylonæ invexi in Hortum, ubi ex seminibus deciduis quotannis se ipsum propagat. Virtutes videantur apud Bonitium loco citato.

Solanum somniferum verticillatum C. B. P. 167. Solanum verticillatum I. B. tom. 3. l. 34. 610. Alkekengi Mexicanum Column. ad Hernand. 296. Solanum somniferum antiquorum Alpin. Exot. 71. Peevetti Hort. Mal. tom. 4. 113.

Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Herba Paris I. B. tom. 3. l. 34. 613.

* Solanum Officinarum C. B. P. 166. Solanum hortense, sive vulgare I. B. tom. 3. l. 34. 608.

Acinis nigricantibus C. B. P. Var. 166. ANN.


* Idem acinis ex luteo virescentibus. ANN.

* Idem acinis rubris C. B. P. Var. 166. ANN.

Sola-

Solanum vesicarium indicum minimum.



Solanum μελανοκέρας  C. B. P. 166. Solanum
maniacum mulis, sive Bella donna I. B.
tom. 3. l. 34. 611.

Solanum fruticosum bacciferum C. B. P. 166.
Strychnodendros I. B. tom. 3. l. 34. 614.
Amomum Plinii vulgò.

Solanum scandens, sive Dulcamara C. B. P.
167. Glycypicros sive Amara dulcis I. B.
tom. 2. l. 15. 109.

Idem flore albo C. B. P. Var. 167.

Idem foliis ex albo variegatis Moris. Hort.
Bles. 194.

Solanum tuberosum esculentum C. B. P. 167.

Papas Americanum I. B. tom. 3. l. 34. 621.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
molli C. B. P. 167. Mala aurea, odore fœ-
tido, quibusdam Lycopersion I. B. tom. 3.
l. 34. 621. Fructu luteo C. B. P. Var. ANN.

Idem fructu aureo C. B. P. Var. ANN.

Idem fructu pulchrè rubente C. B. P. Var. 167.
ANN.

Idem fructu albo C. B. P. Var. 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
duro C. B. P. 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu oblongo C. B. P.
167. ANN.

Idem fructu oblongo albo C. B. P. Var. 167.
ANN.

Idem fructu incurvo C. B. P. 167. I. B. tom. 3. l.
34. 619. ANN.

Idem

Idem fructu nigro spinoso C. B. P. 167. *I. B. tom.*

3. l. 34. 619. ANN.

Solanum Pomiferum Indicum spinosum, Borriginis flore, fructu croceo. Solanum spinosum, fructu rotundo C. B. P. 167. Pomum de Hiericho Melongenens congener *I. B. tom.*

3. l. 34. 619. Chunda *Hort. Mal. tom. 2.*
69. ANN.

Idem spinis violaceis. ANN.

Idem spinis ex albo virentibus. ANN.

Idem candicans maximè tomentosum. Solanum spinosum maximè tomentosum *Bocc. Ic. & Descr. 8.* Anachunda *Hort. Mal. tom. 2.* 65. ANN.

Idem Americanum, floribus ex lacteo & coeruleo mixtis. Juripeba Fœmina *Pison. l. 4.* 181. ANN.

Solanum Pomiferum frutescens Africanum, spinosum, nigricans Borriginis flore, foliis profundè laciniatis. Solanum spinosum arborescens Capitis Bonæ Spei *Breyn. Fascic. 25.*

Huic Solano suppingitur radix alba lignosa perennis, longo & obliquo reptatu dispersa. Ex hac fruticat caulis lignosus sesquicubitalis ramosus, in viridi nigricans aculeis mordacibus undiquè armatus: Folia promit atro-viridia oblonga profundè laciniata, costis ab utraquè parte superparibus spinis obsessis: Flores ad ramorum cacu-

cacumina pentapetaloides, Borriginis facie, ex coeruleo pallentes: Baccas Pomi amoris amplitudine & formâ, primùm virides, dein flavos, & ex maturitate in nigrum degenerantes colorem, foventes semina compressa, orbiculata, fusca, in pulpâ flavescente viscidâ, acri, amarâ, nauseosâ & virosâ. Ad fossarum margines locisque aliis incultis Promontorii Bonæ Spei sponte provenit. In Hortis tam per semina quàm ramorum circumpositionem vel submersionem commodissimè propagatur. Hujus radicem, quam acrem & subamaramprehendidi, exemplo Hottentottorum, ad Hydropicorum aquas per urinam educendas, ex decocto præscripsi magno semper ægrotantium levamine; pulpam verò baccarum virulentam reperi, inducentem capitis gravedines, torpores, dolores, furorem denique ipsamquè necem.

Solanum racemosum tinctorium Americanum, foliis & seminibus Amaranthi. Solanum racemosum Indicum *Hort. Reg. Par.* 167. Solanum magnum Virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347.

SOLANUM Capsicum dictum vulgatissimum.

Piper Indicum vulgatissimum C. B. P. 102.

Idem propendentibus filiquis oblongis recurvis C. B. P. 102.

Sola-

LUGDUNO-BATAVUS: 579

SOLANUM POMIF. FRUTES. AFRICAN. SPINOS!
NIGRIC. FOLII PROFUNDE LACIN.



Solanum Capsicum dictum, propendentibus siliquis oblongis recurvis. Piper Indicum propendentibus siliquis oblongis recurvis C. B. P. 102. Piper Indicum, sive Calecuticum, sive Capsicum oblongius I. B. tom. 2. l. 22. 934.

Idem siliquis aureis C. B. P. Var. 102.

Solanum Capsicum dictum, propendentibus siliquis rotundis. Piper Indicum propendentibus siliquis rotundis C. B. P. 102. Capsicum siliquâ latiore & rotundiore, I. B. tom. 2. 22. 943.

Idem siliquis cordatis C. B. P. Var. 102.

Solanum Capsicum dictum, propendentibus siliquis minimis & angustissimis.

Solanum Capsicum dictum, siliquis surrectis & oblongis C. B. P. 202. Rubris.

Idem siliquis aureis Cat. Hort. Reg. Par. 142.

Idem siliquis cordatis.

Idem siliquis rotundis C. B. P. 103.

Idem siliquis bifurcatis C. B. P. Var. 103.

Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso oblongo C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso rotundo, semine pallido C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo aculeis crassioribus & longioribus donato Moris. v. Stramoniam.

Solanum Mexiocanum, flore magno ejusque species I. B. v. Mirabilis.

Sol-

Soldanella maritima minor C. B. P. v. Convolvulus.

Solea equina I. B. v. Ferrum equinum.

Soleæ affinis herba I. B. v. Ferrum equinum.

Solidago Saracenica ejusque species I. B. v. Conyza & Virga aurea:

* **S**ONCHUS asper laciniatus, & non laciniatus C. B. P. 123. Sonchus minus laciniosa mitior, sive minus spinosa & asperior sive spinosior I. B. tom. 2. l. 24. 1014. ANN.

* Sonchus asper arborescens C. B. P. 124.

* Sonchus asper arborescens palustris, Hieracii facie: Hieracium Sonchites majus, folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites C. B. P. 126. Sonchus repens, multis Hieracium majus I. B. tom. 2. l. 24. 1017.

* Sonchus lævis laciniatus latifolius C. B. P. 124. Sonchus laciniatus non spinosus I. B. tom. 2. l. 24. 1015. ANN.

* Idem laciniatus spinosus I. B. tom. 2. l. 24. 1016. ANN.

Sonchus Creticus, semine recurvo. Hieracium majus, folio Sonchi, semine recurro C. B. P. 127. Chondvillæ Creticæ nomine missa semine crispo I. B. tom. 2. l. 24. 1022.

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus C. B. P. 124. Lactuca sylvestris murem, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1004.

Sonchus angustifolius maritimus C. B. P. 124.

Sonchus montanus purpureo-cœruleus major.

Lactuca montana purpureo-cœrulea major

123. *Lactuca sylvatica purpurea* I. B. tom.

2. l. 24. 1005.

Sonchus villosus luteus major C. B. P. v. Hieracium.

Sonchus lanatus Dalechampii I. B. v. Hieracium.

Soncho affinis, Lampsana domestica C. B. P. v. Cichorium.

Sophera Alpini C. B. P. v. Senna.

Sophera Indiae Orientalis Breyn. v. Senna.

Sophia quibusdam I. B. v. Nasturtium.

SORBUS fativa C. B. P. 415. *Sorbus* I. B. tom. 1. l. 1 59.

* *Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis* C. B. P. 415. *Sorbus aucuparia* I. B. tom. 1. l. 1. 62.

Sorbus Virginiana, foliis Arbuti Breyn. Prod. 51.

Sorbus torminalis & Alpina I. B. v. Mespilus.

Sorghi I. B. v. Milium.

Sorgo C. B. P. v. Milium.

* **S**PARGANIUM ramosum C. B. P. 15. *Spar-*
ganium quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 541.

* *Sparganium non ramosum* C. B. P. 15. *Spar-*
ganium alterum I. B. tom. 2. l. 18. 541.

Spar-

Spartium arborescens; seminibus *Lenti* simili-
bus C. B. P. v. Genista.

Spartium Hispanicum, lobis rotundiusculis;
flore luteo I. B. v. Genista.

Spartium Hispanicum flore candido I. B. v. Ge-
nista.

Spartium alterum monospermum; semine reni
simili C. B. P. v. Genista;

Spatula fœtida I. B. v. Iris.

Spergula I. B. v. Alsine.

Spergula marina I. B. v. Alsine.

Sphacelus Theophrasti C. B. P. v. Salvia.

Sphondylium ejusque species I. B. v. Panax.

*Spina alba tomentosa latifolia sylvestris ejus-
que species* C. B. P. v. Carduus.

Spina alba sylvestris Fuchsi I. B. v. Carduus.

Spina lutea I. B. v. Eryngium.

Spina solstitialis I. B. v. Jacœa.

Spina Burgi Monspeliensium I. B. v. Alaternus.

SPINACHIA semine spinoso *Morif. Hist. 2. 598.*

Lapathum hortense; seu *Spinachia* semine
spinoso C. B. P. 114. *Spinachia Foemina* I. B.
tom. 2. l. 23. 963.

Eadem semine non spinoso *Morif. Hist. 598.*

Lapathum hortense; seu *Spinachia* semine
non spinoso C. B. P. 114. *Spinachia* semine
non pungente folio majore & rotundiore
I. B. tom. 2. l. 23. 964.

Spinachia sterilis *Morif. Hist. 2. 598.* *Lapa-
thum*

thum hortense, seu Spinachia sterilis *C. B. P.*

114. Spinachia Mas *I. B. tom. 2. l. 23. 963.*

Spinachia fragifera Aldin. v. Atriplex.

SPIRÆA Theophrasti fortè Clusio *I. B. tom. 1. l. 5. 559.* Frutex spicatus, foliis Salignis ferratus *C. B. P. 475.*

Split I. B. v. Fumaria.

Spongia lignorum I. B. v. Fungus.

STACHYS major Germanica *C. B. P. 236.*

Stachys Fuchsii *I. B. tom. 3. l. 18. 319.*

Stachys Betonica folio subincano.

Hujus Plantæ seminibus, ex Italia delatis, nos donavit olim honestissimus & integer-
rimus senex, Franciscus Sevenhuysen, re-
rum naturalium imprimis verò Plantarum
scientissimus, quæ, decenter sata, adoleve-
runt in plantam bicubitalem, radice pallidâ
digitum crassâ carnosâ, multis fibris capil-
latâ, caulibus tribus quatuorvè, ramosis
rectis solidis quadrangulis rigidis, in spi-
cam desinentibus palmarem, quam undi-
que cingebant densissimâ verticillatâque
serie flores dilutè purpurascens, galea bi-
fidâ erectâ, labio promisso amplo scutellum
exprimente, & ad collum augustiorem
utrinquè auriculato, singulis verò subjicie-
bantur utriculi oblongi quinquifidi, nullis
vel brevissimis fulciti petiolis, continen-

STACHYS BETONICÆ FOLIO SUBINCANO.



tes semina quaterna fusca. Insuper caulibus ac ramis adnata erant folia rugosa, ferrata, pallidè virentia, Betonicæ facie, bina adverso cruciatoquè situ disposita, saporis subacris, odoris debilis, aromatici quidpiam redolentis. Ob spicam strictiorem Stachidi conformem malui Stachidem quàm Calamintham sive Mentastrum, à quo equidem non multùm abluere videtur, appellare.

Stachys palustris foetida C. B. P. 236. Galeopsis angustifolia foetida I. B. tom. 3. app. 854. Stachys spinosa Cretica C. B. P. v. Sideritis.

STAPHYLODENDRON sylvestre & vulgare. Pistacia sylvestris C. B. P. 401. Staphylo-dron I. B. tom. 1. l. 3. 275.

Idem Virginianum trifoliatum. Pistachia Virginiana sylvestris trifolia Moris. Hort. Bles. 295.

STAPHISAGRIA C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 34. 641. ANN.

STELLA leguminosa Moris. Hist. 2. 81. I. B. tom. 2. l. 17. 350. Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato C. B. P. 350.

STOEBE major, foliis Cichoraceis mollibus lanuginosis C. B. P. 273. Stoebe Salamanti-cen.

centis prior Clusii, sive Jacæa Intybacea I. B. tom. 3. l. 25. 36.

Stœbe major, caliculis non splendentibus C. B. P. 273. Centaurii majoris species tenuifolia I. B. tom. 3. l. 25. 31.

Stœbe major, caliculis argenteis C. B. P. 273. Scabiola squamata argentea I. B. tom. 3. l. 25. 30.

STOECHAS purpurea C. B. P. 216. Stœchas Arabica vulgò dicta I. B. tom. 3. l. 28. 277.

Stœchas cauliculis non foliatis C. B. P. 216.

Stœchas citrina ejusque species I. B. v. Elichrysium.

STRAMONIA, seu Datura, pomo spinoso rotundo longo flore. Stramonium multis dicta, sive Pomum spinosum I. B. tom. 3. l. 34. 624. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore C. B. P. 168. Humatu Hort. Mal. tom. 2. 47. ANN.

Stramonium, seu Datura major foetida, pomo spinoso oblongo. Stramonium altera major, sive Tatura quibusdam I. B. tom. 3. l. 34. 624. Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo C. B. P. 168. ANN.

Stramonium, sive Datura ferox, pomo crassioribus & robustioribus aculeis donato, Solanum foetidum, pomo aculeis crassioribus & robustioribus donato Moris. Hort. Bles. 310. Solanum foetidum, pomo grandiore spino-

fissimo *Cat. Hort. Reg. Par.* 168. Stramonium ferox *Bocc. Plant. Sic.* 50. Datura Cochinenfis spinofiffima *Zanon. Hift. Bot.* 76. Datura fructu spinoffimo *Garz. ab Hort. l. I. Arom.* ANN.

Stramonia Ægyptiaca foetida, femine pallido, pomo spinoso rotundo, flore violaceo fimplici duplici triplicive. Solanum foetidum, pomo spinoso rotundo, femine pallido C. B. P. 168. ANN.

Eadem flore pleno, extrinfecus purpurafcente, intrinfecus albente, punctis purpureis afperfo *Catal. Hort. Reg. Par.* 168. Solanum Ægyptium, flore pleno C. B. P. 169. Datura Ægyptia *Vefling. Obf.* 50. ANN.

Stramonia foetida Malabarica, femine pallido, pomo glabro, flore fimplici violaceo. Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 49. ANN.

Eadem flore duplici triplicive. Mudela-Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 51. ANN.

STRATIOTES aquaticus Belgicus *Stapel.* 436. Aloë paluftris C. B. P. 286. Aloe five, Aizoon paluftre *I. B. tom. 3. l. 38.* 787.

Strychnodendron C. B. v. Solanum.

STYRAX folio mali Cotonei C. B. P. 452. Styra x arbor *I. B. tom. I. l. 9.* 341.

SUBER latifolium perpetuò virens C. B. P. 424. Suber latifolium *I. B. tom. I. l. 7.* 103.

Suc-

Succisa flore cœruleo & albo C. B. P. v. Scabiosa.

Sultan Zambach Clusii I. B. v. Lilium.

Sumach I. B. v. Rhus.

Surighaghas Zeylanens. v. Althea.

* **SYMPHYTUM** majus, sive *Consolida major* C. B. P. 259. *Symphytum magnum I. B. tom. 3. l. 33. 593.* *Fœmina flore albo C. B. P. Var. 259.*

* *Idem Mas, flore purpureo vel purpuro cœruleo C. B. P. Var. 259.*

Idem flore variegato.

Symphytum majus tuberosâ radice C. B. P. 259. Symphytum tuberosum I. B. tom. 3. l. 33. 594.

* *Symphytum minus maculosum, sive Pulmonaria latifolia C. B. P. 259. Pulmonaria Italicorum ad Buglossum accedens I. B. tom. 3. l. 33. 595. Floribus cœruleo rubentibus C. B. P. Var. 260.*

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum minus non maculosum, sive Pulmonaria latifolia, albis punctis carens, floribus cœruleo rubentibus C. B. P. Var. 260.

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum, minus sive Pulmonaria angustifolia, rubente cœruleo flore C. B. P. 260. Pulmonaria rubro flore, foliis Echii I. B. tom. 3. l. 33. 597.

Symphytum minus, *Borraginis facie* C. B. P.
v. Buglossum.

Symphonia Dalechampia I. B. v. *Amaranthus*.

SYRINGHA cœrulea C. B. P. 398. Syringha
flore cœruleo, sive Lilac I. B. tom. I. l. 8. 204.

Eadem purpurea. Syringha sive Lilac flore fa-
turate purpureo *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*
328.

Eadem lactea, seu floris colore quasi argenteo
C. B. P. *Var.* 398.

Syringha Persica foliis laciniatis. Ligustrum
foliis laciniatis C. B. P. 476. Agem Lilag
Persarum, inciso folio *Corn.* 188. Jasminum
Persicum, foliis laciniatis *Cat. Hort. Edinb.*
Sutherl. 169.

Eadem foliis integris *Cat. Hort. Reg. Par.*
105. Agem Lilag Persarum, folio integro
Corn. 190. Jasminum Persicum foliis non
laciniatis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 169.

Syringha alba, sive Philadelphus Athenæi C. B.
P. 398.

Syringha Arabica, foliis Mali Aurantii C. B. P.
398. Jasminum sive Sambach Arabum, Al-
pino I. B. tom. 2. l. 15. 102.

T.



tabacum ejusque species I. B. v. Ni-
cotiana,

TAGE-

TAGETES Indicus maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum Africanum majus, simplici flore *C. B. P. 133.* Cempoalxochitl, Caryophylli Mexicani planta *Hernand. 154. ANN.*

Idem flore maximo multiplicato *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum, sive Flos Africanus major, flore pleno *C. B. P. 132.* Cempoalxochitl seu Giuhnaxochitl, Teneycepo-huol, Caryophyllus Mexicanus *I. Hern. 154. ANN.*

Tagetes Indicus medius, flore simplici luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Oquichtli Co-caxochitl, Caryophyllus Mexicanus *I. I. Hern. 155. ANN.*

Idem flore luteo multiplicato. Tlapalte Ca-cayatl, Caryophyllus Mexicanus *I. I. I. Hernand. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minor, simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus *I. B. tom. 3. l. 26. 98.* Tanacetum Africanum, Flos Africanus minor *C. B. P. 133. ANN.*

Idem multiplicato flore *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Macuilxochitl, seu Maon Caryophyllus Mexicanus *IV. Hern. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minimus, flore sericeâ hirsutie obsito. Tanacetum Africanum sericeâ hirsutie obsitum *C. B. P. 133.* Tlapalcoçatli Coaxo-

Coaxochitl Caryophyllus Mexicanus v.
Hern. 156. ANN.

Tagetes Indicus, flore fistuloso simplici. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso simplici C. B. P. 133. ANN.

Idem flore fistuloso duplicato. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso pleno C. B. P. 133. ANN.

Tala Zeylanenf. v, Senna.

TAMARINDUS. Tamarindi I. B. tom. I. l. 12. 422. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. P. 403. Balam-pulli seu Maderam-pulli *Hort. Mal. tom.* 1. 39. Tamarindus & Caranda *Bont. l.* 6. 94. Tamarindus *Hern.* 83.

TAMARIX fruticosa, folio crassiore, sive Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica, sive minor fruticosa I. B. tom. I. l. 10. 351. Myrica vulgò.

Tamarix altera folio tenuiore, sive Gallica C. B. P. 485. Tamarix major, sive arborea Narbonensis I. B. tom. I. l. 10. 351.

Tamnus Plinii, folio Cyclamini I. B. v, Bryonia.

* **T**ANACETUM vulgare luteum C. B. P. 132. Tanacetum vulgare, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 131.

Tanacetum foliis crispis C. B. P. 132. Tanacetum crispum, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 132.

Tana-

Tanacetum montanum inodorum, minore flore
C. B. P. v. Bellis.

Tanacetum inodorum, flore majore C. B. P.
v. Bellis.

Tanacetum minus, odore Camphoræ C. B. P.
v. Millefolium.

Tanacetum Africanum ejusquæ species C. B. P.
v. Tagetes.

Tarchon I. B. v. Dracunculus.

Tareriaja Brasiliensibus Markgr. v. Sinapi-
strum.

Taxoquamoctis I. B. v. Galega.

TAXUS C. B. P. 505. I. B. tom. I. l. 9.
241.

* **T**ELEPHIUM vulgare C. B. P. 287. Anacam-
pseros, vulgò Faba crassa I. B. tom. 3. l.
35. 681.

Telephium purpureum majus C. B. P. 287.
Anacampteros purpurea I. B. tom. 3. l. 35.
682.

Telephium radice Rosæ spirante majus.
Rhodia radix C. B. P. 286. I. B. tom. 3. l. 35. 683.

Idem minus. Rhodia radix minor Cat Hort.
Reg. Paris. 155.

Telephium latifolium peregrinum C. B. P. 287.
Anacampteros maxima I. B. tom. 3. l. 35. 682.

Idem minus.

*Telephium Lusitanicum hæmatodes maxi-
mum*

Telephium peregrinum rubrum Moris Hort. Bles. 201.

Telephium repens, folio deciduo C. B. P. 287. Anacampseros minor, rotundiore folio, semper virens I. B. tom. 3. l. 53. 682.

Telephium repens folio non deciduo C. B. F. 287. Polygonum perenne procumbens, folio brevior, floribus in capitulum congestis Moris. Hist. 2. 592.

Telephium Portulacæ folio Moris. Hort. Bles. 311.

Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides C. B. P. & I. B. v. Scorpiodes.

TEREBINTHUS vulgaris C. B. P. 400. Terebinthus I. B. tom. 1. l. 3. 279.

Terra merita Officin. I. B. v. Curcuma.

Tertianaria I. B. v. Scutellaria.

Tetragonium I. B. v. Frangula.

TEUCRIUM C. B. P. 247. Teucrium multis I. B. tom. 3. l. 28. 290.

Teucrium peregrinum, folio sinuoso C. B. P. 247. Teucrium Boeticum & Creticum Clusii I. B. tom. 3. l. 28. 291.

Teucrium Regium purpureum Mor. Hort. Bles. 311. An Teucrium Creticum odoratum,

flore purpureo Cat. Hort. Reg. Paris. 173?

Teucrium Americanum procumbens Veronica aquatica foliis subrotundis.

Cum

LUGDUNO-BATAVUS. 591

TEUCRIUM AMERICANUM PROCUMBENS, VERO-
NICE AQUATICÆ FOLIIS SUBROTUNDIS.



Cum floribus & seminibus à Teucrio vulgari parùm vel nihil distare videatur hæc exotica planta ; hîc locorum opportunè inferi posse existimavimus. Firmatur radice tenui fibrosâ pallidâ, spargente coliculos spithameos quadrangulos, humi stratos, quos per intervalla ambiunt folia bina sibi, adversa subrotunda glabra pingua, in ambitu levissimè denticulata, Veronicæ aquaticæ rotundifoliæ nonnihil similia; Ad horum exortus prodeunt flores, utrinquè unus, parvi pallidi labiati vix galeati, labio trifido, galeâ simplici exiguâ vix conspicuâ. Singulis subsidet utriculus quinquifidus, sustinens semina subrotunda fusca quaterna. An sit annua vel perennis determinare nondum licet. Floruit primùm hoc ipso anno ex seminibus Americanis ad Illustrissimum Fagelium missis, cujus munificâ liberalitate in nostrum migravit Hortum.

THALICTRUM Canadense *Cornuti*
186.

Thalictrum majus, siliquâ angulosâ aut striatâ C. B. P. 336. Thalictrum nigrius, caule ex semine striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Thalictrum majus flavum, staminibus luteis, vel glauco folio C. B. P. 336. Thalictrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Tha-

* *Thalictrum pratense angustifolium* C. B. P. 337.
I. B. tom. 3. l. 30. 487.

Thalictrum minus C. B. P. 337. *Thalictrum minus*, sive *Rutæ pratensis* genus minus, semine striato *I. B. tom. 3. l. 30. 487.*

Thalictrum minimum foetidissimum C. B. P. 337. *I. B. tom. 3. l. 30. 388.*

THAPSIA *latifolia villosa* C. B. P. 148. *Morif. Umb. 29.* *Thapsia prima* Clusii *latifolia*, flore luteo, semine lato, similis *Seseli Peloponensi Lobelii* *I. B. tom. 3. l. 27. 186.*

Thapsia foliis Libanotidis foetidissima C. B. P. 148. *Thapsia quarta* Clusii, tuberosa vocata, foliis glutinosis, radice nigra foris *I. B. tom. 3. l. 27. 186.*

Thapsia Carotæ folio C. B. P. 149. *Thapsia minor Carotæ effigie* *Morif. Umb. 29.* *Thapsia Carotæ facie* *I. B. tom. 3. l. 27. 187.*

THLASPI *Alyssum dictum campestre minus* C. B. P. 291. *Morif. Hist. 2. 291.* *Thlaspi minus* quibusdam, aliis *Alysson minus* *I. B. tom. 2. l. 27. 928. ANN.*

Thlaspi fruticosum spinosum C. B. P. 108. *Morif. Hist. 1. 192.* *Levcojum spinosum*, *Thlaspi spinosum* aliis *I. B. tom. 2. l. 22. 931.*

Thlaspi Halimi folio, semper virens.

Formâ & magnitudine à præcedente
Thlaspi spinoso fruticoso non multum
 abludit; Verum cauliculis est herbaceis,
 spinis omnino destitutis, pallidis, gla-
 bris, incumbenribus humi & in aliquot
 alas divaricatis; Foliis brevioribus inca-
 nis splendentibus *Halimi* de more: Flo-
 ribus nunc in spicâ nunc in umbellâ di-
 spositis, candidis tetrapetalis, quos ex-
 ciipiunt siliculæ orbiculatæ depressæ, se-
 pto intergerino per transversum, hoc est
 antrorsum & retrorsum, eas in binos locu-
 los dividente, quibus singulis includitur se-
 men unicum orbiculatum depressum ruf-
 um acre.

Thlaspi montanum incanum luteum majus,
Serpilli folio C. B. P. *Morif. Hist.* 2. 292. *Thla-*
spi luteum I. B. tom. 2. l. 22. 928.

Thlaspi incanum, flore albo, capsulis ob-
 longis *Morif. Hist.* 2. 192. *Thlaspi frū-*
ticosum incanum C. B. P. 108. *Thlaspi ca-*
psulis sublongis incanum I. B. tom. 2. l. 22.
 929.

* *Thlaspi arvense*, siliquis latis C. B. P. 105.
Morif. Hist. 2. 293. *Thlaspi cum siliquis*
latis I. B. tom. 2. l. 22. 923. ANN.

* *Thlaspi arvense majus*, *Vaccariæ* folio incano
 C. B. P. 106. *Morif. Hist.* 2. 294. *Thlaspi vul-*
gatius I. B. tom. 2. l. 22. 921. ANN.

Thla-

LUGDUNO-BATAVUS.

595

THLASPI HALIMI FOLIO SEMPER VIRENS.



Thlaspi spicatum Persicum perfoliatum maximum, foliis inferioribus tenuiter incisissimis Hypocotylis modo, superioribus à caule Perfoliatæ modo penetratis *Morif. Hist. 2, 294*.
Thlaspi verum primum Dioscoridis *Zan. Hist. Bot. 191. ANN.*

Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio c. B. P. *Morif. Hist. 2. 295.* Flore purpureo. ANN.

Idem flore albo c. B. P. *Var. 106. ANN.*

Thlaspi umbellatum Monspeliacum, Nasturtii folio c. B. P. 106. *Morif. Hist. 2. 295.*

Thlaspi umbellatum, tenuiter diviso folio, amarum Narbonense *I. B. tom 2. l. 22. 925.* ANN.

Thlaspi fruticosum umbellatum Persicum foliis Leucoji instar semper virentibus *Morif. Hist. 2. 296.* *Thlaspi fruticosum* Persicum, foliis Keiri, flore odorato *Zan. Hist. Bot. 196.* *Thlaspi* semper virens & florens *Dodart. Mem. 115.* *Thlaspi latifolium* platycarpon, Leucoji foliis *Bocc. Pl. Sic. 51.*

Thlaspi montanum semper virens c. B. P. 106. *Morif. Hist. 2. 297.* *Thlaspi* semper virentis species candida *I. B. tom. 2. l. 22. 230.*

Thlaspi villosum, capitulis hirsutis c. B. P. 106. *Morif. Hist. 2. 297.* *Thlaspi capitulum* hirsutis *I. B. tom. 2. l. 22. 922. ANN.*

Thlaspi peregrinum, capsulâ cordata *Morif. Hist. 2. 298.*

Hist. 2. 297. *I. B. tom.* 2. *l.* 22. 927. ANN.

Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato C. B. P. v. Leucojum.

Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium majus & minus C. B. P. v. Leucojum.

Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. v. Nasturtium.

THUYA Theophrasti C. B. P. 488. Arbor Vitæ, sive Paradisiaca vulgò dicta, odorata ad Sabinam accedens *I. B. tom.* 1. *l.* 9. 286.

Tymbra Græcorum I. B. v. Satureja.

THYMELÆA foliis Lini C. B. P. Thymelæa Monspeliaca *I. B. tom.* 1. *l.* 5. 591.

Thymelæa foliis acutis, floribus odoratis purpureis, Cneoron Matthiolo dicta. Thymelæa foliis acutis affinis facie externâ C. B. P. 463. Cneoron Matth. suffrutex *I. B. tom.* 1. *l.* 5. 570.

Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ C. B. P. v. Alypum.

THYMUS vulgaris, folio tenuiore C. B. P. 219. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 263. Foliis candidis, & grave olentibus C. B. P. *Var.* 335.

Idem foliis virentibus & suavè odoratis C. B. P. *Var.* 335.

Idem folio variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*

175.

Thymus vulgaris, folio latiore C. B. P. 219.

Thymus durior vulgò.

Thymus capitatus, qui Dioscoridis C. B. P.

219. Thymum Creticum, sive antiquorum

I. B. tom. 3. l. 28. 262.

* **T**HYSSELINUM *Morif. Umbell. 42.* Apium sylvestre, lacteo succo turgens C. B. P. 153.

Apium sylvestre Dodonæi, Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turgens, locis humidis proveniens *I. B. tom. 3. l. 27.*

188.

* Thysselinum palustre, foliis Ferulaceis. Sefeli palustre lactescens C. B. P. 162. *Morif.*

Umbell. 43. Sefeli palustre lactescens acre, foliis Ferulaceis, flore albo, semine lato

I. B. tom. 3. l. 27. 188.

Tibadi & Tibcadi I. B. v. Hyacinthus.

* **T**ILIA Mas, folio Ulmi C. B. P. 426. Tilia folio minore *I. B. tom. 1. l. 8. 137.*

* Tilia Fœmina, folio majore C. B. P. 426. Tilia vulgaris platyphyllos *I. B. tom. 1. l. 8. 133.*

Tinctorius flos I. B. v. Genista.

Tirasta Walu Zeylanensibus. v. Convolvulus.

TITHYMALUS Mauritanicus aphyllus, angulosus & spinosus, ex quo Euphorbium

bium Officinarum. Euphorbium Dodonæi Lobelii *C. B. P.* 387.

Nobilissimam hanc plantam Everhardi Vorstii tempore viguisse in nostro Horto, nigrante verò hyeme duriore iterum perisse, testatur Bodæus à Stapel in Commentariis ad Theophrastum 1057. Nunc defectum ejus feliciter explevit Vir Amplissimus Dns Herbertus à Beomont, Stirpium omnium exoticarum admirator & æstimator eximius, qui eam propriis sumptibus ex Mauritaniâ hûc transferri curavit, ejusque sobolem nobis benignè concessit.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus. Lathyris major *C. B. P.* 293. Lathyris, sive Cataputia minor *I. B. tom. 3. App.* 880.

Tithymalus Characias rubens peregrinus *C. B. P.* 290. Tithymalus Amygdaloides, sive characias *I. B. tom. 3. l. 34.* 672.

Tithymalus Characias, folio serrato *C. B. P.* 290. Tithymalus ferratus Dalechampii *I. B. tom. 3. l. 24.* 673.

Tithymalus Amygdaloides sive Characias arborescens, floribus atro-puniceis, major. Idem floribus flavescentibus minor.

Tithymalus Myrsinites latifolius *C. B. P.* 290.

Tithymalus Myrsinites *I. B. tom. 3. l. 24.* 674.


*Tithymalus maritimus *C. B. P.* 290. Tithymalus paralius *I. B. tom. 3. l. 34.* 677.

- Tithymalus palustris fruticosus* C. B. P. 292.
Tithymalus magnus multicaulis, sive *Esula*
major I. B. tom. 3. l. 34. 671.
- * *Tithymalus arvensis latifolius Germanicus*
 C. B. P. 291. *Tithymalus platyphyllos* Fuch-
 sii I. B. tom. 3. l. 34. 670. *Esula minor*
 vulgò.
- * *Tithymalus subrotundis foliis majoribus cre-*
natis. *Tithymalus Helioscopius* C. B. P. 291.
Tithymalus helioscopius, sive *Solisequus*
 I. B. tom. 3. l. 34. 663. ANN.
- * *Tithymalus rotundis foliis non crenatis.* *Pe-*
plos, sive *Esula rotunda* C. B. P. 692. I. B.
 tom. 3. l. 34. 669. ANN.
- Tithymalus tuberosâ Pyriformi radice* C. B. P.
 292. *Apios* I. B. tom. 3. l. 34. 666.
- Tithymalus Tingitanus*, *Linariæ foliis*, lunato
 flore. An *Tithymalus Linariæ folio*, luna-
 to flore *Mores. Hort. Blef.* 313? ANN.
- Tithymalus Ragusinus*, flore luteo pentape-
 talo.

Perrarum & venustum hoc *Tithymali*
 genus, seminibus ex *Ragusâ* missis nobis na-
 tum, promit radicem lignosam tenuem
 pallidam: Cauliculos dodrantaes ramosos
 quasi fruticosos, graciles tamen glabros sub-
 rubentes, aliquando exiguis ferrugineis pun-
 ctis & tuberculis adspersos; His adstant
 folia rara, *Linariæ* paria, sed triplo breviora,
 insigni per longitudinem nervo inscripta;

Ra-

LUGDUNO-BATAVUS. 601
TITHYMALUS RAGUSINUS FLORE LU-
TEO PENTAPETALO.



Ramorum cimis insident flores exigui, quinque orbiculatis flavescentibus petalis totidemquè concoloribus staminulis, singulis duobus apicibus donatis, constructi, è quorum medio prominet vasculum parvum trigonum tricapsulare, ceu arenularum minutissimarum congestu, aut verrucarum instar asperatum, tribus è summo exeuntibus staminulis bifidis; In singulis capsulis continetur semen rotundum fuscum. Exactam postulat culturam, imprimis hyeme, cujus rigidiores injurias minimè sustinet. In nostrate solo cœloquè semina raro perficiens per ramulos se propagari patitur.

* *Tithymalus foliis Pini*, fortè *Diolcoridis Pityusa* C. B. P. 222. *Tithymalo Cyparissia* similis, *Pityusa* multis *I. B. tom. 3. l. 34. 665.*

* *Tithymalus exiguus erectus*. *Tithymalus exiguus*, sive *Esula exigua* C. B. P. 291. *Tithymalus minimus angustifolius annuus* *I. B. tom. 3. l. 34. 664. ANN.*

* *Tithymalus exiguus procumbens*, *Chamaesyce* dictus. *Chamaesyce* C. B. P. 293. *I. B. tom. 3. l. 34. 667. ANN.*

Tithymalus Lentifolius minimus. *Anthyllis maritima Lentifolia* C. B. P. 282. *Anthyllis Lentifolia*, *Peplios effigie*, *maritima* *I. B. tom. 3. l. 29. 374.*

Tlaolli Hern. v. Frumentum.

Tlapalcoçatli Hern. v. Tagetes.

Tla.

Tlapalte Cacayatl Hern. v. *Tagetes*.

Tomatl Hern. v. *Solanum*.

Topiaria Plinio 1. B. v. *Buglossum*.

TORDILIUM maximum, Sphondylii semine aculeato *Morif. Umbell.* 40. Tordilium majus vulgare, feminibus limbo quasi lævi *Morif. Umbell.* 66. *Caucalis maxima*, Sphondylii semine aculeato *C. B. P.* 152. An *Seseli Creticum* majus *C. B. P.* 161? *Caucalis major*, semine minus pulchro hirsuto 1. B. *tom.* 3. l. 27. 85. An *Caucalis major* *Clusio* 1. B. *tom.* 3. l. 27. 85?

Tordilium minus, limbo granulato *Syriacum* *Morif. Umbell.* 37. & 40. *Gingidium* foliis *Pastinacæ latifoliæ* *C. B. P.* 151. *Caucalis Syriaca* cum maximo semine 1. B. *tom.* 3. l. 27. 86.

Tormentilla 1. B. seu *sylvestris* *C. B. P.* v. *Pentaphyllum*.

Tormentilla Alpina, folio sericeo *C. B. P.* v. *Alchyn. illa*.

Trachelium minus Americanum, flore patulo cæruleo & albo *Dodart.* v. *Campanula*.

Trachelium hirsutum altissimum asperius, foliis angustis, floribus parvis 1. B. v. *Campanula*.

TRAGACANTHA *C. B. P.* 338. *Tragacantha Massiliensis*, foliis incanis perseverantibus seu

seu non deciduis, flore albo *Morif. Hist.* 2.

113. *Tragacantha Massiliensibus* I. B. tom. 1. l. 11. 407.

Tragium I. B. v. *Hypericum*.

* **T**RAGOPOGON pratense luteum majus C. B. P. 274. *Tragopogon* flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon purpuro-cœruleum, Porri folio C. B. P. 274. *Tragopogon* flore purpureo I. B. tom. 2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon laciniatum luteum C. B. P. seu folio laciniato *Monspeliense*, flore luteo I. B. v. *Scorzonera*.

Tragoriganum Alpin. v. *Satureja*.

Tragus spinosus Matth. v. *Kali*.

Trasi I. B. v. *Cyperus*.

TRIBULUS terrestris, Ciceris folio, seminum integumento aculeato *Morif. Hist.* 2.

102. *Tribulus terrestris*, Ciceris folio, fructu aculeato C. B. P. 350. *Tribulus terrestris* I. B. tom. 2. l. 17. 352. ANN.

* *Tribulus aquaticus* C. B. P. 194. I. B. tom. 3. l. 38. 775.

* **T**RICHOMANES, sive *Polytrichon* Officinarium C. B. P. 356. *Trichomanes*, sive *Polytrichum* I. B. tom. 3. l. 37. 754.

TRI-

* **T**RIFOLIATA paludosa *Morif. Hist. 2. 149.*
 in halluc. Trifolium palustre *C. B. P. 327.*
 Trifolium palustre *I. B. tom. 2. l. 17. 389.*

TRIFOLIUM bituminosum, seu Trifolium
 cœruleum, aut violaceum, bitumen redo-
 lens *Morif. Hist. 2. 136.* Trifolium bitumen
 redolens *C. B. P. 327.* Trifolium Asphalti-
 tes, sive bituminosum odoratum & non
 odoratum *I. B. tom. 2. l. 17. 366.*

Trifolium pratense album vulgare odoratum
Morif. Hist. 2. 137. Trifolium pratense al-
 bum *C. B. P. 327.* Trifolium pratense, flo-
 re albo minus, & Fœmina, glabrum *I. B.*
tom. 2. l. 17. 380.

Idem amplioribus foliis & floribus, non odo-
 ratum.

Trifolium phœum fuscum, luxurians quater-
 nis quinis & senis foliis *Morif. Hist. 2. 135.*
 Quadrifolium hortense album *C. B. P. 327.*
 Trifoliis affinis, Quadrifolium phœum Lo-
 belii *I. B. tom. 2. l. 17. 380.*

Trifolium pratense purpureum vulgare *Morif.*
Hist. 2. 138. Trifolium pratense purpu-
 reum *C. B. P. 327.* Trifolium purpureum
 vulgare *I. B. tom. 2. l. 17. 374.*

Trifolium album tricoccon subterraneum
 Gastonium reticulatum *Morif. Hist. 2. 138.*

Trifolium purpureum montanum majus, spi-
 cā oblongā *Morif. Hist. 2. 139.* Trifolium
 spicā

spicâ oblongâ rubrâ C. B. P. 328. Trifolium majus tertium purpureum Clusii *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum montanum pinnatum Lagopoides, spicâ longissimâ *Morif. Hist. 2. 140.* Trifolium montanum, spicâ longissimâ rubente C. B. P. 328. Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum Lagopoides hirsutum annum angustifolium spicâ dilute rubente *Morif. Hist. 2. 140.* Trifolium angustifolium Hispanicum, sive Lagopus angustifolius, flore dilutè rubente *I. B. tom. 2. l. 17. 377.* Trifolium Hispanicum angustifolium, spicâ dilutè rubente C. B. P. 328. ANN.

Idem rotundifolium *Morif. Hist. 2. 140.* ANN. Trifolium Lagopoides hirsutum angustifolium Hispanicum, flore ruberrimo *Morif. Hist. 2. 141.* ANN.

*Trifolium Lagopoides purpureum arvense humile annum, seu Lagopus minimus vulgaris *Morif. Hist. 2. 141.* Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus C. B. P. 328. Lagopus Trifolius quorundam *I. B. tom. 2. l. 17. 379.* ANN.

*Idem latioribus foliis C. B. P. *Var. 328.* ANN. Trifolium Alpinum, flore magno, radice dulci C. B. P. 328. Trifolium Glyzyrrhyzites Parkinsonii *Morif. Hist. 2. 146.*

TRIFOLIUM agrarium luteum, capitulo Lupuli majus *Morif. Hist. 2. 142.* Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium C. B. P. 328. Trifolium pratense luteum Fœmina, flore pulchriore, sive Lupulino I. B. tom. 2. l. 17. 381. ANN.

Trifolium purpureum pratense folliculatum C. B. P. 329. *Morif. Hist. 2. 144.* Trifolium folliculaceum, sive vesicarium minus purpureum I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

* Trifolium Fragiferum Friscum, folio cordato, flore rubro *Morif. Hist. 2. 144.* Trifolium Fragiferum Friscum C. B. P. 144.

Trifoliis affinis Anonis ejusque species I. B. v. Anonis.

Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulis dispositis C. B. P. v. Lotus.

Trifolium album rectum hirsutum valde I. B. v. Lotus.

Trifolium rectum Monspessulanum I. B. v. Lotus.

Trifolium hæmorrhiodale majus Parkins. v. Lotus.

Trifolium pratense luteum, capitulo brevior C. B. P. v. Melilotus.

Trifolium pratense luteum Mas, flore minore, semine multo I. B. v. Melilotus.

Trifolium odoratum ejusque species I. B. v. Melilotus.

Tri-

Trifolium cochleatum & echinatum ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium sylvestre siliquâ cornutâ ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium siliquâ falcatâ C. B. P. v. Medica.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium I. B. v. Anthyllis.

Trifolium acetosum ejusque species C. B. P. & I. B. v. Oxys.

Trifolium hepaticum ejusque species C. B. P. & I. B. Hepatica nobiles.

Trifolium palustre C. B. P. v. Trifoliata paludosa.

Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro Moris. v. Sinapistrum.

Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro Park. v. Sinapistrum.

* **T**RIPOLIUM majus cœruleum C. B. P. 267.
Tripolium majus I. B. tom. 2. l. 24. 1064.

* Idem flore albo Breyn. Prodr. 52. Comelin.
Cat. 110.

Tripolium altissimum Americanum, caulibus viridantibus. Aster latifolius, Tripolii flore Mem. Dodart.

Idem caulibus rubentibus.

Tripolium Anguillarae I. B. v. Leucojum.

TRITICUM hybernum, aristis carens C. B. P. 21. Triticum vulgare, glumas tritundo

rando deponens *I. B. tom. 2. l. 18. 407.*

Triticum æstivum C. B. P. 21. Zea verna I. B. tom. 2. l. 18. 413.

Triticum spicâ multiplici C. B. P. 21. Triticum cum multiplici spicâ, glumas facile deponens I. B. tom. 2. l. 18. 408.

Triticum aristis longioribus, spicâ albâ C. B. P. 21

Triticum Polonicum.

Triticum Peruvianum album longum I. B. v. Frumentum.

Triticum vaccinium I. B. v. Melampyrum.

Trollius flos I. B. v. Helleborus.

Tuberaria major Myconii I. B. v. Cistus.

TULIPA præcox lutea *C. B. P. 57. Moris. Hist. 2. 398. Tulipa præcox flava I. B. tom. 2. l. 9. 666.*

Tulipa præcox rubra C. B. P. 57. Moris. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.

Tulipa præcox purpurea C. B. P. 57. Moris. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 667.

Tulipa præcox alba C. B. P. 57. Moris. Hist. 2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.

Tulipa serotina lutea C. B. P. 60. Moris. Hist. 2. 399. Tulipa serotina, flava cui quatuor folia in caule I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa serotina alba C. B. P. 60. Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa serotina rubra C. B. P. 60. Moris. Hist. 2. 399. I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Q q

Tuli-

Tulipa serotina coccinea *Morif. Hist. 2. 399.*

Tulipa coccinea holosericea *I. B. tom. 2. l. 19. 671.*

Tulipa serotina, viridis coloris *Eyst. Morif. Hist. 2. 399.* Tulipa serotina, Brassicæ floridæ similis; vel Tulipa viridis prima *C. B. P. 61.*

Tulipa dubia major *C. B. P. 61.* Tulipa dubia *I. B. tom. 2. l. 19. 671.*

Tulipa dubia major altera *C. B. P. 61. I. B. tom. 2. l. 19. 671.*

Tuliparum præcocium serotinarum & dubiarum pene innumeræ varietates, pulcherri-
mis florum coloribus jucundè ridentes.

Tulipa serotina ramosa major *C. B. P. 61. Morif. Hist. 2. 399.* Flore simplici, rubro, flavo, vario.

Tulipa serotina ramosa major, flore pleno, ex rubro flavo & viridi variegato.

Tulipa miniata, flore pleno *Eystett. Morif. Hist. 2. 399.* Tulipa Pœonia vulgò.

Tulipa serotina ramosa maxima, flore simplici fimbriato flavo-vario. Psittacus vulgò.

Eadem flore pleno.

Hujus bulbus emittit caulem pede altio-
rem robustum incano madore pubescen-
tem, & in tres quatuor pluresve ramos di-
visum, singulis insidet flos amplius in viridi
rubro aureoque eleganter variegatus, &
multiplicibus petalis modo planis modo
fim-

LUGDUNO-BATAVUS. 611

TULIPA SEROTINA RAMOSA MAXIMA, FLORE
PLENO FLAVO-VARIO,



fimbriatis, Rosæ vel Pœoniæ in modum dispositis, refertus. Huic æstate ferventiore succedit aliquando capitulum oblongum trigonum, cœteris Tulipis majus & robustius, quod dehiscens in tribus loculis sex seminum seriem ostendit more congenerum. Cauli verò ac ramis adstant, folia lata, firma erectiora, qualia fert Tulipâ ferotinâ πολυκλαδής Clusii, cum quâ hæc Plantasolis exceptis floribus omnino convenit.

Tulipa minor lutea Italica πολύκλον Moris. Hist. 2. 400. Tulipa minor lutea Italica C. B. P. 63.

Tulipa Persica major, flore rubro, foliis longissimis.

Tulipa Persica minor, foliis angustissimis, variegato flore. Tulipa variegata Persica C. B. P. 64. Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa pumilio latifolia, flore extus rubro intus flavo. An Tulipanana, sive Pumilio flore luteo Camerarii C. B. P. 63?

Tulipa Capensis Stapel. v. Hamanthus.

Tulipifera Arbor Virginiana.

Cui Stirpium familiæ inferenda sit hæc Arbor, nunc determinare non audeo, Nec dum enim flores nec fructus conspiciere licuit. Equidem nonnullis Alnum, aliis Acer, quibusdam etiam Populum vocari subinde audio; Quò verò fundamen-

LUGDUNO-BATAVUS. 613

TULIPIFERA ARBOR VIRGINIANA.



to non audio. Flores formosissimos Tulipis similes proferre, asserunt omnes ex Virginia reduces, de fructibus autem minùs solliciti nihil certi affirmant. A duobus abhinc annis mittebat ad me Jacobus Bobartus Horti Oxoniensis p.t.Præses inter multa alia curiosissima ex Virginiâ delata nonnulla semina, nomine Arboris Tulipiferæ, quæ in quantum conjicere poteram, videbantur semina cujusdam Arboris coniferæ. Erant enim ex duabus membranaceis longis rigidisque alis constructa, è quorum medio sinu protuberabat futuri germinis primordium formâ oblongæ nukulæ, veluti in seminibus Cedri; sed quoniam illa semina decenter sata non prodierunt, nec ab eo, qui laudato Dno Bobarto donaverat, propria manu erant collecta, hæremus, an fuerint legitima Arboris nostræ Tulipiferæ semina. Cæterùm quam hoc titulo in Horto colimus, Arbor est humanâ altitudine superior, trunco pollicem crasso, cortice lævi fusco, aliquot cineraceis maculis asperato, odoris ignavi aromatici, nonnihil ad Sassafras accedentis, materie pallidâ molli, medullâ paucâ ruffâ. Ramos spargit inæquales ordine inconcinno, ad quorum nodos è digitalibus pediculis prodeunt folia instar Aceris minoris trilobata nitida, quasi forfice essent circumsecta, palmam

am-

ampla, supernè viridia infernè incana, aliquotquè nervis ex dorso crassiori prodeuntibus inscripta, superiori & intermedio lobo productiori frontato, binis lateralis in parvum obtusum mucronem abeuntibus. Singulos verò ramos & folia excludit parva oblonga theca in duas foliaceas pinnas dehiscens, quæ ramis & foliis adolescentibus exarescunt & decidunt. Consimilem arborem Juglandis nucis amplitudine observavi anno c15 15 cLXXXIII in splendidissimo prædio Nobilissimi Dni Nortfolckii ad quinque vel sex millia passuum distante Londino, quæ etiamsi aliquot viginti annos ibidem esset exculta, flores tamen fructusquè nondum ediderat.

Turbith Officinis. v. Convolvulus.

Turpetum repens, foliis Althææ, vel Indicum
C. B. P. v. Convolvulus.

Turritis vulgarior I. B. v. Leucojum.

Turritis secunda Clusii I. B. v. Brassica.

Tusai I. B. v. Lilium.

* **T**USSILAGO vulgaris C. B. P. 197. Tussilago I. B. tom. 3. l. 32. 563.

Tuwakarupila Zeylanensium. v. Cucumis.

* **T**YPHA palustris major C. B. P. 20. I. B. tom. 2. l. 18. 539.

- * *Typha palustris*, clavâ gracili *C. B. P.* 20. *Typha palustris media* *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 540.
 * *Typha palustris minor* *C. B. P.* 20. *Typha minor* *I. B. tom.* 2. *l.* 18. 540.



V.

accaria *I. B.* v. *Lychnis*.

- V**ALERIANA major hortensis *Morif. Umbell.* 52. *Valeriana hortensis*: *Phu Olfatri folio* *C. B. P.* 164. *Valeriana major*, odoratâ radice *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 209.
 * *Valeriana major sylvestris*, foliis latioribus *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana sylvestris major* *C. B. P.* 164. *Valeriana sylvestris magna aquatica* *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 210.
 * Eadem foliis angustioribus *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana sylvestris major montana* *C. B. P.* 164.
Valeriana minor annua, æstiva *Morif. Umbell.* 50. *Valeriana foliis Calcitrappæ* *C. B. P.* 164. ANN.
 * *Valeriana minor perennis palustris* *Mor. Umb.* 50. *Valeriana palustris minor* *C. B. P.* 164.
 - *Valeriana minor pratensis vel aquatica* *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 211.
Valeriana marina latifolia, seu major rubra *Morif. Umb.* 50. *Valeriana rubra* *C. B. P.* 165.
Valeriana latifolia rubra *I. B. tom.* 3. *l.* 27. 211.
 Eadem alba *Morif. Umbell.* 50.

Va.

Valeriana peregrina seu Indica I. B. v. Valerianella.

Valeriana semine stellato. v. Valerianella.

Valeriana campestris inodora major C. B. P. v. Valerianella.

Valeriana Canadensis, flore albo Cornut. v. Eupatorium.

VALERIANA Græca violacea *Morif. Umbell. 55.* Valeriana cœrulea C. B. P. 164. Valeriana Græca quorundam, flore cœruleo I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Eadem alba *Morif. Umbell. 55. C. B. P. Var. 164.* Valeriana Græca quorundam, flore albo I. B. tom. 3. l. 27. 252.

Eadem ex albo & cœruleo variegata.

VALERIANELLA Cornucopioides rubra, seu Indica Clusii *Morif. Umbell. 53.* Valeriana peregrina seu Indica I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Valerianella semine Scabiosæ major, Lusitanica *Morif. Umbell. 53.* Valerianella semine stellato C. B. P. 165.

Valerianella arvensis præcox humilior, semine depresso *Morif. Umbell. 53.* Valeriana campestris inodora major C. B. P. 165. Locusta herba I. B. tom. 3. l. 28. 325. Lactuca agnina vulgò. Foliis integris.

Eadem foliis dissectis. Locusta altera foliis ferratis *I. B. tom. 3. l. 28. 324.*

Verbasculum pratense Alpinum & hortense C. B. P. & Moris. eorumque species. v. Primula Veris.

Verbasculum Cyanoides C. B. P. v. Cyanus.

* **V**ERBASCUM foliis incanis, Mas latifolium, floribus luteis arctè caulibus adhærentibus, sine foliis angustis inter flores emanantibus *Moris. Hist. 2. 484.* Verbasculum Mas latifolium luteum *C. B. P. 239.* Verbasculum vulgare, flore luteo magno, folio maximo *I. B. tom. 3. App. 871. ANN.*

Verbasculum foliis incanis maximum odoratum Meridionalium, floribus luteis arctè caulibus adhærentibus, & foliis multis angustis inter flores emanantibus *Moris. Hist. 2. 485.* Verbasculum Fœmina, flore luteo magno *C. B. P. 239.* Verbasculum maximum Meridionalium odoratum luteum *I. B. tom. 3. App. 871. ANN.*

Verbasculum foliis viridibus perenne, floribus luteis racematim provenientibus, staminulis purpurascens *Moris. Hist. 2. 486.* Verbasculum nigrum, flore ex luteo purpurascens *C. B. P. 240.* Verbasculum nigrum, flore parvo apicibus purpureis *I. B. tom. 3. App. 873.*

Idem annuum floribus luteis. Verbasculum nigrum

grum Dioscoridis *Lobel.* 664. I

Idem annum floribus albis. An Blattaria flore albo *Lobel.* 664?

Verbascum humile Alpinum villosum Borraginis flore & folio. Sanicula Alpina, foliis Borriginis villosa C. B. P. 234. *Morif. Hist.* 2558.

Verbascum latis *Salviæ foliis* C. B. P. v. *Salvia* in *App.*

Verbascum sylvestre *Salvisolium exoticum*, folio rotundiore I. B. v. *Salvia* in *App.*

Verbascum acuto *Salviæ folio* C. B. P. v. *Lychnis*.

Verbascum Lychnites *Syriacum incanum*, summitate floris *Hierosolymitani* I. B. v. *Lychnis*.

* **V**ERBENA communis, flore cœruleo C. B. P. 269. *Verbena vulgaris* I. B. tom. 3. l. 30. 443.

Verbena tenuifolia C. B. P. 269. *Verbenaca supina* I. B. tom. 3. l. 30. 444.

Verbena peregrina, foliis *Urticæ* *Mem. Dordart.* 125. *Verbena Urticæ folio* *Canadensis* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 183. *Zanon. Hist. Bot.* 203.

Verbesina flore minus pulchro, elatior ac magis frequens I. B. v. *Chrysanthemum*.

Verbesina pulchriore flore luteo I. B. v. *Chrysanthemum*.

Vermicularis marina arborescens I. B. v. *Kali*.

VERQ.

VERONICA spicata major recta coerulea *Morif. Hist.* 317. *Lyfimachia* spicata coerulea C. B. P. 246. *Veronica* spicata recta, profundè serrata, quam *Lyfimachiam* coeruleam quidam vocant *I. B. tom. 3. l. 28. 284.*

Veronica major latifolia erecta *Morif. Hist.* 2. 317. *Veronica* spicata latifolia C. B. P. 246. *Veronica* major latifolia, foliis splendentibus & non splendentibus *I. B. tom. 3. l. 28. 283.*

Veronica angustifolia recta minor vulgaris *Morif. Hist.* 2. 318. *Veronica* spicata angustifolia C. B. P. *Veronica* major angustifolia, caulibus viridibus *I. B. tom. 3. l. 28. 284.*

Veronica spicata, flore purpureo *Morif. Hort. Blef.* 321.

* *Veronica* Mas supina vulgaris, foliis serratis *Morif. Hist.* 2. 318. *Veronica* Mas supina & vulgatissima C. B. P. 246. *Veronica* vulgarior, folio rotundiore *I. B. tom. 3. l. 38. 274.*

Veronica pratensis Serpillifolia C. B. P. 247. *Morif. Hist.* 2. 319. *Veronica* Fœmina quibusdam, aliis *Betonica* Pauli Serpillifolia *I. B. tom. 3. l. 28. 285.*

Veronica major frutescens altera *Morif. Hist.* 2. 319. *Chamædrys* spuria major altera frutescens C. B. P. 319. *Chamædrys* spuria latifolia *I. B. tom. 3. l. 28. 286.*

Veronica supina, facie *Teucrii* pratensis *Morif.*

ris. Hist. 2. 319. Chamædrys spuria major angustifolia C. B. P. 249. Chamædrys spuria, angustifolia I. B. tom. 3. l. 28. 285.

- * *Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moris. Hist. 2. 320. Chamædrys spuria minor rotundifolia C. B. P. 249. Chamædrys spuria latifolia I. B. tom. 3. l. 28. 286. Flore cœruleo.*

Eadem flore albo,

Veronica minor virgulosa, seu multicaulis Pannonica Moris. Hist. 2. 320. Chamædrys spuria minor latifolia C. B. P. 249. Chamædrys falsa species. Teucrium 2. aut 5. Clusii I. B. tom. 3. l. 28. 287.

- * *Veronica Hederulæ folio Moris. Hist. 2. 322. Alsine Hederulæ folio C. B. P. 250. Alsines genus Fuchsio, folio Hederulæ hirsuto I. B. tom. 3. l. 29. 368. ANN.*

- * *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus Moris. Hist. 2. 322. Alsine Veronicæ foliis, flosculis caulibus adhærentibus C. B. P. 250. Alsine serrato folio hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus I. B. tom. 3. l. 19. 367. ANN.*

- * *Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryos folio Moris. Hist. 2. 322. Alsine Chamædryfolia, flosculis oblongis pediculis insidentibus C. B. P. 250. Alsine serrato folio glabro I. B. tom. 3. l. 29. 367. Foliis conjugatis. ANN.*

*Ea-

* Eadem foliis alternis. ANN.

* Veronica cœrulea triphyllos, nunc pentaphyllos, seu trifida & quinquifida *Morif. Hist. 2. 323.* Alsine triphyllos cœrulea *C. B. P. 250.* Alsine folio profundè secto, flore purpureo, sive violaceo *I. B. tom. 3. l. 28. 367.* ANN.

* Veronica aquatica major, folio subrotundo *C. B. P. 252.* Anagallis aquatica, folio rotundiore major *I. B. tom. 3. l. 38. 791.*

* Eadem minor. Anagallis aquatica minor, folio subrotundo *C. B. P. 252.* Anagallis aquatica, flore purpurascens, folio oblongo minor *I. B. tom. 3. l. 38. 791.*

* Veronica aquatica major, folio oblongo *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica major, folio oblongo *C. B. P. 252.* Anagallis aquatica, flore cœruleo, folio oblongo *I. B. tom. 3. l. 38. 791.*

* Veronica aquatica, folio subrotundo non crenato *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica minor, folio rotundo non crenato *C. B. P. 252.* Samolus Valerandi *I. B. tom. 3. l. 38. 791.*

* Veronica aquatica angustifolia minor *Polygoni instar Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica angustifolia *C. B. P. 252.* Anagallis aquatica angustifolia *I. B. tom. 3. l. 38. 791.*

VIBURNUM Math. C. B. P. 316. Lantana
vulgò, aliis Viburnum *I. B. tom. 1. l. 5. 557.*

* **V**ICIA perennis multiflora spicata cœrulea sepiaria *Morif. Hist. 2. 61.* Vicia multiflora C. B. P. 61. Vicia multiflora perennis nemorensis, sive dumetorum *I. B. tom. 2. l. 17. 314.*

Vicia sylvatica multiflora maxima *P. B. 7. Raji Catal. 304.*

* Vicia perennis maxima dumetorum, flore obscure rubente *Morif. Hist. 2. 61.* Vicia maxima dumetorum C. B. P. 345. Vicia sepium perennis *I. B. tom. 2. l. 17. 313.*

Vicia multiflora Cassubica frutescens, Lentis siliquâ *Breyn. Prodr. 52.*

Vicia Narbonensis maxima, fructu rotundo atro, foliis ferratis *Morif. Hist. 2. 61.* Faba sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. 338.
ANN.

Eadem foliis integris *Morif. Hist. 2. 61.* ANN.

Vicia Benghalensis hirsuta & incana, siliquis Pisi. ANN.

Ob elegantem florum purpuram inter hortenses ornatus recepta quoque est exotica hæc Vicia, constans radice fibrosâ albâ, cauliculis bicubitalibus aut tricubitalibus ramosis viticulosis angularibus striatis, è quorum geniculis prodit costa in tortilem capreolum desinens, cui à dextris & sinistris

stris adhærent folia cœteris Viciis longiora, subincana, parte aversâ modicè pilosa. Ad costarum sinus oritur pediculus digitalis, sustinens aliquot flores papilionaceos oblongos puniceos, extremis oris nigriori purpurâ splendentibus. Hos excipiunt siliquæ, Pisis similes, ast breviores & compressæ undique sericeis incanis pilis obductæ, continentes semina subrotunda nigro-fusca granis Piperis paulo minora. Passim provenit intractu Benghalensi, unde in Hortum transvecta est.

Vicia flore luteo-pallido, filiquis hirsutis crassius brevibus erectis *Morif. Hist. 2. 62. ANN.*

Eadem filiquis propendentibus *Morif. Hist. 2. 62. descr. ANN.*

Vicia major vulgaris sativa *Morif. Hist. 2. 62.*

Vicia sativa vulgaris, semine nigro C. B. P.

344. Vicia vulgaris sativa I. B. tom. 9. l. 17.

310. ANN.

* Vicia sylvestris, semine nigro & variegato, folio acutiore *Morif. Hist. 2. 63.* Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro C. B. P. 345. An Vicia semine rotundo nigro? & Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo & nigro frugum I. B. tom. 2. l. 17. 312. ANN.

* Vicia sepium, folio rotundiore acuto C. B. P. 345. *Morif. Hist. 2. 63. ANN.*

* Vicia

Vicia Benghalensis hirsuta et incana,
SILIQVIS PISI.



* *Vicia multiflora spicata cœrulea annua minor procumbens* *Morif. Hist. 2. 63. descr.*

* *Vicia minima, radice granulosa* *Breyn. Cat. Hort. Amstel. Comelyn. Catal. 113.*

Vicia minor segetum cum filiquis pluribus hirsutis *C. B. P. 345. Morif. Hist. 2. 63. Vicia parva, sive Cracca minor cum multis filiquis hirsutis* *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia minor segetum cum filiquis plurimis glabris *Morif. Hist. 2. 345. Vicia segetum, singularibus filiquis glabris* *C. B. P. 345. Viciæ sive Craccae minimæ species cum filiquis glabris* *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli minoris *C. B. P. v. Lathyrus.*

Vicia latâ filiquâ, flore luteo *I. B. v. Lathyrus.*

Vicia Sesamacea Apula *Columnæ. v. Astragalus.*

Viciæ similis, supra infraque terram fructum edens *C. B. P. v. Lathyrus.*

Victorialis *Mas Tab. v. Allium.*

Vincetoxicum cum multis floribus albicantibus *I. B. v. Asclepias.*

* **V** *IOLA Martia purpurea, flore simplici odoro* *C. B. P. 199. Morif. Hist. 2. 474.*

Viola Martia purpurea *I. B. tom. 3. l. 32. 542.*

Viola Martia alba *C. B. P. 199. Viola Martia, flore albo odorato* *I. B. 543.*

Viola Martia multiplici flore *C. B. P. Viola Martia purpurea flore multiplicato majore* *I. B. tom. 3. l. 32. 542.*

Eadem multiplici flore candido *C. B. P. Var.* 199

Eadem multiplici flore cinereo *Catal. Hort.*

Reg. Paris. 185. *Sutherl. Cat. Edinb.* 357.

* *Viola Martia inodora sylvestris C. B. P.* 199.

Morif. Hist. 2. 474. *Viola cœrulea Martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens*

I. B. tom. 3. l. 32. 543.

Viola Martia major hirsuta inodora Morif. Hist.

2. 475.

Viola Alpina rotundifolia lutea C. B. P. 299.

Mor. Hist. 2. 475. *Viola Martia lutea I. B. tom.*

3. l. 32. 544. *Foliis & floribus minoribus.*

Eadem foliis & floribus majoribus.

Viola Martia arborescens purpurea C. B. P.

199. *Viola erecta flore cœruleo Morif. Hist.*

2. 475. *Jacæa tricolor surrectis cauliculis quibusdam arborea dicta I. B. tom.* 3. l. 32.

547.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 199. *Viola ere-*

cta flore albo Morif. Hist. 2. 475.

Viola tricolor erecta, Anjovis flos Theophrasti C. B. P. 199? *Morif. Hist.* 476. ANN.

Viola montana tricolor odoratissima C. B. P.

199. *Jacæa tricoloris, sive Floris trientalis genus, flore luteo & purpureo magno, repens non annuum I. B. tom.* 3. l. 32. 548. ANN

* *Viola tricolor hortensis repens C. B. P.* 199.

Morif. Hist. 2. 476. *Jacæa tricolor, sive Trinitatis flos I. B. tom.* 3. l. 32. 547. *Flore mi-*

nore violaceo puniceo & flavo. ANN.

* Eadem flore albo & luteo *C.B.P. Var. 199. ANN.*

* Eadem flore cum pallidè cœruleo purpureo & luteo *C. B. P. Var. 200. ANN.*

* Eadem flore Violaceo holoserico purpureo & aureo. *ANN.*

Viola tricolor hortensis repes, fl. magno duplo majore, coloris unius, nigræ purpuræ & instar holoserici nitentis *C.B.P. Var. 200. ANN.*

Eadem flore pallido *C. B. P. Var. 200. ANN.*

Eadem flore ex aureo & pallido, *ANN.*

* *Viola bicolor arvensis C. B. P. 200. Moris. Hist. 2. 476. Jacæa bicolor frugum & hortorum vitium I. B. tom. 3. l. 32. 548. ANN.*

VIOLA Indica scandens Nasturtii sapore & odore, flore flavo. *Acriviola Frid. Caf. Tab. 935. Nasturtium Indicum majus C. B. P. 306. Nasturtium Indicum, folio peltato scandens I. B. tom. 2. l. 15. 175. Pelon Mexiquilitl. Pelon Chilli, seu Nasturtium Peruvianum Hernand. 161.*

Eadem flore sulphureo. *Nasturtium Indicum flore luteo dilutiore Cat. Hort. Reg. Par. 129*

Viola Indica scandens, Nasturtii sapore, maxima odorata.

Si unquam amœnioris Floræ cultoribus, tum varietate, tum insigni florum elegantia sese commendavit Planta, hæc profecto scandentis Violæ, vulgò Nasturtii Indici, nova species est, cujus amplitudinem & majestatem quilibet intuentes merito suspiciunt & ad-

LUGDUNO-BATAVUS! 629
VIOLA INDICA SCANDENS, NASTUR-
TII SAPORE MAXIMA ODORATA.



& admirantur. Eam primò omnium Anno MDC LXXXIV. ex novo Orbe in Belgiam devehì curavit Illustrissimus Beverningius, cujus munificentia postmodum in Principum Magnatumquè Paradisos, deinde etiam in Academicum nostrum transfluxit Hortum. Multò verò feracior & omnibus sui partibus amplior est Nasturtio Indico vulgari. Etenim è crassa pallida fibrosa repente radice admirabili fertilitate luxuriant viticuli longissimi herbacei succulentissimi glabri, qui vel solo incumbunt, vel vicinos stipites bacillosve suis complexibus involvunt. Horum genicula emittunt tortiles sesqui dodrantaes pediculos, sustinentes folia orbiculata peltata, Hederæ instar angulosa, vulgari Nasturtio duplo ampliora, medio pallente umbone, cui pediculus inferitur, in aliquot concolores radios ad ambitum usque diducto. Ad singulas foliorum alas prodit alter petiolus brevior & gracilior, qui terminatur in florem amplissimum odoratum extus croceo, intus nunc cinabarino nunc coccineo, nunc simul ex utroque colore pulcherrimè variegato, superbientem, quem si solis radiis illustratum inspexeris, gracili holoserica pube, aurato pulvere perfusa, diceres interpolatum. Flos quinque contexitur petalis sesqui pollice latioribus, quorum duo superiora

rioria surrecta è basi angustâ coccineis fulgentibus virgulis striatâ sensim in rotundam latitudinem expanduntur. Tria inferiora fulciuntur angustissimo crassiusculo crocato cervice, & ubi in latum orbem se diffundere incipiunt, concoloribus ad margines barbulis capillantur, unguibus holosericâ maculâ modo coccineâ modo intensius miniatâ inscriptis. Medium occupant aliquot brevia rigida recurva flavescentia stamina oblongis striatis concoloribus apiculis ornata; Flori verò subjicitur flavescentis calix, parte anticâ, quâ floris petala complectitur, in quinque mucronatas crenas, posticâ verò in longissimum calcar purpurascens per longitudinem striis insignitum, productus, quo una cum flore delapso, sequuntur vascula subrotunda rugosa & verrucosa ut plurimum terna, rarius bina, pressius invicem juncta, quibus singulis involvitur semen oblongo-rotundum fuscum crassum solidum rugosum striatum seu angulosum, nonnihil incurvatum. Quamvis hæc planta circa finem autumnii exarescere ejusquæ radix subsequente hyeme perire soleat, adeoque non nisi seminibus regerminare videatur; Attamen vulgaris Nasturtii more multiplicari patitur per surculos, qui autumnii principio terræ commissi & in convenienti hybernâ locati, totâ hyeme vernant, & mox,

succedente vere, flores & semina numerosâ fertilitate largiuntur.

Viola aquatica L. B. v. Millefolium.

Viola lunaria major, siliquâ oblongâ & rotundâ C. B. P. v. Levcojum.

Viola Mariana Dod. L. B. v. Campanula.

Viola Matronalis vulgò ejusquè species v. Hesperis.

Viola Petrea L. B. v. Eruca.

VIRGA aurea major, vel Doria C. B. P. 268. Alisma Monspeliensium, sive Doria L. B. tom. 2. l. 24. 1064.

Virga aurea latifolia ferrata C. B. P. 268. Virga aurea, sive Solidago Saracenica latifolia ferrata L. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia ferrata C. B. P. 268. Virga aurea angustifolia ferrata, sive Solidago Saracenica L. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia minus ferrata C. B. P. 268. Virga aurea vulgaris latifolia L. B. tom. 2. l. 24. 1062.

Virga aurea foliis lævibus non ferratis Moris. Hort. Bles. 322. An Virga aurea angustifolia, paniculâ speciosâ Canadensis Cat. Hort. Reg. Par. 186?

Eadem foliis non nihil crenatis.

Virga aurea Americana hirsuta, radice odoratâ, foliis ferratis Moris. Hort. Bles. 323.

An Virga aurea Canadensis hirsuta, paniculis minus speciosis Cat. Hort. Reg. Paris.

186? Virga aurea Virginiana, foliis magis rugosis & nonnihil incisfis *Stap. in Theoph.* 365. *descr. & fig.*

Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ *Moris. Hort. Bles.* 220. Virga aurea Mexicana *C. B. P.* 517. Virga aurea Virginiana *Stapel. in Theophr.* 365.

Virga aurea, foliis Linariæ *Moris. Hort. Bles.* 379. Linaria folioso capitulo luteo major *C. B. P.* 213. Heliochrysos Tragi, sive Linaria tertia *I. B. tom. 3. l. 26.* 151.

Virga pastoris ejusque species *I. B. v. Diplacus.*

Virga sanguinea *I. B. v. Cornus.*

Visnaga *Moris. v. Gingidium.*

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis ejusque species *C. B. P. v. Agnus castus.*

* **V**ITIS Idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante *C. B. P.* 470. Vitis Idæa, fructu nigro *I. B. tom. 1. l. 5.* 519. Myrtillus vulgò.

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris *C. B. P.* 470. Vitis Idæa semper virens, fructu rubro *I. B. tom. 1. l. 5.* 522.

* Vitis Idæa palustris *C. B. P.* 471. Oxycoccus sive Vaccinia palustris *I. B. tom. 1. l. 5.* 227.

VITIS vinifera *C. B. P.* 299. *I. B. tom. 2. l. 15.* 67.

Vitis Corynthis *I. B. tom. 2. l. 15.* 72. Uvæ Passæ Indicæ, gigartis carentes *C. B. P.* 298.

Vitis muscato sapore, quæ Apiana *Plinio C. B. P. Var.* 298. Vitis

Vitis acinis oblongis magnitudine & formâ Prunorum, quæ Pergulana dici potest C. B. P. Var. 298.

Vitis Allobrogica Plinii Carol. Steph. Cat. Hort. Reg. 186.

Vitis alba dulcis I. B. tom. 2. l. 15. 73.

Vitis folio Apii I. B. tom. l. 15. 75. Vitis lacinialis foliis Corn. 182.

Vitis Viniferæ diversitates plurimæ, fructuum magnitudine colore & sapore discretæ.

Vitis alba & nigra I. B. v. Bryonia.

Vitis Hederacea Indica Stap. v. Hedera.

Ulmaria I. B. v. Barba capræ.

* **U**LMUS campestris C. B. P. 426. Ulmus I. B. tom. 1. l. 1. 239.

Umbilicus Veneris vulgò v. Cotyledon.

Unedo Plinii vulgò v. Arbutus.

Unifolium I. B. v. Lilium convallium.

Vosacan Cat. Hort. Reg. Paris. v. Chrysanthemum.

Volubilis terrestris I. B. v. Convolvulus.

* **U**RTICA urens maxima C. B. P. 232. Urtica vulgaris major I. B. tom. 3. l. 30. 445.

* *Urtica urens minor C. B. P. 232. Urtica minor annua I. B. tom. 3. l. 30. 446. ANN.*

Urtica urens pilulas ferens prima Dioscoridis, semine Lini C. B. P. 232. Urtica Romana, sive Mas cum globulis I. B. tom. 3. l. 30. 445. ANN.

Eadem Parietariæ foliis Dodart. Mem. 131. Cat.

Cat. Hort. Reg. Paris. 187. ANN.

Urtica racemosa Canadensis Dodart. Mem.
129. *Moris. Hort. Bles.* 323.

Urtica aculeata, foliis serratis ejusquè species
C. B. P. v. *Sideritis.*

X.



ANTHIUM majus Canadense. Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior *Cat. Hort. Reg. Paris.* 110. ANN.

Xanthium sive Lappa minor *I. B. tom. 3. l. 33.*
572. Xanthium Dioscoridis, Lappa minor
C. B. P. 198. ANN.

XERANTHEMUM flore simplici purpureo majore. Xeranthemum aliud Ptarmica quorundam *I. B. tom. 3. l. 25. 25.* Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus C. B. P. 272. Ptarmica Austriaca vulgò. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici albo. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici purpureo minore. Jacea Oleæ folio, flore minore C. B. P. 272. ANN.

Xeranthemum flore simplici minimo dilutè purpurascente. ANN.

Xiphium I. B. v. Gladiolus.

Xiris Moris & Xyris I. B. Jris.


Y. YUCCA

Y.



UCCA foliis Aloe C. B. P. 91. Morisf.
Hist. 2. 419.

Z.



atarbendi Alpin. v. Majorana.

Zazintia I. B. v. Cichorium.

ZEA Briza dicta vel monococcos Germanica C. B. P. 21. Zea monococcos, Briza quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 413. ANN. Zea dicoccos vel major C. B. P. 22. Zea, sive Spelta I. B. tom. 2. l. 18. 412. ANN.

Zeopyrum seu Tritico-speltum C. B. P. 22. Hordeum nudum, sive Gymnocrithon I. B. tom. 2. l. 18. 430. ANN.

Zea verna I. B. v. Triticum.

ZEDOARIA Zeylanica Camphoram redolens Mus. Zeylan. Harankaha Zeylanensium.

Zerumbeth Garz. v. Zingiber.

ZINGIBER latifolium sylvestre. Zerumbet Garz. ab Hort. l. 1. c. 43. Walinghuru sive Zingiber sylvestre Zeylanensibus.

An hoc Indicum Aroma sit Zerumbeth Arabum quod Garzias ab Horto adstruit, & an Zerumbeth sit Idem cum Zedoaria, Geduvar, Arnabo, Been albo vel rubro aut Car-

pe-

LUGDUNO-BATAVUS. 637
Z I N G I B E R S Y L V E S T R E .



pefio, an verò ab his diversū, id ex Veterum
 Codicibus difficulter colligi potest. Quippe
 non tantum in his, sed & innumeris aliis
 describendis tam breves & incerti reperiun-
 tur Arabes, & quod maximum inter se adeo
 dissentientes, ut non sine ratione dubitetur,
 an Arabibus accurata dictorum simplicium
 fuerit notitia. Itaque satius fore judico in
 præsentiarum, genuinam Aromatis nostri
 Historiam proponere, quàm de inextrica-
 bili hâc quæstione ulteriorem facere moram.
 Spontaneo autem proventu luxuriat in syl-
 vis locisque aliis umbrosis Insulæ Zeylan,
 Malabaræ, cæterarumque Orientalium Re-
 gionum, Malabaris Kua, Zeylanensibus
 Walinghuru hoc est sylvestre Zingiber di-
 ctum, cujus radix prælonga brachium cras-
 sa inæqualis, nonnihil depressa, ex crebris
 prominentibus tuberibus ceu apophysis
 per genicula junctis compacta, alba, non-
 nunquam flavescens, carnosâ succulenta, te-
 nacibus crassioribus filamentis intertextâ,
 modo in soli superficie hærens, modo al-
 tius demissa paucisque albescentibus fibris ca-
 pillata, gustus acris amaricantis aromatici
 ad Zingiber accedentis, sed magis terre-
 stris & minus grati, odoris fragrantis. Ex
 hujus tuberculis eriguntur caules sesquicu-
 bitales crassitudine digitali herbacei depres-
 si, viridante medullâ pleni, quos alterno or-
 dine

dine ab imo ad summum usque vestiunt folia spithamum longa, tres quatuorve transversos digitos lata, in mucronem abeuntia glabra polita, alterâ parte lætè viridia, alterâ in viridi pallentia, fulcita pediculo crasso brevissimo, qui lato ac folioso suo principio, Arundinum Graminumve ritu, caulem involvit & in nervum per folii mediam longitudinem excurrentem, terminatur. His in caulibus flores nulli conspiciuntur, sed ex peculiaribus radicum tuberculis, veluti in Curcumâ cœterisque hujus sortis aromatis, singularis erigitur scapus prælongis aliquot foliaceis squamis, scapum strictissimè ambientibus, obtectus, aspice in oblongo-rotundû squamatû rufescens caput ex multis obtusis foliolis imbricum modo hærentibus constructum, fastigiato, è cujus squamarum interstitiis profilit flos oblongus ut plurimum pentapetalus Curcumæ aut Zingiberi similis, petalo superiori oblongo pelucido galeæ instar erecto, duobus inferioribus conformibus instar labii protensis, intermedio flavescente sinuato ad marginem fimbriato, ex angustâ cervice in rotundam latitudinem diffuso. Huic demum ligulæ instar incumbit petalum crassum albidum reliquis angustius, crassius tamen & robustius, desinens in parvum leviter inflexum mucronem. His omnibus marcescentibus
suc-

succedit vasculum pene trigonum continens in tribus loculamentis semina rotunda fusca Cannæ Indicæ paulæ minora cœteroquin valde similia. Culturam poscit eandem, quam Curcuma, de quâ supra actum. Sale volatili oleoso aromatico abundare hujus aromatis radicem probat inter alia ejus destillatio. Transmittit enim per alembicum aquam fragrantem cum sufficiente oleo, cui, si recens fuerit destillata, innatat sal volatilis paucus, formâ nivis aut Camphoræ. Hic in spiritu vini solutus conditis electuariis aliisve debite remixtus, acidis ventriculi cruditatibus & ex iisdem obortis flatibus ac doloribus mirabiliter conducit. Idem, sed cum blandâ alvi dejectione, præstat succus ex radice recenti expressus. Conscissa siccata & in farinam trita plurimam acredinem amittit, quâ ratione conficiuntur ex eâ panes, quibus annonâ duriore vescuntur Indi. Mucilago squamati capitis interstitiis inhærens, aromatis hujus virtutem nonnihil redolet & propterea doloroso & debilitato ventriculo censetur utilissima.

Zizyphus satival. B. v. Jujubæ.

Zopal nochetzli Hernand. v. Ficus.

Zucha flore luteo. I. B. v. Pepo.

Zygis Clusio v. Serpillum.

F I N I S.

HORTI ACADEMICI LUGDUNO BATAVI.

A P P E N D I X.

Proposueram mihi Stirpium omnium nomina, quæ ab anno millesimo sexcentesimo octuagesimo ad præsentem octuagesimum sextum usque in Horto Academico Lugduno Batavo viguerunt, præmisso huic Catalogo inferre; verum cum eandem denuo percurrens reperissem, nonnullas stirpes vel omisas, vel hoc ipso anno, quo Catalogus prælo erat commissus, variis è regionibus ad nos delatas esse; Ideo Batanophilis non ingratum nec inutile fore existimavi, si illas in ordinem congererem, & sub titulo Appendicis in lucem proferrem, insimul adjiciendo, quæ ad emendationem seu illustrationem Catalogi spectare viderentur.

p. 2. l. 5. præfig. *

p. 7. l. 18. subjung.

Acer Virginianum odoratum.

p. 7. l. 23. add. post *l. B. & Dioscoridis*

C. B. P.

p. 7. l. 23. subjung:

Achiote l. *Hern. v. Orleana.*

p. 9. l. 2. subjung.

Aconitum humile bifolium, sive *Aconitifolia* flore albo unico *Leucoji campanulato*, fructu *Cynosbati* Menz. v. *Papaver.*

Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. v. *Chrysanthemum.*

p. 9. l. 23. subjung:

A DHATODA *Zeylanensium* Mus. *Zéyl.* Hoc est, Medicina foetum mortuum expellens, Græcis *Ecbolium.* *Wanæpala* Malab.

p. 10. l. 7. subjung:

Adiantum floridum album Raji. v. *Filix.*

p. 11. l. 21. subjung:

Ahate de Panucho *Hern. v. Anona*

p. 11. l. 27. subjung:

Alaternus cristata.

p. 12. l. 17. subjung:

Alcea laciniato folio rotundo C.B.P. 316. *Morif. Hist.* 2. 527.

p. 13. l. 14. subjung:

Alcea Moschata Pison. v. *Althæa.*

p. 14. l. 7. subjung:

Alisma Monspelienfium l. B. v. *Virga aurea.*

p. 14. l. 8. subjung:

Alkekengi Mexicanum Column. v. *Solanum.*

p. 15. l. 22. subjung:

Allium seu Moli Virginianum C. B. P. *Ephemereum.*

ADHATODA ZETLANENSIS.M.



p. 19. l. 9. subjung.

* *Alfine aquis innatans, foliis longiusculis* I. B. tom. 3. l. 38. 787.

p. 20. l. ultim. subjung.

Alfine vernaglabra, flosculis albis I. B. v. Linum.

p. 22. l. 17. post 479. add. *Hinna prærecti* Hort. Mal. tom. 6. 69.

p. 22. l. 24. subjung:

Althæa arbor Indica, Tiliæ folio, flore ephemero. Pariti, seu Tali pariti Hort. Mal. tom. 1. 53.

p. 24. l. 27. post 959. add. *Beloere*. Hort. Mal. tom. 6. 77.

p. 25. l. 18. post 962. add. *Quingombo* five *Alcea Mæscata* Pison. l. 4. 210.

p. 29. l. 13. subjung.

ALYPUM Monspelianum, five Frutex terribilis I. B. tom. 1. 5. 598. *Thymelæa* foliis acutis, capitulo *Succisæ*, five *Alypum Monspeliensium*. C. B. P. 463.

p. 31. l. 18. add. post 18. *Blitum Spinofum Americanum* Sutherl. Cat. Edimb. 51.

p. 34. l. 11. subjung.

Ameri Hort. Mal. v. *Colutea*.

p. 34. l. 23. subjung.

Amomum Officinatum I. B. v. *Sison*.

p. 36. l. 24. subjung.

Anachunda Hort. Mal. v. *Solanum*.

p. 39. l. 5. subjung.

Anemone Virginiana, tertiæ Matthioli similis, flore parvo.

Folia fert trilobata ampla, flores parvos in viridi pallentes, cœtera tertiæ Matthioli paria.

p. 45. l. 22. subjung.

Anhuiba Pison. v. Sassafras.

p. 45. l. ultim. subjung.

ANONA Indica, fructu parvo violaceo. Pyro similis fructus alter in novâ Hispaniâ C.B.P. 439. Ate vel Ahate de Panucho Hern. 348. 454. Evautzapotl seu Anona Hern. 90. Anona maram. *Hort Mal. tom. 3. 23.*

Anona Americana, fructu majori. Soortfack parvum vulgò.

Nomine Soortfack parvi ex Americâ huc invec̃ta sunt semina oblonga angulosa non nihil depressa flavescentia Anonâ Indicâ majora, quæ hac æstate in horto sata protulerunt sobolem, pedalis longitudinis, cui alterno ordine adstabant folia Lauri amplitudine, latè viridia lucida glabra. Cætera quæ ad arboris hujus plenariam cognitionem spectant in altera Horti nostri Appendice curioso lectori proponentur.

p. 47. l. 7. subjung.

Anonis lutea perennis major, Natrix dicta *Morif. Hist. 2. 171.* Anonis viscosa, spinis carens, lutea major. C.B.P. 389. Anonis lutea

non spinosa, Dalechampsio Natrix I. B. tom.
2. l. 17. 393.

p. 50. l. 11. post floridum add. An
Sium aquaticum, ad alas floridum *Morif.*
Umbell. 63?

p. 49. l. 12. subjung.

Apios I. B. v. Tithymalus.

p. 52. l. 25. subjung.

Apocynum maritimum erectum Venetum,
flore albo. Tithymalus maritimus, seu *Esu-*
la rara è Lio Venetorum Insula, flore albo.
Cat. Hort. Reg. Par. 176.

Apocynum Virginianum, flore herbaceo, si-
liquâ longissimâ *Morif. Hort. Bles.* 232.

Apocynum Americanum arborescens, filiquâ
maximâ.

Prodiit hoc demum anno feminibus à
Dno Henrico Meyero ex Surinama trans-
missis; Foliis palmam amplis mucronatis
binis è regione oppositis, longis pediculis
appensis. Semina erant membranacea com-
pressa fusca cum albâ lanuginosâ cœsarie.

Apocynum Novæ Angliæ subhirsutum, tube-
rosâ radice, floribus aurantiis. An *Apocy-*
num Canadense angustifolium, flore auran-
tio *Morif. Hort. Bles.* 232.

Speciosissimum hoc *Apocynum* ex Novâ
Angliâ huc invectum, idem esse opinor cum
eo, quod Morisonius in Horto Blesensi sub
nomine *Apocyni Canadensis angustifolii*
flo re

*APOCYNUM NOVÆ ANGLIÆ TUBEROSA RAD'
CE, FLORIBUS AURANTIIS.*



flore aurantio prodidit; verùm cum ejusdem descriptio sit admodum brevis & imperfecta; ideo hic subnectere volui quæ in ea videntur desiderari. Constat verò radice tuberosâ pugni magnitudine carnosâ nodosâ, paucis fibris vestitâ, solo aridiori commissâ hyemem superante, ex quâ sub æstatis initium assurgunt aliquot stolones altitudine pedali aut cubitali rotundi hirsuti, herbacei, parte quâ sole illustrantur subrubentes. His adhærent folia sine ordine, modo bina sibi opposita modo solitaria, semidigitum longa, unguem lata, ad radicem minora, in progressu verò majora, rigidiuscula, in parvum obtusum mucronem abeuntia, suprà è virore nigro splendentia, infrà pallida subhirsuta venosâ. Ramorum fastigia sustinent flores in umbellam congestos Apocyno Canadensi Syriaco minori Cornuti formâ & magnitudine similes, elegantissimi aurantii coloris. Hi antequam perficiuntur exigua crocata oblonga angulosâ striataque capitula mentiuntur; Dehiscentes verò in decem petala finduntur quinque externa longiora tenuiora deorsum flexa, totidemque interna breviora crassiora erecta, è quorum singulorum basi exit staminulum concolor tenuissimum, apiculo destitutum, medium occupat pallidè flavescens capitulum oblongum striatum quin

quinquangulum structurâ valde eleganti. Quanquam vero, hujus Apocyni fructus vidisse nobis nondum contigit, attamen haud dissimiles esse congeneribus suis, ex omnibus notis colligere licet. Turget succo viscido lento in viridi pallescente, sapore acri amaro nauseoso.

p. 58. l. 7. subjung.

Arbor venenata quorundam Cat. Hort. Reg. Paris. v. Hedera.

Arbor vitæ seu Paradisiaca vulgo I. B. v. Thuja.

p. 59. l. 9. subjung.

Arabis Chabr. v. Draba

p. 61. l. 5. præfig. *

p. 63. inferatur Asparagi aculeati maximi sarmentosi Zeylanici, radicum imago.

p. 64. l. 22. subjung.

Asperula montana odorata C. B. P. v. Rubia.

Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. v. Rubia.

p. 68. l. 18. subjung.

Aster Americanus latifolius maximus puniceis caulibus.

Altior assurgit hic Aster quàm Asteres Novæ Angliæ, caulibus robustis puniceis in breves concolores ramos divisis; Foliis Tripolii facie, sed rigidioribus crassioribus per ambitum non nihil dentatis, inferioribus palmam æquantibus, superiori-

*ASPARAGI ACULEATI SARMENTOSI ZEILANI-
CI RADICES.*



ASTER AMERICANUS LATIFOLIUS MAXIMUS
PUNICEIS CAULIBUS.



bus verò brevioribus & angustioribus; Floribus amplis violaceis, medio disco purpureo flavescente & in albertem pappum fatifcente. Subest radix fibrosa vivax, numerosa fertilitate sese propagans. Domina Agnita de Block scientiæ Botanicæ peritissima nobis hunc Asterem communicavit.

p. 73. l. 3. subjung.

Astragalus purpureus perennis Monspeliensis *Morif. Hist.* 2. 106. Astragalus Monspessulanus I. B. *tom.* 2. l. 17. 338. Securidaca lutea minor, corniculis recurvis C. B. P. 389.

p. 74. l. 2. post 285. add. Astragalus Africanus, flore luteo odoratus *Breyn. Cent.* 1. 72.

p. 78. l. 3. subjung.

Ate Herq. v. Anona.

p. 83 l. 5. subjung.

Azedarach floribus albis semper virens. Arbor Indica Fraxino similis, Oleæ fructu C. B. P. 416. Aria-Bepoli se Nimbo Acoftæ & *Garz. Hort. Mal. tom.* 4. 107.

p. 83. l. subjung.

Balam pulli *Hort. Mal. v.* Tamarindus:

p. 84. l. 16. subjung.

BELAMODAGAM *Hort. Mal. tom.* 2. 121. Takkada Zeylanenf.

p. 84. l. 22. post 261. add. Bellis sylvestris maxima, caule rubente hirsuto *Sætherl. Cat. Edimb. App.* 365.

p. 87.

p. 87. l. 6. subjung.

Beloere Hort. Mal. v. Althæa

p. 88. l. 15. subjung.

Betonica paoli Serpillifolia I. B. v. Veronica.

p. 88. l. 17. subjung.

Bislingua I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 93. l. 17. subjung.

Boa Tsingking Bont. v. Coral arbor.

Bonifacia I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 94. l. 19. subjung.

Briza C. B. P. & I. B. v. Zea.

p. 95. l. 7. subjung.

Brunella minor, folio rigido integro C. B. Phyt. 503. Brunella Hyssopifolia C. B. P. 261.

Prunella angustifolia I. B. tom. 3. l. 30. 430.

p. 99. l. 3. subjung.

Bupariti Hort. Mal. v. Althæa.

p. 101. ad l. 6. Propter characterem quem *Cacalia* habet communem cum *Eupatorio*, rectius *Eupatorium Tusilaginis* foliis cutaneis acutioribus & glabris meretur vocari.

p. 102. l. 16. post *latifolia* add. *Menta catartaria latifolia C. B. P. 228.*

p. 106. l. penult. subjung.

Camara Marckgr. & Camara Tinga Pison. v. Viburnum.

Camaru Pison. v. Solanum.

p. 108. l. 6 præfig. *

p. 18. l. 18. post 799. add. *An Alsine oblongo*

longo folio ferrato, flore coeruleo I.B. tom.
3. 19. 367?

p. 113. l. 9. subjung.

Campanula exotica Aldini v. *Convolvulus*.

p. 114. l. 20. subjung.

Cannabina Indica Stap. v. *Eupatorium*.

p. 115. l. 12. subjung.

Caranda Bontj. v. *Tamarindus*.

p. 120. l. 26. subjung.

Carduus stellatus, *Leucoji lutei foliis Dodart.*

Mem. 69. Carduus humilis aculeatus, *Parmicæ foliis Austriacæ Trumf. Observ. 96.*

Carduus Brasiliensis, *foliis Aloes C. B. P. v. Ananas.*

p. 129. l. 21. subjung.

Caryophyllus Mexicanus ejusque species Hernand. v. *Tagetes*.

Caryophyllus Indicus ejusque species I. B. v. Tagetes.

p. 130. addantur *Cinamomi Icones ad vivum expressi.*

p. 131. l. 12. subjung.

Cattuchiragam Hort. Mal. v. *Jaceæ & Serratulæ affinis.*

p. 132. l. 20. subjung.

Cedrus ex Goa vulgo v. *Juniperus.*

p. 132. l. 21. subjung.

Celeri Italorum Hort. Reg. Par. v. *Apium.*

p. 133. l. 23. subjung.

Centaurii

CASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.



CASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.



Centaurii majoris species tenuifolia I. B. v. Stoebe.

p. 134. l. 14. post 551. add. Scarlotte vulgò.

p. 135. l. 15. subjung.

Cerasus folio Laurino variegato.

p. 137. l. 18. subjung.

Chamaeficus I. B. v. *Ficus*.

p. 140. l. 1. subjung.

Chanterelle I. B. v. *Fungus*.

p. 141. l. 8. subjung.

Chondrilla Tingitana, floribus luteis, *Papaveris hortensis* folio. ANN.

Patriam agnoscit Tingidem hæc Chondrilla, figens radicem digiti crassitie pallidam, fibrosam, annuam, è quâ prodeunt folia, Papaveri hortensi nonnihil similia, duos transversos digitos lata, palmam longa, glauca, levia, carnosâ, albentibus venis insignita per ambitum crenata. Intra hæc assurgunt caules cubito longiores in aliquot alas divaricati leves pallidè virentes solidi, circa cacumina vero fistulosi. Horum singulis nodis hærent folia sine ullis petiolis auriculata inferioribus latiora & profundioribus crenis incisa; Apices verò exornant capitula Sonchi effigie squamata, quæ Augusto mense explicant florem congeneribus affinem ex numerosis petalis planis flavis ad basin purpurascensibus, radiantem stel-

lam imitantibus, congestum, succedentibus seminis oblongis albis fungosis sulcatis denticulatis candidissimo sericeo pappo cristatis. Tota Planta scatet lacte acri amaro ingrato.

p. 142. l. 25. post § 16. add. Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. 178.

p. 143. l. 6. subjung.

Eo ipso quo Appendicem hanc composui venit in manus meas Historia Plantarum CL. Johannis Rami, in qua, incidens in Chrysanthemum Indicum radice tuberosa, reperi, Dn. Rami in notis MSS. Dni. Josuæ Palmer invenisse, me Chrysanthemi hujus flores in pappum abire asseruisse. Tantum autem abest, ut Plantæ huic unquam papposa semina adscripserim, ut potius professus sim, me ullibi locorum ejus semina hætenus observasse, in quantum tamen ex floribus disco cæterisque notis mihi apparuit, conjecisse, semina fore solida non papposa, & propterea verius Chrysanthemis minimè verò Asteribus debere adjungi.

p. 144. l. 28. subjung.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis flore minore elatius. ANN.

Idem flore minimo humilior. ANN.

Prius

LUGDUNO-BATAVUS. 659

CHONDRILLA TINGITANA, FLORIBUS LUTEIS.
PAPAVERIS HORTENSIS FOLIO.



Prius erigit, caules pedales aliquando altiores, rigidos, duros, ramosos, tenui tomento obsitos, quibus hærent folia Asteri supino Clusii paria, rigida, deorsum in flexa, medio nervo in brevem aculeum abeunte. Flores fert Bellide minores luteos radiatos discoideos, denis foliis supradictis similibus quinque majoribus totidemque minoribus circumvallatos. Disco marcescente defluunt semina exigua fusca solida, ex quibus annuatim planta renovatur. Huic simile est posterius, ast humilius & omnibus partibus minus.

p. 147. l. 16. subjung.

Chunda Hort. Mal. v. Solanum.

p. 149. l. 14. subjung.

Cicuta aquatica Gesneri I. B. v. Sion.

p. 149. l. 17. subjung.

Cieuku Boym. v. Guajava.

Cinamomum C. B. P. v. Cassia.

p. 160. l. 21. subjung.

Clematis Hederæ folio Moris. v. Hedera.

p. 169. l. 3. post 198. add. Ameri *Hort.*

Mal. tom. I. 101.

p. 177. l. 2. post purpurascens add. cum stylo intermedio quinque staminulis cincto.

p. 182. l. 4. subjung.

Convolvulus Siriaceus minor.

Hunc Convolvulum, duplo minorem & speciosiore, quàm Scammonea vulgaris pos-

possidemus ex munere honestissimæ Matronæ de Block.

p. 184. l. 12. post differt add. Confer etiam Herbam innominatam primam *Markgr. l. 1. c. 25. p. 54.*

p. 186. l. 5. post 166. add. Campanula exotica *Aldini Hort. Farnes. 89.*

p. 188. l. 29. subjung.

Conyza Africana, Senecionis flore, retusis foliis.

Hæc à *Conyza Melitensi* retusis foliis *Bocc. Plant. Sic. 26.* abludit tantum floribus, qui in Bocconianâ radiati sunt, in nostrâ verò discoidei nudi non radiati Senecionis facie & modo in umbellam dispositi; cætera conveniunt.

p. 189. l. 7. add. *Mouricou Hort. Mal. tom. 6. 13.*

p. 190. l. 27. subjung.

CORTUSA Americana, flore spicato, petalis integris. Sanicula montana Americana repens peregrina, seu Cortusa Indica, vel Hedera terrestris *Bod. à Stap. 366. Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

Cortusa Americana spicato flore, petalis fimbriatis. Sanicula seu Cortusa Americana altera, flore minuto fimbriato *Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

CONIZA AFRICANA SENECTIONIS FLORE , RE-
TUSIS FOLIIS.



p. 191. l. 19. subjung.

Cotoneaster folio rotundo non serrato C. B. P.
v. Mespilus.

p. 192. l. 9. subjung.

Cotyledon aquatica l. B. v. Ranunculus.

p. 192. l. 12 subjung.

Cracca minor ejusque species l. B. v. Vicia.

Crataeus Theophrasti l. B. v. Mespilus.

Crepitus lupi l. B. v. Fungus.

p. 292. l. 17. post Lusitanis add. Tsetti
Mandaram *Hort. Mal. tom. 6. 1.*

p. 196. l. 4. post trifolia add. Anagyri-
dis facie glabra, filiquis è longioribus pedi-
culis.

p. 198. l. 22. subjung.

Crotalaria Asiatica trifolia subhirsuta ANN.

Crotalaria quintam speciem offendimus
nuper in Horto Honestissimæ de Block;
Præcedenti non multum dissimilis est, at
tota subhirsuta & quoad omnes partes
minor & tenerior, caules fert herbaceos,
quorum cacumina flores & filiquæ strictius
ambiunt, facie *Crotalaria* secundæ & ter-
tiæ.

p. 202. l. 21. post hirsutis add. Hanc
eandem esse existimo, quam Marckgravius
l. 1. 55. nomine *Sagittariae cordialis* propo-
suit.

p. 204. l. 15. post. Zeylanicus add. Ma-
jor, seminibus albis. ANN.

p. 204. l. 19. post verrucosa add. Semina alba majora.

p. 204. l. ult. subjung.

Cucumis Zeylanicus minor, seminibus nigris. ANN.

Cucumeris punicei Zeylanici, Maragosa Lusitanis dicti, duæ inveniuntur species, prima producit fructus palmam longos sativi Cucumeris crassitie, in obtusum mucronem desinentes, cute crassâ veluti in flavo virente, spinosis bullis seu tuberculis exasperatâ, carne pulposâ ex flavo rubente, dulci gratâ quasi saccharo conditâ, Hi per maturitatem finduntur in tres partes, ostendentes semina alba, superficie granulatâ Momordicæ vulgari similia, ast majora. Secunda, omnibus suis partibus minor est, fructubus digiti longitudinem vix excedentibus in mucronem recurvum terminantibus, seminibus Momordicâ vulgari minoribus nigris. Utræque species viguerunt hac æstâte in Horto, suæque semina perfecerunt.

p. 205. l. 6. post 421. add. Passiflora Frid. Cæs. in Tab. 935.

p. 205. l. 18 post 50. add. Granadilla Hispanica Flos Passionis Italici Colum. in not. ad. Hern. 888.

p. 208. l. 8. subjung.

Curcas l. B. v. Ricinus.

p. 208.

p. 208. l. 14. post 30. add. Kaha Zeylanensibus id est Crocus.

p. 223. l. 27. subjung.

Draba Chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis quasque viridibus *Moris Hist.* 2. 314.

p. 214. l. 20. subjung.

Dyopsyrus I. B. v. *Mespilus*.

p. 214. l. 22. subjung.

Ecbolium. v. *Adhathoda*.

p. 224. l. 22. subjung.

Echinomelocactus vulgò. v. *Ficoides*.

p. 225. l. 3. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 5. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 15. post aspera add. *crassiuscula*.

p. 225. l. 28. post 77. add. *Hydrophyllum Morini* Jonq. Hort. 43.

Cum hæc planta peculiarem, habet tesseram à coeteris plantis hactenus descriptis planè diversam, ideo mallet ut ad mentem Morini peculiari nomine, scilicet *Hydrophylli* quàm *Echii* seu *Dentariæ* appellaretur.

p. 228. l. 11. post *Magnoli* add. *Chrysanthemum corymbiferum Africanum* Trumf. Observ. 85.

Paucis antè diebus per literas mihi significavit Nobilissimus Dns Ciasli, plantæ hujus semina omnino convenire cum semi-

nibus Bellidis majoris, adeoque nec Chrysanthemum nec Elichrysum sed Bellidem Africanam, Coronopi folio, flore nudo seu non radiato esse appellandam.

p. 231. l. 7. subjung.

Elichryso affinis Peruana frutescens.

Hanc arbusculam perpetuâ fronde virentem produxit, Hortus Beverningianus feminibus ex Peru in vectis. Surrexit verò ad altitudinem sex septemve pedum, viticulis lignosis pallidis lentis geniculatis valde ramosis; foliis binis ex opposito nascentibus, formâ & magnitudine nescio quid affinitatis cum foliis Costi hortorum sive etiam Scabiosæ Hispanicæ stellatæ habentibus, per margines tamen crebrius ferratis, tribusque per longitudinem excurrentibus nervis inscriptis; Floribus ad foliorum exortus circa ramorum cacumina corymbosis parvis ab Elichryso non multum abludentibus, pendulis herbaceis discoideis, modo solitariis, modo tribus quatuorve simul junctis; Seminibus exiguis, ut conjicere potui, papposis, ad perfectam tamen maturitatem hucusque nondum perductis; Sapore & odore nullo evidenti.

p. 231. l. 23. post Hoc add. à Georgio Marcgravio l. 1. c. 4. p. 8. sine nomine propositum.

p. 234. l. 12. præfig: *

p. 234.

p. 234. l. 20. post minor add. angustifolia,

p. 235. l. 2. subjung:

Eruca Bellidis folio Moris Hist. 2. 231.

p. 235. l. 8. subjung:

Eadem flosculis albis.

p. 235. l. 15. subjung:

Ervilia sylvestris Dodonæi l. B. v. Lathyrus,

p. 238. l. 25. post 101. add. *Moris Hist. 2. 218.*

p. 239. l. 9. subjung:

Esula rara e Lio Venetorum Insula, flore albo Cat. Hort. Reg. Par. v. Apocynum.

p. 239. l. 24. post 291. add. *Cannabilla Indica Stap. 365.*

p. 239. l. 24. subjung.

Eupatorium Canadense, Urticæ folia, flore albo. Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn. 20.

p. 239. l. 27. subjung.

Eupatorium Novæ Angliæ Urticæ foliis, floribus purpurascens, maculato caule.

Hoc à præcedente distinguitur quod radices habeat odoratiores, caules humiliiores & tenuiores, sesquicubitum raro excedentes, pallidè virentes puniceis lineolis inscriptos, folia minora, profundius crenata, flores purpureos Eupatorio Enulæ foliis omnino pares. Enatum est in Horto seminibus ex novâ Angliâ illatis.

p. 240. l. 16. subjung.

Euphrasie affinis **Indica Echioides**. **Kawatuwa** **Zeylonensibus**. **ANN.**

Assurgit ab radice albente, lignosâ, digitali crassitie, multisque fibris capillatâ, cauliculus pedalis statim ab radice in aliquot ramos divisus, geniculatus quadrangulus asper villosus. E singulis geniculis ab imo ad summum usque exeunt folia latè viridia subaspera villosa digitum longa unguem lata obtusa bina ex adverso posita, saporis fatui, ad quorum sinus prodeunt ramuli tenues biunciales, quibus ex angustissimis herbaceis quinquifidis caliculis insident flores quini septeni, aliquando plures ad basin candidi, cœtera purpurascens, consimili fere ordine, quo Echii Alcibiadici flores, dispositi. Formâ tubulum sesquiuncialem exprimunt, qui in amplum orificium quasi galeâ trifidâ & labio integro obtuso constructum desinit, profluentibus è medio duobus capillaceis atropurpureis, tenuique albente lanugine pubescentibus staminulis, cum stylo corniculato concolori & longiori. His discussis succedunt vascula bicapsularia oblonga quadrangula membranacea granum hordei imitantia quæ semina continent quaterna ex fusco flavescentia, singulis in loculis bina. Frequens occurrit locis sordidis incul-

tis



tis Insulæ Zeylonæ. Floruit in Horto Anno 1684.

p. 241. l. 5. subjung:

Faba purgatrix I. B. v. Ricinus.

p. 241. l. 10. subjung:

Faniaicu Boym. Flor. Sin. v. *Pepo arborescens*.

p. 254. l. 21. subjung:

Ficoides minor multicaulis flore pallido.

p. 256. l. 7. subjung:

*Ficoides occidentale spinosum Melonis facie
sulcis rectis. Melocactus Indiæ occidentalis*

C. B. P. 384. *Echinomelocactus* vulgò.

Idem sulcis obliquis.

Idem minus absque tomento.

p. 256. l. 11. post 154. add. *Bacoba*

Marcgrav. l. 4. c. 27. p. 75.

p. 259. l. 10. subjung.

Fœniculum marinum majus & minus C. B. P. &
I. B. v. *Chrithmum*.

p. 263. l. 17. subjung.

Frutex spicatus, foliis Salignis serratis C. B. P.
v. *Spiræa*.

Frutex terribilis I. B. v. *Alypum*.

p. 268. l. 3. subjung.

Galeopsis angustifolia foetida I. B. v. *Stachys*.

p. 62. l. 23. post simul add. *Spar-*

*tium alterum monospermum, semine reni
simili.*

p. 292. l. 23. subjung.

Glycypicros I. B. v. *Solanum*.

p. 293. l. 4. subjung.

Glyzyrrhiza Indica vulgò. v. *Phaseolus*.

p. 304. l. 14. subjung.

Granadilla Hispanis Colum. v. *Cucumis*.

p. 305. l. 28. post 31. add. fructu longiori. Cieuku Boym. Flor. Sinenf. Jonst. de arb. Mantis. 475.

p. 305. l. 30. post acida add. fructu rotundiori Malacka Pelà *Hort. Mal. tom.* 3. 33.

p. 306. l. 7. post 899. add. *Narcissus Africanus bifolius* sive *exoticus* *I. B. tom. 2. l. 19. 679.* *Lilium Indicum puniceum* gemino latiori folio *Moris. Hist. 2. 410.*

p. 309. l. 10. subjung.

Halicacabum vulgare & *Indicum* *I. B. v. Solanum.*

Halicacabum Arabibus Bont. v. *Solanum.*

p. 306. l. 27. post Cornut. add. 96.

p. 307. l. 8. subjung.

Hedera terrestris Stap. v. *Cortusa.*

p. 307. l. 25. subjung.

Heliobrysos Tragi, sive Linaria tertia *I. B. v. Virga aurea.*

p. 311. l. 25. subjung.

Herba Paris *I. B. v. Solanum.*

Herba venti Monspeliensium vulgò. v. *Marrubium.*

p. 314. l. 14. subjung.

Hieracium incanum lanuginosum Ragusinum,
Pilosellæ flore. Pilosella incana Ragulina
I. B. Ciasli.

Quod Discriminis Hieracium inter & Pilosellam intercedit parvi est momenti. Hieracium enim cauliculos fert ut plurimum erectos & ramosos, Pilosella verò pediculos procumbentes nunquam vel rarissime in ramos minores alios divaricatos; Cæteris notis nempe floribus planipetalis naturâ plenis, seminibus citrinis albente pappo cristatis, & lacte & huminispido invicem conveniunt. Adeoque Plantam hæc Ragulinam, cujus semina nomine Pilosellæ incanæ Ragulinæ transmisit Nobilissimus Johannes Battista Ciasli, sive Hieracium sive Pilosellam appellaveris, parum interest. Nacta est hæc planta radicem fibrosam gracilem albidam, cauliculos multos cubitales, ramosos, tenues incanos, humi procumbentes, foliâ ad singula genicula & ramorum exortus Lecojo incano siliquis rotundis C. B. P. paulo latiora nonnihil crenata, candido tomento obducta, flores in ramorum cacuminibus Pilosellæ minoris faciè & formâ aureos, semina citrina candido lanuginoso pappo donata. An annua sit an perennis determinare non audeo. Eodem enim anno quo floruit, putredine

LUGDUNO-BATAVUS. 673

HIERACIUM INCANUM LANUGINOSUM RAGU-
SINUM, PILOSELLÆ FLORE.



dine correpta interiit.

p. 314. l. 17. subjung.

I. B. dubitat an *Chondrilla Cretica* nomine missa semine recurvo sit eadem cum *Hieracio Intybaceo* flore magno albido *C. B. P.* Quia vero utrisque rite collatis, reperi plantas omnino esse diversas, itaque lineæ 16. & 17. expungendæ sunt.

p. 318. l. 4. subjung.

Hina paret Hort. Mal. v. Althæa.

p. 318. l. 24. subjung.

Hordeum nudum sive Gymnocrithon I. B. v. Zea.

p. 319. l. 27. add. *Horminum Scutellariæ foliis.*

p. 319. l. 18. subjung.

Horminum Scutellariæ facie, foliis crassioribus & rugosioribus.

p. 320. l. 16 subjung.

Humatu Hort. Mal. v. Stramonia.

p. 327. l. 13. add. *Hyacinthus Africanus tuberosus, flore coeruleo umbellato Breyn. Prodr. 39.*

Hujus flores profluunt ex bifidâ membranaceâ thecâ, quos excipiunt semina in vasculis oblongis trigonis & tricapsularibus, de more *Hyacinthorum*. Cætera vid. *ap. Breyn. l. c.*

p. 327. l. 16. subjung.

Hydrophyllon Morini Ionqu. v. Echio adfinis.

P. 331.

FACEA LACINIATA SONCHI FOLIO C. BAUH.



p. 331. l. ultim. subjung.

Quoniam Jaceam laciniatam Sonchi folio admodum nervosè descripsit Casparus Bauhinus in Prodomo p. 128. Hinc satis esse patavimus tantùm adjungere ejus iconem.

p. 334. l. 23. add. ANN.

p. 334. l. 24. add. ANN.

p. 334. l. 27. add. Cattu-Schiragam
Hort. Mal. tom. 2. 39.

p. 334. l. 27. subjung.

Æquum duxi spectatorem monere, hanc plantam pro vario solo, variâ quoque prodire facie, modo majori & ampliori, modo minori. Quæ enim in Horto Malabarico exponitur, nata est solo letiori & fertiliori, quæ verò in hac Appendice, loco steriliori.

p. 334. l. ultim. subjung.

Jacea Intybacea I. B. v. Stoebe.

p. 336. l. 16. subjung.

Jacobæa Africana, radice tuberosâ. Jacobææ affinis, radice tuberosâ Capitis Bonæ Spei
Breyn. Cent. 1. 138.

p. 336. l. 20. præfig.

Jasminum Americanum trifolium odoratissimum, flore albo.

Hoc à Jasmino flavo odorato distingui-
mus tantùm flore albo. Acceptum referimus Dno. Johanni van Riedt, rariorum
florum Cultori industrio, qui inter multa
alia curiosissimâ ex America acceperat.

FACEÆ ET SERRATULÆ AFFINIS BREINII.



p. 337. l. 6. post 101. add, Pittsiegam-
mulla *Hort. Mal. tom. 6. 91.*

p. 337. l. 23. subjung.

Ibiscus Moris. v. Malva.

p. 338. l. 27. subjung

Iris angustifolia, *Prunum redolens minor*
C. B. P. 33. Iris tuberosa humilis, seu *Chamæiris angustifolia Moris. Hist. 2. 355. Iris*
Graminea, cui pereunt quotannis folia
I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris angustifolia candida, lineis rubentibus
donata *C. B. P. 33. Iris angustifolia*, flore
albo *I. B. tom. 2. l. 19. 728.*

p. 343. l. 26. subjung.

Iridi bulbosæ affinis I. B. v. Sifynrichium.

p. 344. l. 3. post 909. add, ANN.

p. 344. l. 6. post 909. add. ANN.

p. 344. l. 6. subjung.

Isatis sylvestris minor Lusitanica. ANN.

Folia protulit Myagro quodammodo
paria, sed paulò ampliora, cauliculos spiri-
thameos ramosos graciles, flosculos luteos te-
trapetalos exiguos, filiculas compressas
fungosas avis linguam referentes, in qua-
rum medio semen unicum flavum oblon-
gum acre, more congenerum.

p. 346. l. ultim. subjung.

Juripeba Fæmina Pison. v. Solanum.

p. 348. l. ult. subjung.

Kawutwa Zeylonensis. v. Euphrasia.

p. 348. l. ultim. subjung.

Kayan vulgò. v. Phaseolus.

p. 350. l. 11. subjung.

Lactuca agnina vulgò. v. Valerianella.

p. 352. l. 3. subjung.

Lamium Parietariæ foliis D. Bruyner Ionq.

Hort. 69. Lamium Parietariæ facie Morisf.

Aist. Blesf. 278.

Radice gaudet vivaci pallentibus suis fibris latè diffusâ, cauliculis multis erectis cubitalibus, quadrangulis subhirsutis geniculatis, Folia è radice primùm erumpentia, similia sunt Parietariæ minori, per margines integra, quæ vero cauli adhærent, Urticæ paria & crenata, bina semper ex adverso posita, odoris gravis. Caulis genicula cingunt flores serie simplici, omnino albentes, ex galeâ concavâ labioque bifido amplo constructi, quos excipiunt vascula aperta oblonga cum quinque in summo cuspidibus, continentia infundo semina quaternaria rotunda fusca, ritu congenerum.

p. 355. l. 2. post sterile add. *C. P. B. & I. B.*

p. 360 l. 8. subjung.

Laurus hæc Alexandrina fruticat virgulis multis cubitalibus flexilibus obsequiosis ramosis, quos ornant folia hilari virore lucida mucronata ad Myrtina accedentia. Septembri mense exeunt è ramorum cimis capitula parva rotunda herbacea ad basin

flore monopetalo in viridi pallescente sex exiguis crenis diviso vestita, quo marcescente, transeunt capitula in fructus globosos pulchrè rubentes baccis Asparagi similes, includentes sub pelliculâ tenui & parçâ pulpâ nucleum unicum rotundum pallidum durum. Subsunt radices fibrosæ albæ longæ multæ, facie Asparagi ex uno cespite promissæ. Vide an hæc sit eadem quam Morisonius in *Hort. Bles.* 279. descripsit nomine Lauri Alexandrinæ, fructu longis pediculis, caulibus alligato?

p. 360. l. ultim. post 335. add. Arveira *Pison.* l. 4. 132.

p. 368. l. 24. subjung.

Leucojum clypeatum, Serpilli folio *Morif. Hist.* 2. 248. *Thlaspi clypeatum*, Serpilli folio *C. P. B.* 107. *Lunaria peltata minima* quibusdam *I. B. tom.* 2. l. 22. 935. ANN.

p. 369. l. 2. subjung.

Leucojum spinosum *I. B.* v. *Thlaspi.*

p. 370. l. 17. subjung.

Lilac Persarum *Corn.* v. *Syringha.*

p. 573. l. 13. subjung.

Lilium album vulgare, foliis ad limbos flavescentibus.

Idem foliis flaventibus maculis inscriptis.

p. 374. l. 17. post 119. add. *Lilionarcifus rubeus Indicus* *Aldin. Hort. Farnf.* 83

p. 374. l. 20. subjung.

LAURUS ALEXANDRINA FRUCTU E SUMMITATE
CAULIUM PRODEUNTE HORT. REG. PARIS,



Lilium Africanum humile longissimis foliis
polyanthos, saturato colore purpurascens.
Idem diluto colore purpurascens.

Nuspian magnificentiùs florulentam
suam purpuram explicavit Lilium Africa-
num humile, quàm in Pandocheo Fagelia-
no, nitidioris Floræ amænitatibus instru-
ctissimo. Utrique subjungitur bulbus ro-
tundus magnitudine & formâ Lilium
Sphæricum adæquans, cujus duris mem-
branaceis corticibus, ex quibus totus com-
pactus videtur, lanosa pallida filamenta
intertexta sunt. Foliis viget totâ æstate
Sphærico paribus, sed proventu prolixiori
humi jacentibus. Septembri mense erigi-
tur scapus prope palmaris in viridi puni-
ceus, è cujus bifidâ membranaceâ vaginâ
funduntur deni aliquando viceni flores in
orbem diradiati hexapetali, formâ & colore
Narcisso Liliaceo Ferrarii pares, magni-
tudine verò inferiores, odore Hyacinthum
racemosum Muscari seu Dipsadi dictum
æmulantes, Alterius flore purpurâ satura-
tione, alterius verò dilutiori gratissimè ru-
bente. A floris interitu apparent vascula
oblonga trigona tricapsularia, foeta semini-
bus more cœterorum.

p. 375. l. 9. subjung.

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbife-
rum. Tolabo Zeylanensibus *Mus. Zeylan.*

Ex

LILIUM ZETLANICUM UMBELLIFERUM ET BUL-
BIFERUM.



Ex hujus bulbo oblongo albedo lanuginoso assurgunt folia Narcissina lata glabra plana carinata & flexuosa, inter quæ attollitur thyrsus nudus rotundus bipalmis, cujus summum coronatur floribus senis novenis (pro plantæ ætate aut foli vel climatis ubertate) modo paucioribus modo pluribus in umbellam congestis, omnibus simul è vaginâ membranaceâ bifidâ prorumpentibus; Singuli verò sex candidis angustis longulis petalis construuntur, in quorum medio prominet stylus cum sex albidis staminibus, in versatiles flavescentes farinaceos apices desinentibus. His defluxis succedunt in conceptaculis trigonis tricapsularibus semina fusca angulosa, quæ in bulbos grandescunt, conceptacula dirumpunt, & germina protrudunt. Eadem semina bulbacea observantur in Liliis Sphæricis, Sisynrichiis nonnullis, aliisque hexapetalis bulbosis Indicis Africisque.

p. 375. l. 22. subjung.

Lilium Zeylanicum superbum vulgò. v. Methonica.

p. 379. l. 19. post albo add. *Linaria annua angustifolia*, flosculis longis albis caudatis Triumph. Obs. 87.

p. 381. l. 17. subjung.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo minore

nore *Moris. Hist.* 2. 553.

p. 381. l. ultim. subjung.

Lunaria peltata minima I. B. v. *Leucojum*.

p. 385. l. 21. subjung.

Lunala Zeylanensium. v. *Narcissus*.

p. 387. l. 27. add. *Papaver spumeum*,
sive *Lychnis sylvestris*, quæ Been album
flore pleno *Breyn. Prodr.* 43.

p. 388. l. 18. subjung.

Lychnis sylvestris angustifolia, viscosa præ-
cox rubra', foliis Caryophyllaceis *Moris.*
Hist. 2. 536. *Lychnis sylvestris viscosa ru-*
bra angustifolia C. B. P. 205. *Odontidi*, sive
Flori cuculi affinis, *Lychnis sylvestris* 1.
Clusii in Pannon. 4. in *Hist. post I. B.* 3. l.
29. 348.

p. 392. l. 5. add. descripta quoque vi-
detur à Boccone in *Ic. & Desc. Pl. Sic.* 27.
sub nomine *Lychnidis foliis glabris*, calyce
duriore.

p. 398. l. 3. subjung.

Macerone I. B. v. *Smyrnum*.

Madaram-pulli Hort. Mal. v. *Tamarindus*.

p. 398. l. 18. subjung.

Malacka-pela Hort. Mal. v. *Guajavas*.

p. 408. l. 19. subjung.

Mandsjadi Hort. Mal. v. *Phascolus*.

Maon Hernand. v. *Tagetes*.

p. 409. l. 30. post 230. add. Ocimastrum
Valentinum Clusii vulgò.

p. 239. l. 11. subjung.

Matzatli Hernand. v. Ananas.

p. 420. l. 4. subjung.

Melilotus Lusitanica, rotundo crenato folio
procumbens, corniculis reflexis longis, ex
eodem centro ortis. ANN.

Quibus notis hæc Melilotus ab Italica
corniculis incurvis *I. B.* differat, vel solum
nomen indicabit.

p. 420. l. 11. subjung.

Melissa adulterina quorundam, amplis foliis &
floribus, non grati odoris *I. B. tom. 3. l. 28.*

233. Lamium montanum, Melissa folio *C.*
B. P. 223.

p. 421. l. 4. subjung.

Melocactos C. B. P. v. Ficoides.

Melongena vulgò. v. Solanum.

p. 423. l. 17. subjung.

Mercurialis Zeylanica tricoccus cum acetabu-
lis. Kupamenija Zeylanensibus. ANN.

E radice annuâ albente modicè fibrosâ
furriguntur caules, nunc unicus, nunc plu-
res, ramosi rotundi pedales striati, ad quo-
rum genicula hærent folia ex longis pedi-
culis, Mercurialis effigie, subrotunda glabra
levissimè crenata, ex horum sinubus verò
oriuntur teneræ semidigitales alæ, quos al-
terno ordine cingunt parva herbacea ace-
ta-

*MERCURIALIS ZETLANICA TRICOCCOS CUM
ACETABULIS.*

tabula cum parvis è medio prodeuntibus pulchellis brevissimis thirfulis, multis herbaceis villosis & cirrosis flosculis vestitis, quibus subsunt lappacei rotundi globuli terni simul juncti, singulis continentibus semen parvum congeneribus suppar. Crevit in Horto ex seminibus anno millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto. In Zeylona & Malabara luxuriat in fimetis, Hinc Kupamenija hoc est stercoreis seu fimi amans appellatur. Virtutes obtinet similes cum cæteris suæ sortis.

p. 424. l. 24. subjung.

METHONICA Malabarorum. Nienghala Zeylonensium *Mus. Zeyl.* Lilium Zeylanicum superbum vulgò.

Sustinetur hæc planta radice oblongâ ex rotundo nonnihil compressâ, formâ anconem seu literam r ex duobus quasi brachiis cohærentem, referente, foris fuscâ intus albâ carnosâ, gustus amari nauseosi, è cujus medio superiori angulo prodeunt sarmenta herbacea rotunda nodosâ ramosâ, altitudine trium quatuorve pedum, quæ vel humi incumbunt, vel vicinas arbores scandunt varioque flexu illas comprehendunt; Cuilibet nodo adhæret folium glabrum planum politum, latitudine duorum triumve digitorum, longitudine verò prope dodrantali in longum recurvum capreolatum mucronem desin-

LUGDUNO-BATAVUS. 689
METHONICA MALABARORUM.



Xx

desinens. Ex summis ramis aliquando etiam foliorum alis oritur petiolus, sustinens florem nudum, odore quidem vacuum, sed structuræ raritate & coloris pulchritudine cæteros flores omnes, quos Zeylona & Malabara suppetunt, longè superantem. Constat verò sex angustis semidigitum longis, elegantissimè fimbriatis petalis, totidem apiculatis staminibus, & stilo intermedio tricuspidato. Primis ab exortu diebus in viridi flavescit & Fritillariæ ritu propendet, dehinc expanditur, ejusque petala stamina & stylus sursum retroque vertuntur & sensim in aureum, tandemque exquisitissimum coccineum colorem faciunt. His omnibus defluxis perficitur seminarium amplitudine Nucis Juglandis, subrotundum trigonum tricapsulare, quod in tres coriaceas tenaces membranas dehiscit, refertum seminibus parvis angulosis rubris, duplici serie dispositis. Luxuriavit olim in Horto Beverningiano, nunc quoque superbit in Fageliano. De radicis viribus & usu cæterisque huc pertinentibus, tractabitur in Musæo Zeylanico.

p. 426. l. 23. subjung.

Milium maximum Indicum. Lithospermum Arundinaceum aliud Tozcuitlapilxochitl *Hern.* 282. Milium solis *Bont.* l. 4. 152.

p. 430.

p. 430. l. 7. subjung.

Mouricou Hort. Mal. v. Coral arbor.

*Mudela-Nila-Hamatu Hort. Mal. v. Stramon-
nia.*

p. 431. l. ult. post 760. add. *Adiantum
aureum vulgò.*

p. 433. l. 25. subjung.

Myrtillus vulgò. v. Vitis Idæa.

p. 434. l. 23. subjung.

Myrtus tenuifolia Belgica vulgò.

p. 436. l. 25. subjung.

Nalla mulla Hort. Mal. v. Syringha.

p. 444. l. 7. subjung.

*Narcissus Zeylanicus, flore albo hexagono
odorato. Lunala Zeylanensibus.*

Huic substernitur bulbus oblongo rotun-
dus pallidus, sub corticibus suis lanugino-
sus, folia promens Narcissina, ast breviora;
Ad horum latera assurgit thyrsus levis, cras-
situdine calami, proceritate dodrantali, in
cujus apice turget vagina membranacea, ex-
cludens florem unicum hexagonum mo-
nopetalum candidum odoratissimum, sex
foliaceis deorsum flexis circinnatisque la-
ciniis dissectum. Medium occupat calix,
duodecim per oras crenis incisus, ex
quo producitur stylus cum sex subalbidis
falcatis staminibus in luteos apices desinen-
tibus. Sequuntur semina fusca angulosa in
vasculo tricapsulari, de more congenerum.

Minor hujus Narcissi species à majori differt partium omnium parvitate aliquando etiam florum laciniis minus contortis, & per oras pallidè cœruleâ, lineâ virgatis.

Narcissus Africanus bifolius sive exoticus I. B. v. *Hæmanthus*.

p. 447. l. 7. subjung.

Natrix Morisf. Dalech. I. B. v. *Anonis*.

p. 451. l. 21. subjung.

Nila-humatu Hort. Mal. v. *Stramonia*.

p. 452. l. 4. subjung.

Nux Been Zeylanica, siliquâ triangulâ seminibus alatis. *Moringeros Lusitan.* *Katu Murungha Zeylanensium Mus. Zeyl.*

p. 458. l. 10. post 51. add: *Securidaca clypeata*, flore luteo, *Lentis folio*, *Zeylanica Breyn. Prodr.* 46.

p. 472. l. 5. add: *Palma Vinifera Belgarum Breyn. Prodr.* 43.

p. 477. l. 6. subjung.

Passiflora Cæs. Tab. v. *Cucumis*.

p. 478. l. 22. subjung.

Pelon Mexixquilitl & Pelon Chilli Hernand. v. *Viola*.

p. 480. l. 26. subjung.

Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve majus & minus Morisf. v. *Sinapistrum*.

p. 484. l. 2. subjung.

Periclymenum perfoliatum, folio variegato *Dni Marefiant.*

NARCISSUS ZEYLANICUS FLORE ALBO HEXAGONO ODORATO.



p. 490. l. 7. subjung.

Pevetti Hort. Mal. v. Solanum.

p. 494. l. 20. subjung.

Phaseolus arbor Indica incana, siliquis torosis.

Kayan dicta, Thora paerou *Hort. Mal. tom. 6. 23*, *Cajan Arbor Indica foliis Tri-folii bituminosi, siliquis Orobi Breyn. Prod. 20.* Kayan vulgò.

p. 495. l. 4. post Zeylan. add. Mandsjadi

Hort. Mal. tom. 6. 25. Mangili vulgò.

p. 495. l. 5. subjung.

Phu Olusatri folio C. B. P. v. Valeriana,

p. 496. l. ultim. subjung.

Pinea Indica Hern. v. Ananas,

Pino Brasiliensibus Marcg. & Pison. v. Urtica.

p. 496. l. 21. subjung.

Pitsiegam mulla Hort. Mal. v. Jasminum.

Pityusa multis I. B. v. Tithymalus.

p. 503. l. 11. subjung.

Polygonum Fæmina I. B. v. Equisetum,

p. 503. l. 15. subjung.

Polytrichon Officinarum C. B. P. v. Trichomanes

p. 509. l. 20. subjung.

Prunus Zeylanica spinosa, foliis & fructibus rotundis. Ilanda Zeylonensibus Mus. Zeyl.

p. 510. l. 12. subjung.

Ptarmica foliis profundius serratis, latè viridibus, elatior.

p. 10. l. 16. subjung.

Ptarmica Alpina, incanis serratis foliis,

Ptar-

Ptarmica Rbaphani aquatici folio, flore amplo rubello Dni Watſii.

p. 512. l. 9. ſubjung.

Pyro ſimilis fructus alter in novâ Hiſpaniâ C. B. P. v. Anona.

p. 512. l. 12. ſubjung.

Quadrifolium phæum fufcum Lobelii I. B. v. Trifolium.

p. 512. l. 13. ſubjung.

Quautzapotl Hern. v. Anona.

p. 514. l. 22. ſubjung.

Ranunculus Caſſubicus, foliis Thoræ Breyn, Prod. 45. Planè diverſus eſt à Ranunculo ſylvatico, folio ſubrotundo, & propterea ab hoc ſeparandus.

p. 525. l. 19. poſt 643. add. *Ricinus Americanus Aldin. Hort. Farnes. 87.*

p. 528. l. 12. ſubjung.

Rosa de Hiericho I. B. v. Thlaſpi.

p. 513. l. 23. poſt 334. add. ANN.

p. 513. l. 23. ſubjung.

Rubia arvenſis, flore albo humilior. Aſperula arvenſis, ſive annua, flore albo Sutherl. Cat. Edinb. 37. ANN.

p. 531. l. 15. ſubjung.

Rutæ pratenſis genus minus, ſemine ſtriato I. B. v. Thaliſtrum.

p. 534. l. 3. ſubjung.

Salvia ſylveſtris, Verbalci latis foliis Morif. Hort. Bleſ. 388. Verbaſcum latis Salviæ fo-

liis C. B. P. 240. Verbascum sylvestre, Salvifolium exoticum, folio rotundiore I. B. tom. 3. l. 28. 307.

p. 534. l. 4. subjung.

Sambach Alpino I. B. v. *Syringa*.

p. 534. l. 20. subjung.

Samolus Valerandi I. B. v. *Veronica*.

p. 536. l. 25. subjung.

Sanicula montana Americana repens peregrina
Cat. Hort. Reg. Paris. v. *Cortusa*.

Sanicula Americana altera, flore minuto fimbriato Cat. Hort. Reg. Paris. v. *Cortusa*.

p. 537. l. 12. subjung.

Satureja Cretica C. B. P. 223. *Thymbra Græca* I. B. tom. 3. l. 28. 273. *Tragoriganum Alpin. Exot.* 79.

p. 540. l. 17.

Scabiosa capitulo globoso minor C. P. B. 271.

Scabiosa minor vulgaris I. B. tom. 3. l. 25. 3.

Foliis nunc latioribus, nunc angustioribus;

Floribus modo purpureis modo cœruleis.

p. 540. l. 20. subjung.

Scabiosa stellata, folio laciniata minor, sive maritima C. B. P. 271. *Scabiosa cum pulchro semine minor* I. B. tom. 3. l. 25. 7.

p. 543. l. 18. post 247. add. *Scorodonia vulgò*.

p. 549. l. 9. subjung.

Securidaca clypeata, flore luteo, Lentis folio Zeylanica Breyn. v. *Onobrychis*.

Se-

Securidaca lutea minor, corniculis reflexis C.

B. P. v. Astragalus.

p. 558. l. 6. post 631. add. Absus Pro-
speri Alpini *Moris. Hist. 2. 146.*

p. 562. l. 26. subjung.

Sideritis Alsine Trixaginis folio C. B. P. 233.

p. 572. l. 26. post 167. add. Solanum
Pomiferum fructu rotundo *I. B. tom. 3. l.*
34. 618. Curbisolanum Frid. Cæs. in Tab.
935. Melongena vulgò.

p. 578. l. 21. Inferatur Ico Sorbi Vir-
ginianæ, descriptæ à *Breynio in pr. 51.*

p. 584. l. 12. subjung.

Soortsack parvum vulgò. v. Anona.

p. 579. l. 9. subjung.

Spelta I. B. v. Zea.

p. 586. l. 24. post 102. add. Nalla mulla
Hort. Mal. tom. 6. 87.

p. 504. l. ult. subjung.

Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ.

Menta hortensis corymbifera C. B. P. 226.

Mentha corymbifera sive Costus hortensis
I. B. tom. 3. l. 2è. 144.

p. 589. l. 14. subjung.

Taxus foliis variegatis Cat. Hort. Reg. Par. app.

p. 593. l. 23. subjung.

Thlaspi fruticosum de Jericho majus Moris.

Hist. 2. Icon. Thlaspi Rosa de Hiericho di-
ctum Moris. Hist. 1. 328. Rosa Hiericho

I. B. tom. 2. l. 16. 204.

p. 597. l. 5. subjung.

Thlaspi clypeatum Serpilli folio C.B.P. v. *Leucojum*.

p. 597. l. 7. subjung.

Thora-Paerou Hort. Mal. v. *Phaseolus*.

p. 603. l. 1. subjung.

Tolabo Zeylanensium. v. *Lilium*.

p. 603. l. 21. subjung.

Tozcuilapil xochitl Hern. v. *Milium*.

p. 609. l. 12. subjung.

Tsetti mandaram Hort. Mal. v. *Crista Pavonis*.

p. 619. l. 24. subjung.

Verbena Americana, Urticæ foliis angustioribus, flore cœruleo.

p. 623. l. 2. subjung.

Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis. Camara Marcgr. l. 1. c. 4. 5. Camara Tinga Pison. l. 4. c. 30. 176.

p. 626. l. 13. subjung.

Vicia minor hirsuta, flore minimo rubente Cat. Edinb. Sutherland.

p. 635. l. 5. subjung.

Wanapala Malab. v. *Adhatoda*.

p. 365. l. 3. post 323. add. *Pino Brasiliensibus Marcgr. l. 1. c. 23. 48. Pino, sive Urtica Pison. l. 4. c. 54. 235.*

FINIS

LUGDUNO-BATAVUS. 699
SORBUS VIRGINIANA, FOLIIS ARBUTI
BREIN.



MENDÆ CORRIGENDÆ.

P. 10. l. 3. add. l. 37. P. 30. l. 1. leg. *Panicula*. P. 30. l. 6. leg. *Cicca*. P. 46. l. 1. leg. *purpureo*. P. 54. l. 24. leg. *foliaceas*. P. 54. l. 28. leg. *longitudinem*. P. 58. l. 14. leg. *Angelica*. P. 60. l. 14. leg. *Obscuro*. P. 60. l. 17. leg. *pipillo*. P. 60. l. 19. leg. *Discordia*. P. 62. l. 10. leg. *subjunt*. P. 62. l. 24. leg. *his*. P. 66. l. 27. leg. *lateque*. P. 73. l. 19. leg. 17. P. 74. l. 14. leg. *conjugatim*. P. 83. l. 7. leg. *Ficoides*. P. 84. l. 2. leg. *Ficoides*. P. 89. l. 17. leg. *longo*. P. 94. l. 13. add. 112. P. 101. l. 19. pro *Eruca* leg. *Rhaphanistrum*. P. 102. l. 6. leg. *Cut. mutha*. P. 107. l. 14. add. *flor.* P. 121. l. 16. leg. *Ostrya*. P. 128. l. 21. leg. *Profunde*. P. 131. l. 11. pro *Lachryis* leg. *Tithymalus*. P. 133. l. 2. add. 69. P. 135. l. 3. pro *CERASUS* leg. *Cerasus*. P. 133. l. 8. leg. *Chrysanthemum*. P. 145. l. 12. praf. *. P. 145. l. 13. leg. *Buphtalum*. P. 140. l. 14. add. *Americanum*. P. 148. l. 5. leg. *album*. P. 148. l. 17. praf. *. P. 154. l. 6. leg. *quina*. P. 160. l. 26. 27. 28. comprehendantur sub uno paragrapho. P. 162. l. 24. leg. *quorum*. P. 174. l. 29. leg. *multijugis*. P. 210. l. 21. leg. *deciduo*. P. 212. l. 22. leg. 273. P. 217. l. 10. leg. *Cyisus*. P. 221. l. 16. leg. *DIPSACUS*. P. 225. l. 3. add. 254. P. 225. l. 5. add. 254. P. 236. l. 9. leg. *Illustriissimi*. P. 246. l. 19. leg. *farinaceis*. P. 261. l. 18. leg. *Fritillaria*. P. 277. l. 26. leg. *superiori*. P. 277. l. 28. leg. *Virtute*. P. 298. l. 29. leg. *Oceanicum*. P. 305. l. 25. leg. *GUAIANA*. P. 306. l. 23. leg. *Clematidis*. P. 321. l. 9. leg. *HYACINTHUS*. P. 343. l. 27. pro *Apocynum* leg. *Aloe*. P. 350. l. 25. leg. 322. P. 350. l. 29. leg. 323. P. 354. l. 28. leg. *Bononiense*. P. 360. l. 3. leg. 575. P. 361. l. 11. deleatur ANN. P. 388. l. 6. leg. 348. P. 388. l. 11. add. 205. P. 409. l. 23. leg. *Mastichina*. P. 416. l. leg. *Deltoides*. P. 417. l. 1. leg. *constanter*. P. 433. l. 2. leg. 977. P. 423. l. 5. leg. 977. P. 434. l. 25. leg. *Myrtus*. P. 442. l. 24. leg. *lutea*. P. 445. deleantur lineæ 22. 23. 14. 25. P. 454. l. 5. leg. *intercurrentibus*. P. 416. l. 8. deleantur in App. P. 503. deleatur linea prima. P. 503. l. 8. pro *Pyrola affinis* leg. *Telephium*. P. 510. l. 29. leg. *Umbelliferum*. P. 537. l. 14. leg. *transmisit*. P. 543. l. 11. leg. *spinofus*. P. 544. l. 15. leg. *laciniata*. P. 545. l. 2. leg. *radice*. P. 545. l. 14. leg. *sesquicubitalis*. P. 577. l. 24. leg. *recurvo* item *Chondrilla*. P. 568. l. 6. leg. *Bulbosæ*. P. 576. l. 25. leg. *Solanum*. P. 580. l. 6. leg. *ferratis*. P. 492. l. 24. leg. et. P. 599. l. 5. leg. *ingruente*. P. 615. l. 4. leg. *lateratibus*. P. 631. l. 51. leg. *purpurascens*. P. 638. l. 25. leg. *accedentis*. P. 641. l. 11. leg. *eundem*. P. 645. l. 13. *Quantzapol.* P. 652. l. 17. leg. *Hern.* P. 652. l. 19. leg. *Azadarch.* P. 658. l. 1. leg. *seminibus*. P. 658. l. 25. add. *Semina quoque Flori solis similia, sed minora admodum, nigrescente cortice, medulla sapore & odore ingrata, se observasse fatetur Fabius Columna in Annot. ad Resch. p. 881.* P. 668. l. 18. add. *sunt*. P. 670. l. 16. leg. 162. P. 672. l. 13. deleatur et. P. 672. l. 23. leg. *Lenchojo*. P. 679. l. 8. leg. *Hort.* Cetera quæ interpretantur vitia & l. fœd corrigat genio.



